RIS VI

IV

JOH. CHRIST. FABRICII

ST. NAT. OECONOM. ET CAMERAL. P. P. O. SOC. IMP.
T. CURIOS. HAFN. NORW. BEROL. LIPS. OECON. LUND.
TROP. TAURIN. JENENS. LOND. HIST. NAT. NEC NON
PARIS. AGRICULT. HIST. NAT. ET PHILOM. MEMBR.

SUPPLEMENTUM

ENTOMOLOGIAE SYSTEMATICAE.

HAFNIAE,
APUD PROFT ET STORCH.
MDCCXCVIII.

BIBLIOTHECA
CARCINOLOGICA
L.B. Holthuis

Entomologiam nunc virilem vegetamque lae-us obſeruo. Video ſcientiae heroes ſyſte-ata elaborare, claſſes condere generaque oua introducere. Gratus certe labor, quo ientiae nitor magnopere augetur. Plures men fundamento ludicro inaedificant, ſy-emata ſaepius diuerſiſſima iungere tentant, eo ipſo filum ſyſtematis áriadneum amit-nt. Characteres claſſium generumque om-no omnes iisdem ſemper partibus deſumen-ſunt et hoc primum et firmum artis eſt fun-mentum. Inſtrumenta cibaria introduxi, nſtantiſſima inueni at nullo modo cum alis iisque partibus iungenda. Mixta ſemper aos praebent et laceſſitus demonſtrationem ſcipiam.

Video Entomologes ſpecies innumeras pingere, deſcribere, aut obſeruationibus umbrationibusque ſcientiam illuſtrare, quo iorem vigorem et certitudinem attingit. mia verboſitate vero crambéque decies co-

ꝯta paginas polluunt et ſcientiae nitorem pin-
guedine obruunt.

Supplementum hoc Entomologiae ſyſte-
maticae nunc offero. Continet genera plu-
rima noua, characteribus certis firmata, con-
tinet ſpecies numeroſas, differentiis vitis di-
ſtinctas, adiectis ſynonymis, locis, obſerua-
tionibus.

Agonatorum claſſem inprimis et nomi-
ne et charactere e ſpeciminibus bene conſer-
uatis ab amiciſſimo Daldorffio ex India orien-
tali allatis mutaui, diuiſi et claſſes magis na-
turales characteresque firmiores obtinui.
Vale L. B. et laboribus noſtris faue.

Kiliae,
10. Febr. 1798.

CLASSIS I.

ELEUTERATA.

MAXILLA NUDA, LIBERA, PALPIGERA.

GEOTRUPES.

Os clypeo breui ſaepius bidentato.

Palpi quatuor breues, inaequales,

anteriores longiores, quadriarticulati: articulis inaequalibus; primo tertioque breuiſſimis, ſecundo quartoque longioribus, cylindricis, obtuſis adhaerentes maxillae dorſo,

poſteriores breuiores, triarticulati: articulo tertio maiori, obtuſo adnati labii apice.

Mandibula breuis, piloſa, craſſa, lata, fornicata, obtuſa.

Maxilla breuis, cornea, rotundata, ciliata, integra.

Labium breue, corneum, ouatum, integrum.

Antennae clauato lamellatae.

SCARABAEUS.

Os *clypeo* breui, truncato, ciliato.

Palpi quatuor aequales, filiformes,

anteriores quadriarticulati: articulis ſub-aequalibus; ultimo cylindrico, obtu-adhaerentes maxillae dorſo,

poſteriores triarticulati: articulis ſubaequ-libus, ultimo cylindrico, obtuſo adna-ti labii apicibus.

Mandibula magna, cornea, arcuata, ext-ſulcata, intus piloſa.

Maxilla craſſa, cornea, unidentata.

Labium breue, corneum, rotundatum, la-emarginatum.

Antennae clauato lamellatae.

ONITIS.

Os clypeo membranaceo, rotundato, integro.

Palpi quatuor inaequales,

anteriores longiores, filiformes, quadri-ticulati: articulo ultimo longiori, -lindrico, obtuſo adhaerentes maxil-dorſo,

poſteriores breuiores, compreſſi, utrinq-ciliati, extrorſum craſſiores, triarti-lati adnati ſub labii apice.

Mandibula membranacea, compreſſa, ap-rotundata, integra.

Maxilla baſi cornea, apice inflexa, dilatata, membranacea, rotundata, integra.

Labium breue, corneum, piloſum, rotundatum, emarginatum.

Antennae clauato lamellatae.

COPRIS.

Clypeo porrecto, rotundato, corneo.

Palpi quatuor inaequales, filiformes,

anteriores longiores, quadriarticulati: articulo ultimo parum longiori, cylindrico, obtuſo adhaerentes maxillae dorſo.

poſteriores breuiſſimi, triarticulati: articulis aequalibus adnati ſub labii apice.

Mandibula omnino nulla.

Maxilla baſi cornea, in medio unidentata, apice membranacea, rotundata.

Labium breue, corneum, rotundatum, integrum.

Antennae clauato lamellatae.

CYCHRUS.

Clypeo porrecto, corneo, ouato, integro: margine incraſſato.

Palpi quatuor ſubaequales, elongati, prominuli,

anteriores paullo longiores, quadriarticulati: articulo primo breuiſſimo, ſecundo longiſſimo, ultimo obconico apice

oblique truncato adhaerentes maxil
dorſo.

poſteriores triarticulati: articulo ſecun
longiſſimo, tertio obconico, obl
truncato adnati labii apice.

Mandibula elongata, tenuis, recta, corn
apice incurua, acutiſſima, edentula.

Maxilla compreſſa, cornea, rotundata,
da: lacinia exteriore interiorem ob
uente.

Labium breue, corneum, cylindricum, in
grum.

Antennae ſetaceae.

L E M A.

Os clypeo breui, corneo, rotundato, integro.

Palpi quatuor inaequales filiformes,

anteriores longiores, quadriarticulati:
ticulo primo breuiſſimo, reliquis
aequalibus, ultimo ouato adhaeren
maxillae dorſo,

poſteriores breuiores, triarticulati: arti
primo breuiſſimo, ultimo ouato a
ti labii medio.

Mandibula cornea, recta, edentula.

Maxilla cornea, bifida: lacinia exteriore l
giore, cylindrica, interiore acuta.

Labium membranaceum, rotundatum,
dum.

Antennae moniliformes.

ENDOMYCHUS.

Os clypeo breuiſſimo, vix exſerto, integro.

Palpi quatuor inaequales, ſubfiliformes,

anteriores longiores, quadriarticulati: articulo ultimo truncato, ſubcraſſiori adhaerentes maxillae dorſo,

poſteriores breuiores triarticulati: articulo ultimo obtuſo, truncato adnati labii medio exteriori.

Mandibula cornea, incurua, acuta, edentula.

Maxilla breuis, cornea, unidentata.

Labium elongatum, corneum, apice rotundatum, integrum.

Antennae filiformes apice moniliformes.

CLYTHRA.

Os clypeo breui, corneo rotundato, integro.

Palpi quatuor breues, ſubaequales, filiformes,

anteriores quadriarticulati: articulo ſecundo longiori, ultimo cylindrico paullo craſſiori obtuſo adhaerentes maxillae dorſo,

poſteriores vix breuiores, triarticulati adnati labii lateribus.

Mandibula elongata, cornea, apice parum dilatata, bidentata.

Maxilla cornea, breuis, bifida: laciniis diſtantibus, interiore parum breuiore.

Labium breue, membranaceum, apice parum dilatatum, emarginatum.

Antennae breues, ſerratae.

DIRCAEA.

Os clypeo breuiſſimo, vix exſerto.

Palpi quatuor inaequales,

anteriores exſerti, porrecti, multo longiores, quadriarticulati: articulis tribus breuibus, ultimo elongato, compreſſo, trilobo: lobo inferiori conico, intermedio tenuiori, ſubulato, incuruo, ultimo maiori acuto adhaerentes maxillae dorſo,

poſteriores breues filiformes, triarticulati, adnati labii medio.

Mandibula breuis, cornea, incurua, edentula.

Maxilla breuiſſima, membranacea, bifida: laciniis aequalibus, cylindricis, obtuſis.

Labium breue, membranaceum, rotundatum, integrum.

Antennae filiformes: articulis cylindricis.

GEOTRUPES. *Palpi* quatuor filiformes.

Labium piloſum, ouatum, integrum.

Antennae clauato lamellatae.

*. *Thorace cornuto.*

1. G. thoracis cornu incuruo maximo, ſubtus barbato utrinque unidentato, capitis recuruato dentato. *Hercules.*

Scarabaeus Hercules Ent. ſyſt. 1. 2. 1. Linn. ſyſt. nat. 2. 541. 1. Muſ. Lud. Ulr. 3. Jablonsk. Coleopt. 1. tab. 1. fig. 1. 2. Oliv. Inſ. 1. 3. 6. 1. tab. 1. fig. 1. tab. 23. fig. 1.

Roeſſ. Inſ. 2. Scar. 1. tab. A. fig. 1. 4. tab. 5. fig. 3.

Drury Inſ. 1. tab. 30. fig. 1. 2.

Scarabaeus ſcaber, ſcutellatus clypei centro prominulo, elytris antice ſcabris. Linn. ſyſt. nat. 2. 549. 37. Muſ. Lud. Ulr. 17. faem.

. Geotrupes corpus magnum, oblongum, gibbum, immarginatum, ſupra glabrum; ſubtus piloſum, tardum, clypeo os tegente breui, ſaepius bidentato, maris cornuto, oculis magnis, globoſis, utrinque conſpicuis, margine poſtico inſertis, utrinque hamo firmatis, antennis breuibus, ante oculos inſertis, thorace rotundato, gibbo, maris ſaepius cornuto: marginibus rotundatis, ſcutello paruo, rotundato, elytris longitudine abdominis, pedibus breuibus, validis, femoribus compreſſis, tibiis dentatis, tarſis quinque articulatis, colore nigro aut obſcuro.

Habitat in America meridionali.

Alcides. 2. G. thoracis cornu incuruo ſubtus barbato unidentato, capitis recuruato mutico.

Scarabaeus Alcides Ent. ſyſt. 1. 3. 2. Oliv. Inſ. 1. 3. 7. 2. tab. 1. fig 2.

Habitat in India orientali Muſ. Dom Banks.

Gideon. 3. G. thoracis cornu incuruo maximo apice bifido, capitis recuruato bifido ſupra unidentato.

Scarabaeus Gideon Ent. ſyſt. 1. 4. 3. Linn. ſyſt. nat. 2. 541. 2. Jablonsk. Coleopt. 1. tab. 1. fig. 3.

Roeſſ Inſ. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 5.

Oliv. Inſ. 1. 3. 14. 10. tab. 11. fig. 102.

Edw. Av. tab. 40.

Seligm Av. 2. tab. 79.

Voet Scarab. tab. 12. fig. 100.

Habitat in Indiis.

Oromedon. 4. G. thoracis cornu breui emarginato, capitis recuruato bifido.

Scarabaeus Oromedon Ent. ſyſt. 1. 4. 4.

Oliv. Inſ. 1. 3. 17. 14. tab. 18. fig. 165.

Jablonsk. Coleopt. 1. tab. 2. fig. 2.

Voet Coleopt. tab. 13. fig. 102.

Aubent. Miſcell. tab. 40. fig. 4.

Habitat in Indiis.

Centaurus. 5. G. thoracis cornu incuruo baſi bidentato apice bifido, capitis recuruato unidentato.

Scarabaeus Centaurus Ent. ſylt. 1. 4. 5.

Oliv. Inſ. 1. 3. 14. 9. tab. 11. fig. 104.

Drury Inſ. 1. tab. 36. fig. 1.
Jablonsk. Coleopt. 1. tab. 2. fig. 1.
Habitat in India orientali, Africa.

G. rufus thoracis cornu breui incuruo ſubtus barbato, capitis recuruo ſubulato. *Aegeon.*
Scarabaeus Aegeon Ent. ſyſt. 1. 4. 6.
Oliv. Inſ. 1. 3, 26. 216. tab. 26. fig. 219.
Drury Inſ. 2. tab. 30. fig. 5.
Jabl. Coleopt. 1. tab. 1. fig. 4.
Habitat in Indiis.

G. thoracis cornu ſubulato protenſo capitis ſubulato ſubrecuruo, ſcutello cordato. *diſpar.*
Scarabaeus diſpar Ent. ſyſt. 1. 5. 7.
Scarabaeus Ammon Pall. Jcon. 1. tab. A. fig. 8. A. B.
Oliv. Inſ. 1. 3. 58. 64. tab. 3. fig. 20.
Jabl. Coleopt. 1. tab. 2. fig. 3. 4.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 4. 6.
Habitat in Roſſia auſtraliori Muſ. Dom. Banks.

G. thoracis cornu incuruo baſi craſſiſſimo apice bifido, capitis longiori bifido. *Chorinaeus.*
Scarabaeus Chorinaeus Ent. ſyſt. 1. 5. 8.
Oliv. Inſ. 1. 3. 15. 10. tab. 2. fig. 4.
Jabl. Coleopt. 1. tab. 2. fig. 5.
Aubent. Miſcell. tab. 15. fig. 4.
Voet Inſ. tab. 13. fig. 104.
Habitat in Braſilia.

G. thoracis cornu bidentato, capitis dichotomo, elytris rufis. *dichotomus.*

Scarabaeus dichotomus Ent. ſyſt. 1. 5. 9. Lin
Mant. 1. 529.
Oliv. Inſ. 1. 3. 20. 17. tab. 17. fig. 156.
Jabl. Coleopt. 1. tab. 2. fig. 6.
Aubent. Miſcell. tab. 40. fig. 5.
Voet Coleopt. tab. 14. fig. 107.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 1. fig. 1.
Habitat in Indiis.

claviger. 10. G. rufus thoracis cornu eleuato, capitis ſu
bulato recuruo.
Scarabaeus claviger Ent. ſyſt. 16. 10. Linn. Ma
1. 529.
Oliv. Inſ. 1. 3. 20. 18. tab. 5. fig. 40.
Jabl. Coleopt. tab. 3. fig. 1.
Drury Inſ. 3. tab. 48. fig. 3.
Voet Coleopt. tab. 14. fig. 108.
Aubent. Miſcell. 1. tab. 40. fig. 1.
Habitat in Indiis.

haſtatus. 11. G. thoracis cornu breui fornicato haſtato ſu
tus hirto, capitis recuruo.
Scarabaeus haſtatus Ent. ſyſt. 1. 6. 11. *
Oliv. Inſ. 1. 3. 21. 9. tab. 19. fig. 175.
Habitat in America meridionali Muſ. D
Hunter.

Enema. 12. G thoracis cornu incuruo ſimplici baſi cra
ſſiſſimo, capitis recuruo bifido.
Scarabaeus Enema Ent. ſyſt. 1. 6. 12. *
Oliv. Inſ. 1. 3. 22. 20. tab. 12. fig. 114.
tab. 17. fig. 157.
Habitat in India Muſ. Dr. Hunter.

G. thoracis cornu incuruo baſi craſſiſſimo api- *Pan.*
ce bifido, capitis recuruo unidentato.
Scarabaeus Pan Ent. ſyſt. 1. 6. 13.
Habitat in Indiis Dom. Drury.

G. thorace prominente bilobo, capitis cornu *bilobus.*
ſimplici, elytris ſtriatis.
Scarabaeus bilobus Ent. ſyſt. 1. 7. 14.
Oliv. Inſ. 1. 3. 31. 33. tab. 5. fig. 35.
tab. 23. fig. 35.
tab. 1. fig. 5.
Edw. Av. tab. 105 fig. 2.
Voet Coleopt. tab. 14. fig. 106.
Aubent. Miſcell. tab. 15. fig. 3.
Habitat in Europa auſtrali.

G. thorace antice fornicato-excauato: cornu *Daedalus.*
breuiſſimo, capitis cornu plano utrinque im-
preſſo.
Scarabaeus Daedalus Ent. ſyſt. 1. 7. 15. *
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Lund.

G. thorace retuſo: cornu breui truncato, ca- *truncatus.*
pite mutico.
Scarabaeus truncatus Ent. ſyſt. 1. 7. 16.
Scarabaeus truncatus Oliv. Inſ. 1. 3. 31. 32. tab.
11. fig. 103.
Voet Coleopt tab. 5. fig. 38.
Habitat in noua Zelandia Muſ. Dom. Banks.

G. thorace antice retuſo mucronato, capitis *Zoilus.*
cornu breuiſſimo recuruo.
Scarabaeus Zoilus Ent. ſyſt. 1. 7. 17. *
Oliv. Inſ. 1. 3. 45. 51. tab. 9. fig. 84.

Habitat Cajennae Muſ. Dom. Olivier.

Actaeon. 18. G. glaber thorace bicorni, capitis cornu un dentato bifido, elytris laeuibus.
Scarabaeus Actaeon Ent. ſyſt. 1. 8. 18. Lin ſyſt. nat. 2. 541. 3. Muſ. Lud. Ulr. 4.
Oliv. Inſ. 3. 20. 5. tab. 5. fig. 32.
tab. 6. fig. 49.
Jablonsk. Coleopt. 1. tab. 3. fig. 4.
Aubent. Miſcell. tab. 15. fig. 5.
Roeſſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 2.
Voet Coleopt. tab. 16. fig. III. 112.
Habitat in America meridionali.

Simſon. 19. G. thorace bicorni, capitis cornu apice bi do, clypeo denticulato.
Scarabaeus Simſon Ent. ſyſt. 1. 8. 19. Linn. ſyſt nat. 2. 542. 4. Muſ. Lud. Ulr. 5.
Oliv. Inſ. 1. 3. 13. 8. tab. 15. fig. 142.
Habitat in Indiis Muſ. Britannicum.

Elephas. 20. G. villoſus thorace gibbo bicorni, capitis co nu unidentato apiceque bifido.
Scarabaeus Elephas Ent. ſyſt. 1. 8. 20.
Oliv. Inſ. 1. 3. 11. 6. tab. 15. fig. 138.
Olear. Muſ. tab. 16. fig. 2.
Habitat in Guinea Muſ. Britannicum.

Boas. 21. G. thorace retuſo excauato bidentato, capi tis cornu recuruo ſimplici.
Scarabaeus Boas Ent. ſyſt. 1. 8. 21. *
Scarabaeus Augias Ent. ſyſt. 1. 16. 47.
Scarabaeus Boas Oliv. Inſ. 3. 35. 38. tab. fig. 24.

Habitat in Sierra Leon. Dom. Drury.

22. G. thorace bicorni, corpore ferrugineo. *Coryphaeus.*

Scarabaeus Coryphaeus Ent. ſyſt. 1. 9. 22. *

Oliv. Inſ. 1. 3. 61. 68. tab. 16. fig. 150.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lee.

23. G. thorace bicorni, capitis cornu recuruo unidentato, elytris rufis. *bicornis.*

Scarabaeus bicornis Ent. ſyſt. 1. 9. 23.

Lesk. Anſ. Gr. 1. tab. 9. fig. 1.

Jabl. Col. 1. tab. 4. fig. 1.

Aub. Miſcell. tab. 15. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

24. G. brunneus thorace bicorni: cornubus compreſſis, capite tricorni: intermedio breuiſſimo. *Orion.*

Scarabaeus Orion Ent. ſyſt. 1. 9. 24.

Oliv. Inſ. 1. 3. 47. 52. tab. 4. fig. 30.
tab. 5. fig. 30.

Habitat in Senegàllia Muſ. D. Olivier.

25. G. glaucus thorace tricorni: lateralibus breuiſſimis ſubulatis, medio ſubtus barbato, capitis recuruo ſimplici. *Tityus.*

Scarabaeus Tityus Ent. ſyſt. 1. 10. 25. Linn. ſyſt. nat. 2. 542. 5. Amoen. acad. 6. 391. 1.

Oliv. Inſ. 1. 3. 9. 4. tab. 4. fig. 31.

Voet Coleopt. tab. 12. fig. 99.

Degeer Inſ. 4. tab. 8. fig. 10.

Jabl. Col. 1. tab. 4. fig. 2.

Scarabaeus marianus Ent. ſyſt. 1. 30. 95. Linn. ſyſt. nat. 2. 549. 35.

Oliv. Inſ. tab. 10. fig. 31.
Aubent. Miſcell. 1. tab. 40. fig. 2.
Habitat in America.

Atlas. 26. G. thorace tricorni: intermedio breuiſſim[o], capitis recuruo.
Scarabaeus Atlas Ent. ſyſt. 1. 10. 26. Lin[n.] ſyſt. nat. 2. 542. 6. Muſ. Lud. Ulr. 6.
Jabl. Coleopt. 1. tab. 4. fig. 3.
Sulz. Icon. tab. 1. fig. 1.
Habitat in America meridionali.

Geryon. 27. G. thorace excauato tricorni: lateralibu[s] compreſſis unidentatis, capitis recuruo ſim[-]plici.
Scarabaeus Geryon Ent. ſyſt. 1. 10. 27. *
Oliv. Inſ. 1. 3. 30. 31. tab. 24. fig. 208.
Jabl. Coleopt. 1. tab. 4. fig. 5.
Drury Inſ. 2. tab. 30. fig. 6.
Habitat in Indiis.

Aloeus. 28. G. thorace tricorni: intermedio longiori ſim[-]plici, capite ſubmútico, elytris uniſtriati[s].
Scarabaeus Aloeus Ent. ſyſt. 1. 11. 28. Linn. ſyſt. nat. 2. 542. 7. Muſ. Lud. Ulr. 7.
Oliv. Inſ. 1. 3. 23. 22. tab. 3. fig. 22.
Jabl. Col. 1. tab. 5. fig. 3.
Aubent. Miſcell. tab. 15. fig. 7.
Voet Coleopt. tab. 18. fig. 122. Maſ. tab. 19. fig. 128. faem.
Roeſſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 6.
Habitat in America meridionali.

G. thorace tricorni: intermedio emarginato, *Typhon.*
capitis longiori recuruo baſi uuidentato apice bifido.
Scarabaeus Typhon Ent. ſyſt. 1. 11. 29. *
Oliv. Inſ. 1. 3. 12. 7. tab. 16. fig. 152.
Habitat — — Muſ. Britannicum.

G. thorace tricorni: lateralibus breuioribus *Vulcanus.*
compreſſis ante apicem dilatatis, capite mutico, elytris ſtriato punctatis.
Scarabaeus Vulcanus Ent. ſyſt. 1. 11. 30. *
Habitat in Inſula Guadeloupe Dom. de Badier.

G. thorace tricorni: intermedio longiori ſimplici, capite mutico elytris laeuiſſimis. *Antaeus.*
Scarabaeus Antaeus Ent. ſyſt. 1. 12. 31.
Oliv. Inſ. 1. 3. 25. 23. tab. 12. fig. 105.
tab. 13. fig. 105.
Voet Coleopt. fig. 115.
Jabl. Coleopt. 1 tab. 5. fig. 4. 5.
Drury Inſ. 1. tab. 34. fig. 1.
Habitat in America meridionali.

G. thorace tricorni: intermedio longiori ſimplici, capite mutico, elytris punctatis. *Syphax.*
Scarabaeus Syphax, Ent. ſyſt. 1. 12. 32.
Oliv. Inſ. 1. 3. 25. 24. tab. 11. fig. 99.
tab. 25. fig. 99.
Habitat in America.

G. thorace tricorni: cornubus aequalibus breuiſſimis, elytris laeuibus. *Maimon.*
Scarabaeus Maimon Ent. ſyſt. 1. 12. 33.
Oliv. Inſ. 1. 3. 29. 30. tab. 11. fig. 101.

Habitat in America Muſ. Dom. Banks.

Titanus. 34. G. thorace tricorni: intermedio longi apice bifido, lateralibus ſubarcuatis acu capite mutico.

Scarabaeus Titanus Ent. ſyſt. 1 13. 36.
Oliv. Inſ. 1. 3. 26. 25. tab 5. fig. 38.
Drury Inſ. 1. tab. 36. fig 3. 4.
Jabl. Coleopt. 1. tab. 6. fig. 3.
Habitat in America.

Aenobarbus. 35. G. thorace tricorni: medio longiori ema nato, lateralibus obtuſis, capite bitube lato.

Scarabaeus Aenobarbus Ent. ſyſt. 1. 13. 37.
Oliv. Inſ. 1. 3. 28. 28. tab. 16. fig. 147.
Habitat in America Muſ. Dr. Hunter.

naſicornis. 36. G. thorace prominentia triplici, capitis c nu recuruo, elytris laeuibus.

Scarabaeus naſicornis Ent. ſyſt. 1. 14. 38. Li ſyſt. nat. 2. 544. 15. Fn. Sv. 378.
Roeſſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. 6. 7.
Jabl. Coleopt. 1. tab. 6 fig. 4. 5.
Oliv. Inſ. 1. 3. 37. 41. tab. 3. fig. 19.
Habitat in Europae fimetis.

Syluanus. 37. G. thorace retuſo: prominentia triplici; termedia obſoleta, capitis cornu recuruo.

Scarabaeus Syluanus 1. 14. 39.
Oliv. Inſ. 1. 3. 29. 29. tab. 12. fig. 107.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.

quadriſpinoſus. 38. G. thorace retuſo: prominentia quadru ci, capitis cornu recuruo.

Scarabaeus 4ſpinoſus Ent. ſyſt. 1. 15. 41.
Oliv. Inſ. 1. 3. 33. 35. tab. 19. fig. 179.
Habitat Cajennae Muſ. Dr. Hunter.

39. G. thorace quadricorni: cornubus lateralibus maioribus, capite bidentato, corpore ferrugineo. *Cyclops.*

Scarabaeus Cyclops Ent. ſyſt. 1. 15. 44.
Oliv. Inſ. 1. 3. 60. 67. tab. 15. fig. 140.
Habitat in Indiis Dom. Lee.

40. G. thorace cornubus quinque: poſtico longiori incumbente, capitis recuruo ſerrato. *Milon.*

Scarabaeus Milon Ent. ſyſt. 1. 16. 45.
Oliv. Inſ. 1. 3. tab. 20. fig. 185.
Habitat in Braſilia.

** *Thorace inermi, capite cornuto.*

G. thorace retuſo ſubbituberculato, capitis cornu ſimplici, clypeo bifido, elytris punctatis. *Rhinoceros.*

Scarabaeus Rhinoceros Ent. ſyſt. 1. 16 46. Linn. ſyſt. nat. 2. 544. 14. Muſ. Lud. Ulr. 10.
Oliv. Inſ. 1. 3. 34. 36. tab. 18. fig. 166.
Jabl. Coleopt. tab. 9. fig. 5. 6.
Voet Coleopt. tab. 18. fig. 117. 118.
Barrel. Icon. tab. 163.
Wulf. Inſ. Capenſ. tab. 2. fig. 18.
Roeſſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 7.
Petiv. Gaz. tab. 44. fig. 9. et tab. 100. fig. 3.
Habitat in Aſia.

G. thorace inermi antice ſcabro, capitis cornu recuruo breui. *Barbaroſſa.*

Scarabaeus Barbaroſſa Ent. ſyſt. 1. 17. 48.*
Oliv. Inſ. 1. 3. 32. 34. tab. 12. fig. 109.
Jabl. Coleopt. tab. 9. ſig. 7.
Habitat in noua Hollandia Muſ. D. Banks.

Stentor. 43. G. thorace antice retuſo, capitis cornu re curuo, breui, clypeo bidentato.
Habitat in Isle de France Dom. Billardiere.
Maior G. Jamaicenſi. Caput paruum, clyp antice dentibus duobus validis, cornu me dio capite breuiori, obtuſo, recuruo. Th rax laeuis, glaber, nitidus, antice retuſ Elytra picea, ſtriata, ſubrugoſa. Corp atrum pedibus piceis.

Satyrus. 44. G. thorace inermi antice truncato, capi cornu recuruo capite longiori.
Scarabaeus Satyrus Ent. ſyſt. 1. 17. 49.
Oliv. Inſ. 1. 3. 39. 43. tab. 11. fig. 49.
Habitat in America boreali Muſ. Dom. Ban

Jamaicenſis. 45. G. thorace inermi antice retuſo, capitis co nu recuruo, elytris ſtriatis.
Scarabaeus Jamaicenſis Ent. ſyſt. 1. 17. 50.
Oliv. Inſ. 1. 3. 40. 44. tab. 16. fig. 148.
Drury Inſ. 1. tab. 34. fig. 1. 2.
Habitat in Jamaica.

Silenus, 46. G. thorace inermi antice excauato, capi cornu recuruo, elytris laeuiſſimis.
Scarabaeus Silenus Ent. ſyſt. 1. 18. 51.
Oliv. Inſ. 1. 3. 41. 45. tab. 8. fig. 62.
Jabl. Col. tab. 10. fig. 2.
Scopol. Del. Fl. inſ. 1. tab. 21. fig. 6.

Roſſ. Fn. Etr. 1. 3. 8.
Barr. Pl. Hiſp. tab. 163.
Habitat in Europa auſtraliori.

47. G. thorace inermi rotundato, capitis cornu recuruo. *Syrichtus.*
Scarabaeus Syrichtus Ent. ſyſt. 1. 18. 52.*
Oliv. Inſ. 1. 3. 50. 57. tab. 6. fig. 48.
tab. 20. fig. 48.
Jabl. Coleopt. tab. 11. fig. 4.
Voet Coleopt. tab. 20. fig. 138.
Habitat in America meridionali Muſ. Dom. Banks.

48. G. thorace inermi, capitis cornu emarginato, tibiis poſticis breuiſſimis apice ſpinoſis. *Hylax.*
Scarabaeus Hylax Ent. ſyſt. 1. 19. 53.
Oliv. Inſ. 1. 3. 50. 58. tab. 11. fig. 95.
Habitat in Africa Dom. Lee.
Forte potius Citonia. Scutellum triangulum.

49. G. thorace inermi rotundato, capitis cornu breuiſſimo ſubulato, corpore ſubtus rufo piloſo. *Aries.*
Scarabaeus Aries Ent. ſyſt. 1. 19. 55.
Jabl. Col. tab. 10. fig. 3.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Vahl.

50. G. thorace inermi rotundato, capitis tuberculo eleuato ſubcornuto, corpore ſubtus nudo. *Monodon.*
Scarabaeus Monodon Ent. ſyſt. 1. 20. 57.
Jabl. Coleopt. 2. tab. 17. fig. 4.
Habitat in Hungaria Dom. Smidt.

coronatus. 51. G. thorace inermi, capitis clypeo poſtice emarginato.
Scarabaeus coronatus Ent. ſyſt. 1. 20. 58.
Oliv. Inſ. 1. 3. 52. 61. tab. 12. fig. 110.
Habitat in Java Muſ. Dom. Banks.

Dionyſius. 52. G. thorace inermi excauato, capitis cornu recuruo depreſſo apice craſſiori.
Scarabaeus Dionyſius Ent. ſyſt. 1. 20. 59.
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.

Meliboeus. 53. G. thorace inermi antice inaequali, capitis cornu breuiſſimo truncato, elytris ſtriatis.
Scarabaeus Meliboeus Ent. ſyſt. 1. 20. 60.
Habitat in America boreali Dom. Lee.

didymus. 54. G. depreſſus thorace foſſula exarato, capite tricuſpido, elytris ſtriatis.
Scarabaeus didymus Ent. ſyſt. 1. 20. 61. Linn. ſyſt. nat. 2. 545. 19. Muſ. Lud. Ulr. 14.
Oliv. Inſ. 1. 3. 42. 46. tab. 2. fig. 9.
Jabl. Col. tab. 11. fig. 2.
Petiv. Gaz. tab. 27. fig. 7.
Drury Inſ. 1. tab. 32. fig. 1.
Voet Scarab. tab. 19. fig. 126.
Habitat in America.

valgus. 55. G. depreſſus thorace ſulcato mucronato, capite cornubus duobus breuibus.
Scarabaeus valgus Ent. ſyſt. 1. 21. 62. Linn. ſyſt. nat. 2. 546. 20. Muſ. Lud. Ulr. 15.
Oliv. Inſ. 1. 3. tab. 17. fig. 160.
Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 8.
Habitat Cajennae.

56. G. thorace inermi ſcabro, capite linea trans- *hircus.*
uer a carinata, clypeo bidentato.
Scarabaeus hircus Ent. ſyſt. 1. 21. 63.
Jabl. Coleopt. tab. 10. fig. 5.
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

57. G. thorace inermi punctato, capitis clypeo *punctatus.*
integro: dentibus duobus eleuatis obtuſis.
Scarabaeus punctatus Ent. ſyſt. 1. 21. 64.
Oliv. Inſ. 1. 3. 52. 60. tab. 8. fig. 70.
Jabl. Coleopt. 2. tab. 17. fig. 6.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

58. G. thorace inermi brunneus capite ſubbicor- *farctus.*
ni, elytris punctato ſtriatis apice nigris.
Scarabaeus farctus Ent. ſyſt. 1. 22. 65.
Oliv. Inſ. 1. 3. 68. 76. tab. 11. fig. 96.
Voet Coleopt. tab. 10. fig. 92.
Habitat in Penſyluania.
Forte potius Scarabaeus.

59. G. thorace retuſo, capitis cornu breui plano, *retuſus.*
femoribus poſticis incraſſatis.
Scarabaeus retuſus Ent. ſyſt. 1. 22. 66.
Oliv. Inſ. 1. 3. 46. 55. tab. 11. fig. 100.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Banks.

60. G. piceus thorace inermi glabro, capite bi- *piceus.*
corni, elytris ſtriatis.
Scarabaeus piceus Ent. ſyſt. 1. 22. 67.
Oliv. Inſ. 1. 3. 52. 63. tab. 24. fig. 211.
Jabl. Coleopt. tab. 11. fig. 3.
Fyesl. Coleopt. 1. 4. 6. tab. 19. fig. 1.
Habitat in Indiis Dom. Drury.

*** *Mutici capite thoraceque inermi.*

excauatus. 61. G. muticus thorace retuſo mucronato, cly-
peo reflexo integro.

Scarabaeus excauatus Ent. ſyſt. 1. 31. 100 *.

Scarabaeus candidae Petagn. Spec. Inſ. Cal.
9. tab. 1. fig. 6.

Melolontha cornuta Oliv. Inſ. 1. 5. 20. 16. tab.
9. fig. 74.

Cyrilli Ent. Neap. 1. tab. 1. fig. 12.

Habitat in regno Neapolitano Dom. de Schlam-
buſch.

Talpa. 62. G. muticus thorace antice mucronato, capi-
tis clypeo linea eleuata transuerſa, apice re-
flexo emarginato.

Scarabaeus Talpa Ent. ſyſt. 1. 32. 101. *

Habitat in Inſula St. Bartholomaei Dom. de
Paykull.

iuuencus. 63. G. muticus thorace antice impreſſo mucro-
nato, clypeo ſubemarginato.

Scarabaeus iuuencus Ent. ſyſt. 1. 32. 102. *

Oliv. Inſ. 1. 3. 45. 50. tab. 8. fig. 66..
tab. 16. fig. 143.

Habitat in America Muſ. Dom. Banks.

SCARABAEUS. *Palpi* quatuor filiformes.

Labium emarginatum: apicibus elongatis palpigeris.

Antennae clauato lamellatae.

93—4. Sc. thorace inermi capite tuberculis tribus, elytris ſtriatis teſtaceis. *hydrochaeris.*

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Muſ. Dom. Scheſtedt.

Statura omnino Sc. ſerutator at paullo minor. Caput nigrum tuberculis tribus: intermedio maiore, cornuto. Thorax laeuis, niger margine laterali et poſtico late teſtaceis. Elytra ſtriata, teſtacea ſtriis ſubtiliſſime crenatis. Corpus obſcurum.

94—5. Sc. ater capite quadrituberculato, elytris ſtriatis. *4tuberculatus.*

Habitat in America Dom. Hybner.

Paruus totus ater elytris ſtriatis diſtinctus tuberculis clypei quatuor transuerſis unico antice, poſtice tribus.

98—9. Sc. muticus laeuiſſimus opacus thorace longitudine elytrorum. *laeuigatus.*

Habitat in Tangier D. Schousboe Muſ. Dom. de Scheſtedt.

Paullo maior Sc. ſtercorario et diſtinctus. Capitis clypeus rotundatus puncto medio ele-

uato. Thorax magnus, laeuis, niger, opacus: margine laterali rotundato, dilatato. Scutellum breue. Elytra laeuia, opaca, nigra, breuia. Pedes dentati.

morator. 104—5 Sc. muticus ater thorace punctato elytris ſtriatis, clypeo reflexo integro.

Habitat in India orientali Dom. Hybner.

Statura et magnitudo omnino S. laboratoris. Caput et thorax glabra, vage punctata. Clypeus margine incraſſato, integro. Elytra ſtriata. Pedes nigri.

atricapillus. 124—5. Sc. muticus griſeus capite atro.

Habitat in India orientali Muſ. D. de Scheſtedt.

Minutus ſtatura Sc. quisquilii griſeus capite ſolo nigro. Elytra ſtriata.

ſabuleti. 125—6. Sc. muticus fuſcus elytris ſtriato crenatis.

Habitat in Suecia Muſ. Dom. Lund.

Paruus, obſcurus, minime nitens. Elytra crenato ſtriata.

tibialis. 127—8. Sc. muticus ater thorace varioloſo, elytris crenato ſtriatis.

Habitat in Tangier D. Schousboe Muſ. Dom. de Scheſtedt.

Statura minuta Sc. ſtercorator. Clypeus emarginatus. Thorax varioloſus, ater. Elytra crenato ſtriata. Pedes nigri tibiis inprimis anticis rufis.

ONITIS. *Palpi* poſtici compreſſi, obtuſi.
Mandibula compreſſa, membranacea, obtuſa.
Antennae clauato lamellatae.

O. ſcutellatus thorace inermi quadripunctato, capite quadrituberculato, corpore viridi aeneo. *Inuus.*
Scarabaeus Inuus Ent. ſyſt. 1. 22. 68.
Jabl. Coleopt. tab. 11. fig. 4.
Habitat in Sierra Leon.

O. ſcutellatus thorace inermi quadripunctato, capite tuberculato, elytris teſtaceis. *Aygulus.*
Scarabaeus Aygulus Ent. ſyſt. 1. 23. 69. *
Habitat in India.

O. ſcutellatus thorace inermi, capitis cornu breuiſſimo. *Clinias.*
Scarabaeus Clinias Ent. ſyſt. 1. 19. 56. *
Habitat in Hungaria.

Onitis corpus medium depreſſum, planiuſculum immarginatum, tardum, ore hirto, clypeo porrecto rotundato, integro, interdum tuberculato, oculis magnis, rotundatis, utrinque conſpicuis hamo anteriore firmante dimidiatis, poſtice inſertis, antennis breuibus ſub clypeo inſertis, thorace laeui, punctis quatuor impreſſo; marginibus deflexis, rotundatis, ſcutello interdum nullo, interdum breui, triangulari, elytris planiuſculis longitudine abdominis, pedibus breuibus, validis, femoribus craſſis, compreſſis, tibiis anticis arcuatis, extus dentatis, tarſis nullis, poſticis breuibus, antice craſſioribus, dentatis, tarſis quinque articulatis.

Lophus. 4. O. ſcutellatus thorace inermi utrinque dil to quadripunctato elytris cinereo fuſco variis.

Habitat in Saffi Dom. Schousboe Muſ. Do de Seheſtedt.

Statura et magnitudo Inui. Clypeus rotunda niger macula media cinerea tuberculo me eleuato. Thorax niger margine utrin dilatato palleſcente punctisque quatuor preſſis: poſticis approximatis. Scutell diſtinctum, acutum. Elytra cinerea, fu varia. Corpus atrum. Pedes atri, an femoribus compreſſis, intus unidentatis, biis elongatis, incuruis, intus in me unidentatis, extus multidentatis, tarſis lis. Pedes intermedii femoribus comp ſis, unidentatis tibiis breuibus extus trid tatis. *Variat* rarius elytris totis nigris.

Apelles. 5. O. ſcutellatus capitis cornu breuiſſimo, ely cinereis: punctis eleuatis atris.

Scarabaeus Apelles Ent. ſyſt. 1. 18. 53.
Oliv. Inſ. 1. 3. 141. 170. tab. 11. fig. 97.
Jabl. Coleopt. 2. tab. 13. fig. 9.
Voet Coleopt. tab. 25. fig. 33.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Sphinx. 6. O. exſcutellatus thorace punctis quatuor im preſſis, capite ſubcornuto.

Scarabaeus Sphinx Ent. ſyſt. 1. 53. 173. *
Habitat in America, Gallia meridionali.

0. exſcutellatus thorace punctis quatuor impreſſis, capite lineis duabus transuerſis, femoribus dentatis, tibiis anticis ſubtus unguiculatis. *unguiculatus.*

Scarabaeus unguiculatus Ent. ſyſt. 1. 53. 174.

Habitat in Senegallia.

0. exſcutellatus thorace punctis quatuor impreſſis, capite lineis duabus transuerſis, femoribus tibiisque anticis acute dentatis. *Belial.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura omnino Sphinx paullo maior. Capitis clypeus lineis duabus transuerſis, eleuatis: anteriore abbreuiata. Margo, ſubreflexus, emarginatus. Thorax magnus puncto utrinque duobusque baſeos dilatatis, impreſſis. Elytra laeuia, ante apicem eleuata. Femora antica dente medio interiori valido, acuto. Tibiae elongatae, arcuatae, extus multidentatae, intus ciliatae medioque unidentatae. Tarſi nulli. Femora intermedia compreſſa, clauata fulcro elongato, acuto, dentem medii ſimulante. Femora poſtica compreſſa, extus ſinu magno, exciſo, intus fulcro elongato, ſubſpinoſo.

COPRIS. *Palpi* quatuor filiformes
Mandibula nulla.
Labium rotundatum in
grum.
Antennae clauato lamellat

haſtator. 135—6 C. thorace prominente ſubemargin capite mutico.

Habitat in America boreali Dom. Hirſhel. Statura parua omnino C. nuchicornis. Ca tis clypeus rotundatus, integer, mut niger. Thorax antice prominens: promin tia elongata, depreſſa, ſubemarginata longitudine capitis, poſtice rotundatus. tra nigra.

metallicus. 142—3. C. thorace aeneo antice denticulis d bus compreſſis, capitis clypeo linea ele carinata.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

C. Seniculo minor. Capitis clypeus rotund margine reflexo et in medio lineis dua transuerſis eleuatis, carinatis. Anten

---

Copris corpus magnum, gibbum, immarginat tardum, clypeo magno, rotundato, ſaepius integ oculis paruis, rotundatis, utrinque conſpicuis, p inſertis, hamo antico firmatis, antennis breuib ſub clypeo inſertis, thorace rotundato, gibbo, m ginibus deflexis ſaepius cornuto aut inaequali, cly longitudine abdominis, pedibus breuibus, validis, f moribus craſſis, rotundatis, tibiis dentatis tarſis qu quearticulatis, colore ſaepius nigro aut obſcuro.

flaueſcentes. Thorax rotundatus, aeneus, antice utrinque retuſus et in medio prominentia bidentata. Elytra vix ſtriata, obſcura. Forte faemina.

4. C. thorace rufo: prominentia triplici, elytris flauis: puncto faſciaque nigris. *dromedarius.*

Habitat in India orientali Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Magnitudo C. nuchicornis. Antennae nigrae ſtipite rufo. Clypeus rotundatus, integer, muticus, obſcurus. Thorax gibbus, punctatus, rufus in medio prominentia triplici punctoque laterali impreſſo. Elytra ſtriata, flaua puncto baſeos, faſcià media ſinuata punctoque paruo apicis nigris. Corpus et pedes ferruginea.

5. C. ater thorace bidentato, capitis cornu erecto breui. *Pardalis.*

Habitat in India D. Daldorff.

Statura parua C. metallici. Corpus totum atrum, obſcurum. Capitis clypeus rotundatus, vix emarginatus cornu eleuato, breui, baſi latiore. Thorax punctatus, antice denticulis duobus paruis. Elytra ſubſtriata.

6. C. thorace quadricorni: cornubus intermediis depreſſis, capitis cornu breui obtuſo. *Pirmal.*

Habitat in India orientali D. Daldorff Muſ. D. de Seheſtedt.

Corpus magnum, craſſum, atrum. Clypeus magnus, porrectus, ſubſinuatus cornu ele-

uato, breui, craſſo, obtuſo. Thorax ſi
goſus cornubus quatuor: lateralibus m
nalibus, paullo breuioribus acutis, inte
diis paullo longioribus, depreſſis, ob
Elytra ſtriata.

Vertagus. 159—60. C. thorace ſubquadridentato, cl
poſtice linea eleuata bicorni.
Habitat in China Muſ. Dom. Lund.
Statura et affinitas C. Camelus. Antennae
ua teſtacea. Clypeus rotundatus in m
linea eleuata, laeui, poſtice linea ele
maiori utrinque in cornu eleuatum porr
Thorax niger antice denticulis quatuor
termediis maioribus, compreſſis, late
bus breuioribus, acutis, poſtice puncto
longo impreſſus. Elytra ſtriata, fuſca.

Melitaeus. 159—60. C. thorace quadridentato, clypeo
flexo poſtice bicorni, corpore atro.
Habitat in Tangier D. Schousboe Muſ. D.
Seheſtedt.
Statura et ſumma affinitas C. Cameli at du
minor. Clypeus niger, reflexus corn
duobus breuibus, erectis. Thorax ro
datus denticulis quatuor aequalibus, po
rotundatus, laeuis. Elytra ſublaeuia.

Meleager. 172—3. C. thorace inermi, capitis cornu br
compreſſo truncato, corpore vireſcente.
Habitat Cajennae Dom. Curier.
Statura et magnitudo C. orientalis. Capi
clypeus magnus, rotundatus, antice line

duabus transuerſis eleuatis, carinatis, poſtice cornu breui, lato, compreſſo, truncato. Antennae flaueſcentes. Thorax rotundatus, viridis puncto paruo utrinque impreſſo. Scutellum nullum. Elytra ſubſtriata, viridia. Corpus hirtum, obſcure vireſcens.

72—3. C. ater nitidus thorace rotundato, capitis cornu recuruo. *Dorcas.*

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Muſ. D. de Scheſtedt.

Minor C. orientali. Caput paruum cornu porrecto, recuruo, acuto. Thorax gibbus, ater, nitidus. Elytra laeuia, atra, immaculata. Tibiae piceae.

80—1. C. thorace mutico, capite cornubus duobus ſubflexuoſis, elytris baſi apiceque rufis. *Coruus.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura omnino C. Ibex. Capitis clypeus rotundatus, integer cornubus duobus porrectis, arcuatis in medio interiori ſubflexuoſis. Thorax punctatus, niger, immaculatus. Elytra ſubſtriata, nigra macula baſeos lunulaque apicis rufis.

84—5. C. thorace mutico, capitis clypeo cornubus duobus erectis, coleoptrorum limbo griſeo. *nuchidens.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Corpus paruum, nigrum. Clypeus rotundatus margine ſubreflexo, in medio linea ele-

uata, acuta, poſtice cornubus duobus er-
ctis, breuibus. Antennae teſtaceae. Tho-
rax ater, nitidus, laeuis. Coleoptra ſtri-
ta, nigra limbo omni griſeo. Pedes nig-
femoribus ferrugineis.

Faemina ſimillima at inermis.

Variat elytris lituris nigris et griſeis immacu-
latis.

Antilope. 185—6. C. thorace mutico aeneo, clypeo cor-
nubus duobus erectis, corpore ferrugin-

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Capitis cl-
peus rotundatus occipite cornubus duob-
erectis. Thorax laeuis, aeneus, nitid-
Elytra ſtriata ferruginea. Corpus ferru-
neum.

Vitulus. 185—6. C. ater thorace mutico retuſo, capi-
cornubus duobus baſi coronatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura parua praecendentium. Clypeus rotun-
datus, ſubemarginatus cornubus duobus
rectis, ſubrectis, baſi coronatis. Thorax la-
uis, antice valde retuſus. Elytra ſtriata, im-
maculata.

Dama. 185—6. C. thorace mutico, clypeo cornubus
duobus erectis, corpore aeneo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis videtur C. Trago. Antennae teſtacea.
Capitis clypeus rotundatus, integer cornu-
bus duobus erectis, rectis. Thorax omnino

muticus, leuis, aeneus, obſcure nitidus. Elytra ſtriata, aenea. Corpus ſubtus fuſcum.

Faemina minor mutica.

96—7. C. thorace mutico aeneo, capitis cornu erecto acuto, elytris teſtaceis. *centrunornis.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Minutus. Capitis clypeus rotundatus, ſubemarginatus in centro cornu erecto, acuto. Thorax rotundatus, aeneus, nitidus. Elytra ſubſtriata teſtacea. Corpus nigrum pedibus teſtaceis.

95—7. C. niger thorace mutico, capitis clypeo ſubreflexo: cornu erecto acuto. *unicornu.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Minutus. Capitis clypeus reflexus, vix emarginatus in medio cornu erectum, breue, acutum. Thorax inermis, niger. Elytra vix ſtriata, nigra. Pedes picei.

98—9. C. thorace inermi rotundato, clypeo emarginato poſtice cornubus tribus erectis: medio breuiore. *furculus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis C. furcato at triplo minor et diſtinctus. Capitis clypeus emarginatus cornubus tribus erectis approximatis: intermedio breuiore. Thorax rotundatus, villoſus, niger. Ely-

tra ſubſtriata, nigra macula baſeos apicisque obſcure ferrugineis.

4dentatus. 203—4. C. ater thorace inermi, capitis clypeo poſtice quadridentato.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Statura parua praecedentium. Clypeus rotundatus margine ſubreflexo, vix emarginatus in medio iugonatus, poſtice eleuatus dentibus quatuor. Thorax rotundatus, laeuis nitidus. Elytra ſtriata.

Faemina ſimillima at inermis.

ſanctus. 209—10. C. muticus cupreo nitens clypeo ſexdentato, thorace utrinque ſerrato, elytris porcatis.

Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Duplo minor C. ſacer. Clypeus ſexdentatus niger. Thorax punctatus, cupro nitens utrinque angulatus, ſerratusque. Elytra ſtriata et inter ſtrias punctis plurimis impreſſis.

cyaneus. 211—2. C. muticus clypeo ſexdentato cyaneus thorace punctato elytris rugoſis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo C. Koenigii. Clypeus rotundatus dentibus ſex breuioribus. Thorax cyaneus, nitidus, punctatus. Elytra cyanea, valde rugoſa. Corpus coeruleo nigrum.

320—1. C. gibbus laeuis ater pedibus elongatis. *Helwigii.*
Habitat Tranquebariae D. Daldorff Muſ. Dom. Lund.

Statura omnino C. Schaefferi at minutus. Clypeus vix emarginatus. Thorax valde elongatus, niger. Pedes elongati femoribus clauatis.

26—7. C. muticus glaber ater clypeo rotunda- *laeuigatus.*
to, elytris ſtriatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Maior C. ouato et diſtinctus videtur. Caput et thorax laeuia, atra, immaculata. Elytra ſtriata. Pedes nigri.

1—2. C. muticus ater nitidus elytris griſeis: *politus.*
faſcia media atra.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Minutus, nitidiſſimus. Capitis clypeus rotundatus, biugonatus, ſubemarginatus. Thorax laeuis, nitidus. Elytra ſtriata, griſea faſcia media, inaequali, fuſca. Pedes picei.

3—4. C. muticus laeuis violaceo nitens ano *violaceus.*
rufo.

Scarabaeus violaceus Oliv. Inſ.

Habitat in Inſula St. Domingo Muſ. Dom. Boſc.

Statura praecedentis totus laeuis, violaceo nitens antennarum claua anoque fine ultimo ſegmento prominente rufis. Clypeus bidentatus.

6—7. C. muticus ater antennis teſtaceis, ely- *aterrimus.*
tris ſubſtriatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino et magnitudo C. ouati at di-ſtinctus videtur. Antennae teſtaceae. Cly-peus rotundatus, integer. Thorax rotun-datus, muticus. Elytra ſubſtriata longitu-dine abdominis.

puſillus. 238. C. muticus pubeſcens obſcurus clypeo ro-tundato integro.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino C. ouati at triplo minor, tot pubeſcens, obſcurus.

variegatus. 239. C. muticus clypeo emarginato, thorace el-trisque fuſco flauoque variegatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Magnitudo praecedentis. Capitis clypeus r-tundatus, emarginatus, niger. Thorax r-tundatus. Elytra ſubſtriata fuſco pallidoq variegata. Pedes pallidi.

paruulus. 240. C. muticus clypeo emarginato; corpore n-gro immaculato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus minutum, totum nigrum, immacu-tum. Clypeus emarginatus. Elytra ſtriat

fuſcopun-ctatus. 241. C. muticus niger thorace elytrisque griſe fuſco punctatis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Minutus. Capitis clypeus rotundatus, niger antice emarginatus. Thorax rotundatus griſeus poſtice punctis aliquot fuſcis. Ely-tra ſtriata, griſea punctis tribus fuſcis. Cor

pus nigrum pedibus griſeis. Scarabaei exſcutellati in Entomologia ſyſtematica enumerati ad hoc genus pertinent.

HISTER. *Maxilla* unidentata.
Labium corneum, cylindricum, integrum.
Antennae claua ſolida.

1—2. H. ater nitidus elytris externe ſtriatis, mandibulis capite longioribus. *inaequalis.*

Hiſter laeuis Roſſ. Fn. Etr.

Habitat in Germánia Dr. Panzer.

Maior H. unicolori totus ater, nitidus, immaculatus. Mandibulae magnae, exſertae, inaequales, capite longiores, Palpi ferruginei. Antennae nigrae. Thorax laeuis, ater, nitidus. Elytra atra, abbreuiata verſus marginem oblique ſtriata, ad ſuturam laeuia. Pedes atri.

2—3. H. ater nitidus elytris ſtriatis, capite punctis duobus impreſſis. *impreſſus.*

Habitat Kiliae.

Statura et magnitudo, omnino H. unicoloris at diſtinctus punctis duobus frontalibus, impreſſis. Elytra usque ad apicem ſtriata. Tibiae omnes ſerratae.

4—5. H. ater nitidus elytris abbreuiatis, abdomine acuto. *acuminatus.*

Habitat in Galliae Alpibus Dom. Bronguiart.

Statura omnino praecedentium ater, nitidus. Elytra baſi vix ſtriata apice vix punctata. Abdomen valde prominet acutum.

2 puſtulatus. 16—17. H. ater elytris ſtriatis: puncto medio rubro, capite retuſo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Differt omnino ab H. 2maculato duplo maior. Caput mandibulis exſertis muticis fronte retuſa. Thorax laeuis, ater, nitidus angulo antico utrinque puncto impreſſo. Elytra ſtriata ſtria interiore abbreuiata, atra puncto medio diſtincto, rubro. Tibiae anticae valde dentatae.

pulchellus. 16—7. H. viridi aeneus elytris ſtriatis: puncto poſtico rufo, ano cupreo.

Habitat Tranquebariae D. Daldorff Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Paruus. Caput et thorax viridi aënea, nitida, immaculata. Elytra inprimis ad latera ſtriata, abbreuiata puncto magno verſus apicem rufo. Anus prominens cupro nitens.

erythropterus. 16—17. H. ater nitidus elytris ſtriatis apice rufis.

Oliv. 8. tab. 2. fig. 12. a. b.

Habitat Tranquebariae Daldorff Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Affinis certe H. 2puſtulato at diſtinctus videtur. Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Elytra ſtriata, apice late rufa, qui color inprimis ad marginem exteriorem extenditur.

19. H. ater nitidus laeuiſſimus elytris punctis duobus albis. *4guttatus.*

Habitat — — D. Seidelin Muſ. Dom. Lund.

Medius. Caput et thorax atra, nitida, laeuiſſima, immaculata. Elytra laeuia punctis quatuor albis: exteriori marginali, interiori verſus angulum ani.

SPHAERIDIUM. *Palpi* quatuor filiformes.

Labium quadratum, emarginatum.

Antennae claua perfoliata.

9. S. atrum coleoptris obſcure rufis: maculis quinque nigris. *5maculatum.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo S. glabrati. Caput et thorax glabra, atra, nitida, immaculata. Elytra obſcure rufa maculis tribus magnis nigris baſeos maiori, communi.

30. S. atrum nitidum elytris ferrugineis. *Wintherae.*

Habitat in cortice Canellae albae Muſ. Dom. Lund.

Corpus minutum. Caput et thorax atra laeuia, nitida, immaculata. Elytra laeuiſſima, ferruginea. Abdomen et pedes ferruginea.

OPATRUM. *Palpi antici* clauati: claua oblique truncata.
poſtici filiformes.
Labium ſubemarginatum.
Antennae moniliformes extrorſum craſſiores.

bifurcum. 1—2. O. obſcurum thorace cornubus duobus incuruis ſubtus barbatis, capitis cornu erecto emarginato.

Habitat in Carolinae Boletis Dom. Boſc.

Statura et magnitudo O. ſabuloſi. Caput fuſcum cornu eleuato, lato, capite longiore apice truncato, emarginato. Thorax lineis eleuatis in medio cornubus duobus porrectis incuruis ſubtus barbatis. Margo valde dentatus. Elytra fuſca lineis eleuatis quatuor nodulosis. Pedes fuſci.

Faemina capite mutico et thorace tuberculis tantum duobus loco cornuum.

reticulatum. 1—2. O. obſcurum thorace depreſſo marginato, elytris cineraſcentibus reticulatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Gigas in hoc genere. Caput fuſcum ore ſubferrugineo. Thorax laeuis, depreſſus, fuſcus margine parum craſſiore. Elytra cineraſcentia, reticulata.

fuſcum. 1—2. O. griſeum thorace plano marginato, elytris linea eleuata unica ſubdentata.

Habitat in Hiſpania Prof. Abildgaard Muſ. D. Lund.

Statura et ſumma affinitas O. griſei. Caput griſeum. Thorax planus griſeus, in medio canaliculatus margine dilatato, reflexo. Elytra griſea linea media eleuata, poſtice ſubdentata, quae tamen apicem haud attingit.

2. O. fuſcum thorace plano marginato, elytris eleuato punctatis. *obſcurum.*

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Daldorff Muſ. D. de Scheſtedt.

Statura praecedentium obſcurum. Thorax marginatus, canaliculatus. Elytra plana punctis plurimis eleuatis.

5. O. griſeum thorace elytriſque laeuibus, clypeo emarginato. *depreſſum.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura et ſumma affinitas O. glabrati at duplo maior et clypeus emarginatus.

12. O. atrum punctatum tibiis anticis dilatatis dentatis. *ſubterraneum.*

Habitat in India orientali Muſ. Dom. Lund.

Duplo maior O. tibiali. Corpus totum atrum, nitidum, punctatum. Pedes antici tibiis apice dilatatis, dentatis.

14. O. nigricans thorace laeui: margine integro, elytris crenato ſtriatis. *ſtrigatum.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Corpus paruum totum griſeo nigrum. Caput et thorax laeuia margine integro. Elytra crenato ſtriata. Tibiae anticae ſimplices.

canalicula-tum. 15—6. O. cinereum elytris ſtriatis: ſtriis mu-catis.

Habitat Tranquebariae D. Daldorff Muſ. D. Scheſtedt.

Corpus paruum, totum griſeum. Capitis c-peus integer. Thorax in medio canalicu-tus, ſcaber. Elytra ſtriata ſtriis muricat Tibiae anticae dentatae.

ERODIUS. *Palpi* quatuor filiform
Maxilla cornea, trun-ta, bifida.
Labium corneum, em-ginatum.
Antennae moniliformes.

muricatus. 2—3. E. gibbus ater elytris muricatis.

Habitat ad Cap. B. Spei Muſ. Dom. Lund.

Magnitudo et ſtatura omnino E. gibbi. Ca et thorax laeuia, atra. Elytra connata, a punctis magnis eleuatis muricata.

SCAURUS. *Palpi* inaequales, filifo-mes.
Maxilla obconica, un-dentata.
Labium corneum, inte-grum.
Antennae moniliformes.

calcaratus. 4. Sc. ater elytris ſtria ſeſquialtera femoribus an-ticis dentibus duobus: exteriore maiore ar-cuato.

Habitat in Marocco Schousboe Muſ. Dom. de Scheſtedt.

Statura praecedentium. Thorax gibbus, laeuis, ater. Elytra ſtria ſeſquialtera. Pedes antici parum longiores femoribus ante apicem dentibus duobus: exteriore multo maiore, validiore, acuto. Tibiae inermes.

Sc. ater elytris punctatis: lineis eleuatis duabus, femoribus unidentatis. *punctatus.*

Habitat in Marocco Muſ. D. Lund.

Statura praecedentium totus ater, diſtinctus elytris punctatis lineis duabus eleuatis, integris. Femora unidentata. Tibiae inermes.

SCARITES. *Palpi* ſex filiformes.
Labium corneum, dentatum.
Antennae moniliformes.

3. S. ater thorace rugoſo elytris ſtriatis. *grandis.*

Habitat in Braſilia Dom. Weber.

Magnus. Mandibulae porrectae, baſi bidentatae. Thorax poſtice anguſtatus, rugoſus, ater. Elytra ſtriata. Tibiae anticae digitatae, intermediae rufo ciliatae, bidentatae, poſticae rufo ciliatae.

5. S. ater nitidus elytris obſcuris porcatis. *porcatus.*

Habitat in India orientali Muſ. Dom. de Scheſtedt.

Statura praecedentis. Caput atrum, nitidum ſulcis duobus exaratum antennisque ſulcis.

Thorax ater, nitidus punĉto antico utri impreſſo. Elytra obſcura, ſtriata et ſtriis punĉtis flaueſcentibus impreſſa. atri tibiis anticis palmato digitatis.

2puſtulatus. 8—9 S. ater elytris ſtriatis: macula poſtica ferruginea.

Habitat in America boreali Muſ. Dom. Hy

Duplo maior Sc. arenario eiusdemque ſta

Caput et thorax laeuia, atra, nitida. El ſtriata, nigra macula magna ante ap ferruginea.

cylindrus. 8—9. S. ater nitidus thorace cylindrico, el crenato ſtriatis, pedibus ferrugineis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Mandibulae vix exſertae. Caput et thorax punĉtata, atra, nitida. Elytra crenato ata. Abdomen et pedes ferruginea anticis digitatis.

PIMELIA. *Palpi* quatuor filiformes. *Maxilla* unidentata. *Labium* membranaceum rotundatum, emarginatum. *Antennae* filiformes, apice moniliformes.

crenata. 16—7. P. thorace glabro atra elytris ſtriis tribus eleuatis ſerratis.

Habitat in Saffi D. Schousboe Muſ. Dom. de Sehestedt.

Diſtincta omnino a P. dentata. Caput glabrum, atrum. Thorax glaber lateribus parum muricatis. Elytra atra, laeuia lineis tribus eleuátis, ſerratis. Pedes nigri.

—2. P. thorace marginato atra elytris lineis duabus lateralibus eleuatis. *planata.*

Habitat Tangier Dom. Schousboe.

Corpus magnum laeue, atrum. Thorax planus, marginatus: marginibus rotundatis, nullo modo ſpinoſis. Elytra connata, laeuia lineis tantum duabus lateralibus, eleuatis: interiore abbreuiata. Pedes inermes.

—5. P. thorace marginato: marginibus reflexis, elytris linea media eleuata dentata. *varioloſa.*

Blaps varioloſa Panz. In. Fn. Germ.

Habitat in Germania auſtraliori Dom. Panzer.

Praecedentibus minor. Caput et thorax fuſca, obſcura, laeuia thoracis marginibus reflexis. Elytra lineola baſeos punctisque ſparſis eleuatis ſcabra. Linea media valde eleuata, dentata, quae tamen apicem haud attingit. Pedes inermes.

—2. P. glabra atra elytris punctato ſtriatis. *punctata.*

Habitat Tanger Schousboe Muſ. Dom. de Sehestedt.

Statura omnino P. glabrae at elytra punctato ſtriata.

5. P. globoſa atrata elytris crenato ſtriatis. *pygmaea.*

Habitat in Succia Dom. de Paykull.

Minuta vix magnitudine Pediculi tota atra e-
tris punctato ſtriatis.

BLAPS. *Palpi* quatuor clauati.
Maxilla recta, bifida.
Labium membranaceum, ...
ſum.
Antennae apice moniliſo-
mes.

obtuſa. 3—4. B. oblonga atra coleoptris obtuſis laeuib...
Habitat in Europa.
Statura et magnitudo B. mortiſagae. Corp...
totum atrum, laeuiſſimum, immaculatum.
Elytra nullo modo acuminata.

ſpinipes. 5—6. B. ouata atra elytris laeuibus, tibiis an...
cis apice dilatato ſpinoſis.
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.
Duplo maior B. bupreſtoides. Caput et thorax
laeuiſſima, atra, immaculata. Elytra vi...
punctata. Tibiae anticae apice dilatatae
ſpinoſae.

calcarata. 5—6. B. ouata atra elytris punctato ſtriatis, fe-
moribus anticis dentatis.
Habitat ad Cap. B. ſpei Dom. Weber.
Media. Caput et thorax laeuia, atra, imma-
culata. Elytra atra, punctato ſtriata. Pe-
des antici elongati femoribus acute den-
tatis.

9. B. ouata depreſſa nigra thoracis marginibus dilatatis, tibiis quatuor anticis unidentatis. *dentipes.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. de Paykull.

Corpus magnum, ouatum, depreſſum capite obtuſo ſubemarginato. Thorax latus, depreſſus, laeuis, obſcurus margine utrinque dilatato rotundato. Elytra connata, ſubſtriata, obſcura, apice inflexa. Tibiae quatuor anticae dente medio, valido obtuſo.

9. B. ouata nigra thorace depreſſo marginato, elytris crenato ſtriatis. *dilatata.*

Habitat in Inſula St. Thomas Muſ. Dom. Lund.

Magnitudo B. emarginatae. Antennae nigrae apice ferrugineae. Caput et thorax atra, laeuia, nigra thoracis margine rotundato, dilatato, integro. Elytra ſtriata ſtriis crenatis.

12. B. fuſca thorace marginato, elytris lineis tribus eleuatis undatis. *undata.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura praecedentium obſcure fuſca. Caput et thorax laeuia thoracis margine exſerto, rotundato. Elytra ſtriis tribus valde undatis, eleuatis, quae tamen apicem haud attingunt. Pedes ſimplices.

13. B. thoracis margine incraſſato, elytris lineis tribus eleuatis crenatis. *ſerrata.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. de Paykull.

Media. Caput obtuſum, emarginatum. Thorax planus poſtice lineolis duabus antice co-

euntibus, eleuatis margineque valde ele-
to, incraſſato, ſubtus ſerrulato. Elytr-
neis tribus eleuatis, abbreuiatis, cren-
Corpus obſcurum.

tibialis. 13—14. B. atra elytris ſtriatis, tibiis anticis d-
tato triangularibus.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. de Paykull.

Caput et thorax laeuia, atra, nitida. El-
ſtriata. Tibiae anticae apice valde dilat-
triangulares.

TENEBRIO. *Palpi* inaequales.
antici clauati.
poſtici filiformes.
Maxilla bifida.
Labium truncatum,
tegrum.
Antennae moniliform-

violaceus. 2—3. T. oblongus cyaneus thorace punctato e-
tris punctato ſtriatis aeneis nitidis.

Habitat in Braſilia D. Weber.

Statura et magnitudo T. cyanei. Caput et tho-
rax cyanea, punctata, nitida. Elytra ſtr-
to punctata, aenea, nitida. Corpus cy-
neum abdomine parum aeneo.

aeneus. 2—3. T. niger cupro nitens elytris ſubſtriatis ae-
neis.

Habitat in America meridionali Muſ. Dom.
Lund.

Statura magna praecedentium. Antennae nigrae. Caput et thorax immarginata, glabra, nigra cupro obſcure nitida. Elytra ſtriata, aenea, nitida. Corpus obſcurum. Pedes inermes, nigri.

12. T. oblongus ater nitidus elytris ſtriatis. *variabilis.*

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Muſ. Dom. Lund.

Corpus medium reliquis longius. Antennae obſcurae, omnino moniliformes. Caput et thorax plana, laeuia, atra, immaculata. Elytra ſtriata ſtriis laeuibus. Pedes inermes.

Variat corpore ferrugineo nullo modo diſtinctus.

6. T. alatus laeuis ferrugineus ore antennisque nigris. *brunneus.*

Habitat in Indiis Dom. Mauerhoff.

Statura omnino T. culinaris at duplo maior. Antennae breues, nigrae. Mandibulae exſertae, validae, nigrae. Caput et thorax laeuia, glabra, ferruginea, immaculata. Pedes ferruginei.

20. T. ater laeuis capite rotundato. *glabratus.*

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Paruus, totus ater, glaber, nitidus. Clypeus rotundatus.

6. T. ater elytris laeuibus: macula baſeos transuerſa ſanguinea. *ellipticus.*

Habitat in Carolina ſub arborum corticibus Dom. Boſc.

Statura parua T. mauritanicae. Caput et th
rax laeuia nigra, minime nitida, immac
ta. Elytra laeuia, nigra, opaca macula m
na baſeos transuerſa, ſinuata ſanguinea.
des nigri.

TROGOSITA. *Palpi* aequales: a
culo ultimo tr
cato.
Maxilla unidentat
Labium corneum
fidum: laciniis
tundatis, ciliatis
Antennae monili
mes: articulis
bus ultimis cra
ribus, ſubcomp
ſis.

bicolor. 1—2. T. ferruginea thoracis macula elytris nigris.

Habitat in America boreali Dom Mauerho

Corpus medium. Caput ferrugineum an
nis oculisque nigris. Thorax laeuis, gla
ferrugineus macula media nigra. Elytra
uia, nigra. Corpus ferrugineum pedi
nigris.

picipes. 1—2. T. oblonga nigra thorace punctato, pe
bus piceis.

Habitat in Europa.

Corpus magnum in hoc genere totum nigrum pedibus piceis. Thorax punctatus dorſo plano. Elytra vix ſtriata.

2. T. nigra thorace ouali marginato, elytris crenato ſtriatis. *gigas.*

Habitat in Guinea Muſ. Dom. Lund.

Statura omnino T. caraboides at triplo maior. Caput et thorax atra, obſcura, vix puncta-ta. Elytra crenato ſtriata. Tibiae omnes obſolete ſerratae.

6. T. ferruginea mandibulis porrectis recúruis corniformibus. *cornuta.*

Habitat in Tanger Dom. Schousboe Muſ. Dom. Lund.

Corpus paruum, totum ferrugineum. Capitis clypeus rotundatus in medio denticulis duobus breuibus, erectis. Mandibulae exſertae, porrectae, reflexae, acutae, corniformes. Thorax planus punctis duobus magnis dorſalibus, impreſſis. Elytra ſubſtriatata.

HELOPS. *Palpi* inaequales.
antici ſecuriformes.
poſtici clauati.
Labium corneum integrum.
Antennae filiformes.

5 H. niger thorace elytrisque viridi aeneis cupro ſtriatis. *micans.*

Habitat in America boreali Dom. Mauerho[ff]
Statura omnino H. lanipes. Caput fuſcum [vi]ridi cuproque micans antennis nigris. Th[o]rax viridi aeneus lineis tribus ſtrigaque a[d] margines cupreis. Elytra ſtriata, aenea [li]neis cupreis, latis micantibus. Corpus [et] pedes nigra.

calcaratus. 12—3. H. niger elytris punctato ſtriatis obſc[ure] aeneus tibiis anticis acute dentatis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura et magnitudo H. haemorrhoidalis. [Ca]put et thorax obſolete punctata, nigra, obſc[ure] aenea. Pedes nigri tibiis anticis in medio ac[ute] dentatis. Alium paullo maiorem elytris a[...] tibiis inermibus miſit Dom. Hybner vix [spe]men diſtinctum.

faſciculatus. 13—14. H. niger obſcurus elytris laeuib[us] punctis faſciculato piloſis ferrugineis.

Habitat in India orientali Muſ. Dom. Lund.

Statura omnino H. luridi at minor. Caput [ob]ſcurum. Thorax laeuis marginibus rot[un]datis. Elytra haud ſtriata punctis faſcicu[la]to piloſis, ferrugineis. Pedes inermes.

Variat magnitudine. Aetate pili euaneſcu[nt].

planus. 21—2. H. oblongus planus thorace quadrato, e[ly]tris ſtriatis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Medius. Caput et thorax ſubtiliſſime punct[a]ta. Thorax planus, quadratus. Elytra cre[]nato ſtriata, nigra. Pedes inermes, nigri.

23. H. ater elytris punctato ſtriatis antennarum ultimo articulo ſcutelloque rufis. *obliquatus.*

Habitat in Carolina ſub arborum corticibus Dom. Boſc.

Nimis affinis H. Pimelia ad corpus magis atrum et ſcutellum rufum.

4. H. niger elytris punctato ſtriatis, femoribus rufis. *femoratus.*

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo praecedentis. Caput et thorax laeuia, obſcura, nigra, immaculata. Elytra punctato ſtriata. Pedes nigri femoribus rufis.

24. H. niger obſcurus pedibus ferrugineis: tibiis anticis dentatis. *ſpinipes.*

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura H. nigritae at duplo minor. Antennae nigrae. Caput et thorax nigra, obſcura. Elytra ſtriata. Pedes ferruginei tibiis anticis in media unidentatis.

26. H. ferrugineus elytris ſubuilloſis ſtriatis. *ferrugineus.*

Habitat in Tanger D. Schousboe Muſ. Dom. Lund.

Statura et magnitudo H. quisquilii. Corpus totum ferrugineum, obſcurum. Elytra ſimpliciter ſtriata.

CARABUS. *Palpi* ſex: articulo ultim obtuſo, truncato.
Labium integrum, trun catum.
Antennae filiformes.

excellens. 9—10. C. apterus ater thorace elytriſque cy neis: margine aureo.

Habitat in Moldavia Muſ. Dom. Lund.

Statura et magnitudo C. cyanei. Caput atrum immaculatum. Thorax cyaneus margin exteriori late aureo. Elytra punctis intric tis rugoſa, cyanea margine exteriori late a reo, nitido. Corpus atrum.

melancholicus. 28—9. C. apterus obſcurus elytris ſulcatis: ſu cis laeuibus.

Habitat in Tanger Dom. Schousboe Muſ. Dom Lund.

Statura et magnitudo praecedentium. Anten nae nigrae apice piceae. Caput atrum ocu lis pallidis. Thorax cordatus linea dorſal baſeosque utrinque impreſſa. Elytra obſcu ra ſulcata: ſulcis abbreuiatis linea eleuata, obſoleta. Corpus nigrum.

maurus. 49—50. C. alatus ater nitidus elytris ſtriatis.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Statura et magnitudo omnino C. terricolae at totus ater, immaculatus. Elytra ſimplici ter ſtriata.

ſpoliatus. 61—2. C. alatus aeneus elytrorum margine pal lido, antennis tibiisque rufis.

Carabus ſpoliatus Roſſ. Fn. Etr. 1. 33.
Habitat in Marocco Dom. Schousboe.
Statura C. marginati. Caput aeneum ore antennisque rufis. Thorax cordatus baſi utrinque lineolaque media impreſſis. Elytra ſtriata aenea margine late pallido. Corpus nigro aeneum. Pedes ferruginei femoribus nigris.

8—9. C. alatus niger elytris ſtriatis: lunula baſeos maculaque poſtica teſtaceis. *4notatus.*
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus paruum, nigrum. Antennae teſtaceae. Thorax cordatus, laeuis. Elytra ſtriata lunula in medio baſeos maculaque transuerſa poſtica teſtaceis. Pedes picei.

0—1. C. alatus viridi aeneus elytris punctis quatuor impreſſis. *8punctatus.*
Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff.
Corpus paruum, viridi aeneum, antennis nigris. Elytra punctis quatuor ſecundum ſuturam impreſſa. Pedes obſcure rufeſcentes femoribus nigris.

74—5. C. alatus viridi aeneus antennis pedibusque nigris. *feſtinans.*
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Minutus. Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput poſtice attenuatum, viridi aeneum, immaculatum. Thorax cordatus, aeneus linea dorſali impreſſa. Elytra ſtriata, viridia, apice truncata. Pedes nigri.

rugoſus. 75—6. C. apterus ater thorace poſtice anguſt rugoſo, elytris ſulcatis: ſulcis rugoſis.

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Maximus. Antennae baſi atrae, apice fuſc Palpi porrecti: articulo ultimo maiori, co preſſo, acuto. Thorax marginatus, poſtice guſtatus, ſupra rugoſus. Elytra connata, ſu cata ſulcis punctis eleuatis vel potius ru notatis. Corpus atrum.

depreſſus. 89—90. C. alatus depreſſus punctatus niger th race ſubſulcato.

Habitat in Mauritania Dom. Schousboe, in I dia orientali Daldorff. Muſ. Dom. de Seh ſtedt.

Medius. Antennae ſetaceae, corpore brevi res, griſeae articulo primo maiori, incurv nigro. Caput magnum, atrum, punct tum. Thorax depreſſus, poſtice anguſtatu punctatus, ſulcisque aliquot impreſſus. El tra punctata, plana, nigra. Pedes nigri.

hilaris. 92—3. C. alatus flauus elytris ſtriatis nigris: fa ciis duabus flauis; poſteriore terminali.

Habitat in India orientali Daldorff. Muſ. Dom Lund.

Statura et magnitudo fere C. 2maculati. Ca put flauum, immaculatum. Thorax poſti ce anguſtatus, laeuis margine antico poſti coque atro. Elytra ſtriata, poſtice trunca ta, atra faſcia media, lata, flaua, quae ta men ſuturam haud attingit. Faſcia poſtica

anguſtior, terminalis. Pectus atrum. Pedes flaui.

5. C. apterus ater obſcurus elytris ſtriatis, antennis. *caliginoſus.*

Carabus caliginoſus Spec. Inſ. 1.

Habitat in America.

Corpus magnum, totum obſcure nigrum. Antennae totae teſtaceae. Thorax laeuis lineis nullis impreſſis. Elytra ſtriata.

6. C. apterus ater thorace linea utrinque baſeos impreſſa, elytris ſtriatis. *impreſſus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Paullo minor C. ſtriola totus ater, nitens. Caput utrinque ante oculos impreſſus. Thorax glaber, nitens linea dorſali baſeosque utrinque impreſſa. Elytra ſtriata. Pedes nigri.

3. C. apterus thorace viridi aeneo, elytris ſtriatis: macula poſtica pedibusque flauis. *poſticus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus medium. Caput et thorax laeuia, glabra viridi aenea. Elytra ſtriata, nigra macula poſtica fulua. Corpus atrum pedibus fuluis.

7. C. alatus ater capite thoraceque cupreis, elytris ſtriatis aeneis. *tricolor.*

Habitat Kiliae Dom. Weber.

Statura C. cuprei at paullo maior. Caput cupreum ore antennisque nigris. Thorax transuerſus, cupreus linea media lineolisque utrinque duabus baſeos impreſſis. Elytra ſtriata, viridia, nitida. Corpus atrum

nteger. 128—9. C. alatus ater nitidus elytrorum ſtr laeuiſſimis, antennis pedibusque ferrugin
Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Rohr.
C. lato maior et omnino diſtinctus. Caput thorax atra, laeuia, nitida. Elytra ſtri ſtriis laeuiſſimis. Antennae et pedes fer ginei.

alpinus. 128—9. C. alatus ater elytris ſtriatis: diſco f rugineo.
Carabus alpinus Payk. Monogr. 115. 73.
Habitat in Sueciae alpibus Muſ. Dom. Payk
Medius. Antennae nigrae articulo primo ru Caput atrum. Thorax ater linea media p ctisque baſeos impreſſus. Elytra ſtriata ſcure rufa margine ſuturaque nigris. C pus atrum. Pedes ferruginei.

St. Crucis. 139—40. C. alatus niger elytris ſtriatis pallid macula communi dorſali fuſca.
Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Rohr.
Statura praecedentis. Caput et thorax at nitida, laeuia antennis mandibulisque ru Elytra ſtriata, pallida macula magna, com muni, dorſali, fuſca. Pedes pallidi.

palliatus. 145—6. C. alatus nigro aeneus elytris ſtriis du bus punctorum impreſſorum: margine p dibusque pallidis.
Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.
Statura parua praecedentium. Caput nigro ae neum, obſcure nitidum ore antennisque te ſtaceis. Thorax immaculatus. Elytra ſub

ſtriata punctisque impreſſis in duplici ſerie margineque exteriori pallido. Pedes pallidi.

6—7. C. alatus niger ore antennis pedibusque *flauilabris.* rufis, elytris ſubſinuatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis praecedenti at diſtinctus et paullo maior. Elytra ſtriata, apice ſinuata.

7—8. C. alatus niger elytris vitta abbreuiata *ſemivittatus.* interrupta alba.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Paruus. Caput atrum ore antennisque piceis. Thorax tranſuerſus, ater, immaculatus. Elytra ſtriata, nigra, vitta media pone medium interrupta, apice dilatata, ſinuata, quae tamen elytrorum apicem haud attingit. Pedes picei.

30—1. C. thorace rotundato rufo, elytris atris: *2vittatus.* vittis duabus abbreuiatis albis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura parua praecedentium. Caput atrum. Thorax rufus, nitidus, immaculatus. Elytra apice fere emarginata, atra vittis duabus abbreuiatis albis exteriore breuiore. Corpus nigrum.

31—2. C. alatus ater elytris ſtriatis: punctis *4puſtulatus.* duobus albis. Linn. ſyſt. Nat. 2, 673. 39. Paykull Monogr. 91. 56.

Carabus 4guttatus Panz. Fn. Germ. Init. 40. tab. 5.

Habitat in Europa boreali.

Omnino diſtinctus a C. 4maculato.

ſmaragdulus. 184—5. C. alatus coeruleſcenti micans el[...] puncto poſtico antennis pedibusque teſta[...]

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum atrum. Caput et thora[...] uia, glabra, coeruleo micantia. Elytra [...] ata, coeruleo micantia puncto poſtico te[...] ceo. Pedes teſtacei.

cruciger. 185—6. C. alatus ater elytris ſtriatis baſi ſut[...] que ferrugineis.

Habitat in Saxonia.

Paruus. Antennae ferrugineae, apice nig[...] Caput nigrum. Thorax niger linea m[...] impreſſus. Elytra ſtriata, nigra baſi ſut[...] que ferrugineis. Pedes ferruginei.

CICINDELA. *Palpi* ſex filiformes, *poſtici* piloſi. *Labium* corneum, [...] dentatum. *Antennae* ſetaceae.

cyanocephala. 2—3. C. thorace elongato cylindrico rufa ca[...] te elytrorumque faſciis duabus cyaneis.

Habitat in India orientali Dom. de Seheſtedt.

Corpus paruum, elongatum. Antennae fe[...] rugineae. Caput cyaneo-atrum, nitidum. Thorax valde elongatus, cylindricus, antice parum anguſtatus, rufus, immaculatus. Elytra vix ſtriata, rufa faſcia parua baſeos alteraque pone medium latiore cyaneis. Corpus ſubtus cinereo villoſum.

—11. C. hirta viridi aenea elytris faſcia lunulisque duabus albis. *ſinuata.*
Cicindela ſinuata Panz. Fn. Germ.
Habitat in Germania auſtraliori.
Affinis certe C. hybridae at duplo minor. Caput viridi aeneum labio albo. Thorax viridi aeneus, albo hirtus. Elytra viridia lunula baſeos, faſcia media ſinuata lunulaque lata apicis albis. Corpus aeneum albo hirtum.

—2. C. nigra elytris punctis duobus marginalibus lunulaque apicis albis. *obſcura.*
Habitat in America boreali Dom. Hirſhel.
Statura et magnitudo C. germanicae. Caput nigrum labio flauo. Thorax niger lateribus vix albidis. Elytra nigra puncto marginali in ipſa baſi, altero marginali in medio lunulaque apicis albis. Corpus nigrum.

1—2. C. capite thoraceque cupreo nitidis, elytris obſcuris: punctis minutis lunulaque apicis albis. *micans.*
Habitat in America boreali.
Statura omnino praecedentis et forte eius mera varietas. Caput fuſcum, cupro micans labio albo. Thorax fuſcus, cupro micans. Elytra fuſca, obſcura punctis aliquot minutis lunulaque apicis albis. Corpus cyaneum.

30—1. C. cuprea elytris vireſcentibus: margine dentato ramoque flexuoſo albis, pedibus poſticis longiſſimis. *longipes.*
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentis. Antennae neae. Caput et thorax obſcure cuprea, maculata. Elytra obſcuriora margine albo. Ad baſin dens flexuoſus, in medi mus maior et verſus apicem denticuli Corpus viridi aeneum pedibus poſticis gilſimis.

ſuturalis. 31—2. C. viridi aenea elytris albis: ſutura laque viridi aeneis.

Habitat in America St. Thomas. Muſ. D. Lund.

Parua. Caput viridi aeneum mandibulis labioque albo. Thorax viridi aeneus u que pilis albis hirtus. Elytra laeuia, alba tura aenea, quae ad baſin valde dilata Praeterea in medio ramum paruulum em tit et pone hanc lunulam retroflexam et mulum includentem. Corpus aeneum ribus albo hirtis.

angulata. 33—4. C. viridi cuprea elytris punctatis vir bus: lunulis duabus ramoque flexuoſo dio flaueſcentibus.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Statura omnino C. trifaſciatae. Caput vir cupreum mandibulis antennisque aeneis. La bium obſcure flaueſcens. Thorax viridi c preus. Elytra punctata, viridia lunula b ſeos apicisque ramoque flexuoſo medio ob ſcure albido.

obſcura. 33—4. C. nigra pedibus flaueſcentibus.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura parua C. angulatae. Caput cum antennis fuſcum oculis valde prominentibus aureis. Thorax rotundatus et elytra nigra, immaculata. Corpus nigrum. Pedes flaueſcentes, apice nigri.

3—4. C. obſcura margine exteriore triramoſo punctoque poſtico albis. *melancholica.*

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Parua. Caput obſcurum, cupro parum nitidum labio transuerſo albo, immaculato. Thorax rotundatus, obſcurus. Elytra obſcura margine ramos tres paruos exſerente albo. Punctum album ante apicem.

7—8. C. thorace cylindrico ferruginea elytrorum ſutura abbreuiata fuſca, abdomine atro. *cylindricollis.*

Habitat in Marocco Dr. Schousboe.

Cum C. emarginata figura et genere conuenit: Caput ferrugineum antennarum articulo primo longiori fere fracto. Thorax cylindricus, ferrugineus, immaculatus. Elytra laeuia, pallidiora ſutura ultra medium fuſca, qui color baſi apiceque dilatatur. Abdomen atrum. Pedes ferruginei.

ELAPHRUS. *Palpi* ſex filiformes.
Labium rotundatum, acuminatum, integrum.
Antennae ſetaceae.

3—4. E. niger pedibus rufis. *atratus.*

Habitat in America Dom. Hybner.

Magnitudo praecedentis. Caput nigrum
duabus impreſſis. Elytra ſtriata, nigra
des rufi.

DYTISCUS. *Palpi* ſix filiformes.
Labium corneum, tr
catum, integrum.
Antennae ſetaceae.

lateralis. 6—7. D. niger capitis antico thoracis elytror
que margine flauis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Reliquis minor et diſtinctus. Caput nig
antice flauum. Thorax niger margine
riori flauo. Elytra laeuia ſtriis duabus e p
ctis minutiſſimis exarata, olivacea mar
flauo et in hoc margine lineolae duae e p
ctis minutis nigricantibus a medio ad ap
ductae. Subtus obſcure ferrugineae.

brunneus. 34—5. D. ſupra ater ſubtus brunneus.

Habitat Tangier D. Schousboe Muſ. D
Lund.

Magnitudo et ſtatura omnino D. maculati. C
put, thorax, elytra laeuia, glabra, br
nea, immaculata. Corpus atrum. Pe
brunnei.

haemorrhoidalis. 38—9. D. ater capite thorace elytrorumque ap
cibus ferrugineis.

Habitat in Germaniae aquis.

D. notato paullo minor. Antennae ferrugineae
Caput et thorax laeuia, ferruginea, imma

culata. Elytra laeuia, nigra litura baſeos apicibusque ferrugineis. Corpus atrum pedibus ferrugineis.

40—1. D. gibbus ater nitidus capite elytrorumque ſtriis flauis. *ſcriptus.*

Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff.

Paruus, gibbus. Caput flauum, immaculatum. Thorax niger. Elytra laeuia, nitida, atra ſtriis plurimis baſi coeuntibus flauis. Corpus nigrum pedibus piceis.

GYRINUS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla cornea, unidentata, acutiſſima.
Labium emarginatum.
Antennae cylindricae.

8. G. niger elytris ſtriatis, ſubtus ferrugineus abdominis medio nigro. *minutus.*

Habitat in Europae aquis Muſ. Dom. Boſc.

Minutus. Caput nigrum punctis quatuor impreſſis. Thorax niger lineola transuerſa, impreſſa. Elytra ſtriata nigra margine ſubtus ferrugineo. Corpus ferrugineum abdominis ſegmento tertio quartoque nigris. Pedes ferruginei.

5—6. G. laeuis niger opacus elytris ante apicem unidentatis. *indus.*

Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff.

Statura omnino et magnitudo G. micans, cuius forte mera varietas. Differt tamen ely-

tris ante apicem unidentatis. Corpus ſupra nigrum, opacum, laeue. Abdom lateribus ferrugineis. Pedes poſtici ferruginei.

nitidulus. 9. G. ater nitidus elytris punctato ſtriatis ano pedibusque rufis.

Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff.

Magnitudo G. minuti. Corpus atrum, nitidum. Elytra punctato ſtriata, abdomine breuiora. Anus et pedes rufa.

NOTOXUS. *Palpi* quatuor ſecuriformes.
Maxilla unidentata.
Antennae filiformes, extrorſum craſſiores.

Rhinoceros. 7—8. N. thorace in cornu ſupra caput protenſo elytris atris immaculatis.

Habitat in Germania Muſ. Dom. de Scheſtedt.

Praecedentibus duobus adhuc minor. Antennae fere longitudine corporis filiformes, ferrugineae. Thorax ferrugineus cornu in medio, magno, ſupra caput protenſo, in medio coarctatum, apice ſerratum. Elytra laeuia, nigra, immaculata. Pedes ferruginei.

pedeſtris. 9—10. N. ater nitidus thorace ferrugineo, femoribus anticis dentatis.

Notoxus pedeſtris Roſſ. Fn. Etr. 1.

Habitat in Italia Dom. Hybner.

Statura omnino N. floralis et eiusdem certe generis at triplo maior. Antennae extrorſum

paullo craſſiores, nigrae, baſi ferrugineae. Caput globoſum, atrum, nitidum. Thorax poſtice anguſtatus, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra laeuia, atra, nitida. Pedes nigri femoribus baſi rufis, anticis unidentatis.

11. N. ater nitidus thoracis limbo ferrugineo. *limbatus.*

Habitat Kiliae.

Statura et magnitudo N. floralis. Corpus totum atrum, nitidum ſolo thoracis limbo ferrugineo.

2. N. piloſus ater thorace obſcuro, elytris puncto baſeos ferrugineo. *hirtellus.*

Notoxus hirtellus Panz. Fn. Germ. 35. tab. 3.

Habitat in Germaniae Dom. Panzer.

Affinis certe N. florali at diſtinctus videtur. Corpus totum piloſum, atrum. Thorax obſcurus. Elytra puncto tantum baſeos rufo.

3. N. laeuis teſtaceus capite nigro. *populneus.*

Notoxus populneus Panz. Fn. Germ. 35. tab. 4.

Habitat in Germaniae Populo Dom. Panzer.

Minutus. Corpus teſtaceum. Caput nigrum.

CANTHARIS. *Palpi* ſecuriformes.
Maxilla bifida.
Labium integrum.
Antennae filiformes.

4. C. thorace marginato nigro, ore abdomineque flauis, elytris coeruleſcentibus. *abdominalis.*

Habitat in Galliae Alpibus Dom. Brogniart.

Statura omnino C. fuſcae. Caput et tho atra, nitida. Os flaueſcens mandibulis guineis. Elytra laeuia, obſcura, coeru centia. Abdomen flaueſcens pedibus ni

triſtis. 11—12. C. thorace marginato obſcure fuſca tennarum primo articulo pallido.

Habitat in Galliae Alpibus Dom. Brogniart.

Minor C. fuſca. Antennae fuſcae articulo imo incuruo, ferrugineo. Thorax, el corpus fuſca, obſcura, immaculata. P nigri.

diadema. 12—13. C. thorace marginato nigra faſcia oculis thoracisque margine rufo.

Habitat in America boreali Dom. Mauerh

Statura praecedentium. Caput nigrum fu faſciaque ſub antennis rufis. Thorax nus, marginatus, niger margine rufo. tra laeuia, nigra, immaculata. Corpu pedes nigra.

dimidiata. 19—20. C. thorace marginato teſtacea elytri midiato cyaneis.

Habitat in Ceylonia Dom. de Paykull.

Statura et magnitudo C. melanocephalae. tennae nigrae, baſi teſtaceae. Caput et rax laeuia, teſtacea, nitida, immacul Elytra laeuia, teſtacea, apice cyanea. pus teſtaceum ano nigro. Pedes teſtacei p tis nigris.

7—8. C. thorace marginato teſtaceo: macula oblonga nigra, elytris teſtaceis: vittis duabus poſtice coeuntibus nigris. *2vittata.*

Habitat ad Cap. B. ſpei Muſ. Dom. Lund.

Media. Antennae nigrae. Caput nigrum, inter antennas ferrugineum. Thorax teſtaceus macula magna, oblonga, dorſali, nigra. Elytra laeuia, teſtacea vittis duabus nigris, ante apicem coeuntibus. Corpus nigrum abdomine teſtaceo. Pedes teſtacei.

9—30. C. thorace marginato rufo, elytris teſtaceis, corpore nigro. *bicolor.*

Habitat in Selandia Muſ. Dom. Lund.

Media. Antennae fuſcae, baſi ferrugineae. Caput et thorax laeuia, ferruginea, immaculata. Elytra laeuia, teſtacea. Corpus nigrum. Pedes ferruginei femoribus poſticis baſi nigris.

29—30. C. thorace marginato capiteque teſtaceo nigroque variis elytris viridibus. *ſericea.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff Muſ. D. Lund.

Statura parua C. nitidulae. Antennae teſtaceae, apice nigrae. Caput teſtaceum macula magna, media, nigra. Thorax teſtaceus maculis tribus nigris. Elytra ſericea, viridia, immaculata. Corpus nigrum pedibus teſtaceis.

MALACHIUS. *Palpi* filiformes: ar-
culo ultimo ſetace
Maxilla unidentata.
Labium rotundatu
membranaceum.
Antennae filiformes.

elegans. 4—5. M. viridis ore elytrorumque apicibus ru-
Malachius elegans Oliv. Inſ. 27. 6. 5. tab.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Paullo minor M. 2puſtulato totus aeneus ſ
ore elytrorumque apicibus rufis.

4macula-tus. 7—8. M. ater thorace rubro, elytris ſanguin
maculis duabus cyaneis.
Habitat in America boreali Dom. Hybner.
Medius. Antennae nigrae, baſi rufae. In
tero ſexu articulus tertius quartusque dil
ti, difformes. Caput nigrum. Thorax
fus, immaculatus. Elytra glabra, ſangui
maculis duabus cyaneis, altera baſeos, al
apicis maiore. Corpus atrum.

viridipen-nis. 7—8. M. pubeſcens rufus elytris pectoreque vi
diaeneis.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Paykull.
Statura omnino praecedentium. Caput rufu
immaculatum. Thorax rufus macula m
dia obſcura. Elytra viridia, nitida, imm
culata. Corpus rufum pectore viridi.

thoracicus. 7—8. M. ater thorace rufo immaculato.
Malachius thoracicus Oliv. Inſ. 27. 8. 8. tab.
Habitat in Gallia Dom. Boſc.

Paruus, totus ater, nitidus ſolo thorace tibiisque poſticis rufis.

9—10. M. cyaneus thoracis margine abdominisque baſi rufis. *abdominalis.*

Habitat in Mogador Dom. Schousboe Muſ. Dom. Lund.

Paruus. Caput cyaneum ore ferrugineo. Thorax cyaneus margine late ferrugineo. Elytra laeuia, cyanea, nitida. Abdomen rufum ano cyaneo. Pedes cyanei.

13—14. M. ater ore thoraceque rufis, elytrorum margine ſuturaque albis. *limbatus.*

Habitat Tangier Dom. Schousboe Muſ. Dom. Lund.

Minutus. Caput nigrum ore antennisque rufis. Thorax rufus, nitidus. Elytra glabra, atra ſutura margineque exteriore albis, quae poſtice coeunt.

DERMESTES. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla bifida.
Labium corneum, obtuſum, integrum.
Antennae clauato perfoliatae.

4—5. D. niger glaber ſcutello pedibusque teſtaceis, antennis claua ſolida elongata. *Megatoma.*

Megatoma Schaefferi Herbſt. Coleopt.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Affinis certe D. macellario cuius varietatem f
xus diu credidi. Differt inprimis anten
rum claua elongata, cylindrica, ſolida. C
pus glabrum, nigrum ſcutello pedibusq
teſtaceis.

frontalis. 20—1. D. oblongus niger capite elytrorum p
cto apiceque pedibusque ferrugineis.

Habitat in Gallia Dom. Brongiard.

Medius. Caput cum antennis rufum. Th
rax laeuis, niger, immaculatus. Elytra l
uia, nigra puncto paruo baſeos apiceque
fis. Pedes rufi.

crenatus. 41—2. D. ouatus teſtaceus thorace crenato.

Habitat Hafniae Dom. Lund.

Corpus paruum, ouatum, teſtaceum thora
margine prominulo, crenato.

2puſtulatus. 47. D. ouatus ater elytris abbreuiatis macula p
dibusque ſanguineis.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Statura et magnitudo praecedentium. Ant
nae ferrugineae claua perfoliata, nigra. C
put, thorax, corpus atra. Elytra trunc
ta, abbreuiata, laeuia, atra macula magn
ſanguinea. Pedes ſanguinei.

PTILINUS. *Palpi* quatuor ſubaequales.
Maxilla breuis, bifida.
Labium membranaceum, ſubemarginatum.
Antennae flabellatae.

4. Pt. teſtaceus immaculatus elytris laeuiſſimis. *Dorcatoma.*

Dorcatoma Herbſt. Coleopt.
Habitat in Germania Dom. Hybner.
Corpus paruum, gibbum, teſtaceum, immaculatum. Caput inflexum. Antennae elongatae, teſtaceae articulis tribus ultimis altero latere valde prominentibus, acutis. Proprii forte generis mihi haud rite examinatus.

5. Pt. niger elytris ſtriatis. *ſerratus.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Praecedentibus minor. Caput inflexum. Antennae valde ſerratae, valde flabelliformes, nigrae. Thorax laeuis margine deflexo.

NITIDULA. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla cylindrica, membranacea.
Labium cylindricum.
Antennae claua ſolida.

6—7. N. ouata pallida pedibus flaueſcentibus. *pallida.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Parua tota laeuis, glabra, pallida pedibu-
lis flaueſcentibus.

faſciata. 22—3. N. thorace teſtaceo: macula atra,
tris teſtaceis: faſcia media nigra teſt-
punctata.

Habitat in Holſatia.

Statura parua N. liturae. Caput teſtaceum,
maculatum. Thorax teſtaceus macula
gna baſeos atra. Elytra teſtacea, glabra
cia lata media nigra puncto uno alteroue
ſtaceo.

humeralis. 26—7. N. nigra nitida elytris dimidiatis: pu-
baſeos rufo.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Caput et t-
rax punctata, atra, nitida. Elytra dimi-
ta nigra puncto paruo, rufo ad baſin.
des rufi.

quadrata. 27—8. N. nigra elytris dimidiatis pallidis: lit-
communi fuſca.

Habitat Cajennae Dom. Curier.

Parua. Caput et thorax nigra, immacula-
Elytra abdomini dimidio breuiora litu-
magna communi fuſca. Pedes rufi.

HETEROCERUS. *Palpi* breues, filiformes.
Maxilla unidentata longitudine palporum.
Labium late emarginatum.
Antennae breues, recuruae: articulo tertio quartoque cordatis, ultimis ſerratis.

1. H. villoſus fuſcus elytris faſciis tribus undatis ferrugineis. ***marginatus.***
Heterocerus marginatus Ent. ſyſt. 1. 262. 41.
Boſc. Act. Soc. Hiſt. Nat. Pariſ. 1. tab. fig.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner in Gallia Muſ. D. Boſc.

2. H. villoſus fuſcus elytris macula marginali ferruginea. ***dubius.***
Habitat Tranquebariae Muſ. D. de Seheſtedt.
Paullo praecedente minor. Antennae breues, craſſae huius generis videntur. Caput et thorax villoſa, fuſca, immaculata. Elytra villoſa, fuſca macula marginali punctoque uno alteroue diſci ferrugineis. Pedes breues tibiis apice dilatatis ſerratis. An potius Parnus.

ANTHRENUS. *Palpi* inaequales, formes.
Maxilla membra- cea, linearis, bi-
Labium corneum, tegrum.
Antennae claua ſol-

Glorioſae. 4—5. A. cinereo villoſus elytris nigris: faſcia dia cinerea.

Habitat in India orientali Muſ. Dom. de heſtedt.

Statura et magnitudo A. Verbaſci. Capu- thorax cinereo villoſa. Elytra laeuia, n- faſcia in medio lata, cinerea.

maculatus. 6—7. A. ater ferrugineo maculatus.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura parua praecedentis. Corpus ſu- atrum maculis ferrugineis, ſparſis, ſub- ferrugineo pubeſcens.

COCCINELLA. *Palpi antici* ſecuri- mes:
poſtici filiformes.
Labium cylindricu-
Antennae claua ſolid-

diaphana. 3—4. C. ſubrotunda thorace coleoptrisque teſt- ceo diaphanis immaculatis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Corpus paruum, nigrum. Thorax coleop- traque teſtacea diaphana, plana, immaculat-

—4. C. obſcure teſtacea pubeſcens oculis nigris. *pubeſcens.*
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Minuta tota obſcure teſtacea, pubeſcens oculis ſolis nigris.

—8. C. ſubrotunda coleoptris teſtaceis immaculatis, thorace albo baſi punctisque duobus atris. *diſcolor.*
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura praecedentium. Caput album, immaculatum. Thorax albus baſi late punctisque duobus in medio diſtinctis atris. Coleoptra immaculata. Corpus nigrum.

8—9. C. ſubrotunda flaueſcens thorace punctis quatuor nigris. *cincta.*
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura omnino praecedentium at diſtincta. Corpus flaueſcens thorace punctis quatuor nigris. 2. 2. Margo elytrorum parum obſcurior.
Variat rarius puncto uno alteroue nigro.

13—14. C. coleoptris rubris: faſcia lata nigra; punctis duobus rufis. *dorſimacula.*
Habitat in India orientali Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Media. Caput et thorax atra, nitida, oculorum orbita thoracisque margine tenuiſſime albis. Elytra laeuia, baſi rufa lineola parua ad ſuturam nigra pone medium lata, atra puncto diſtincto, rufo, apice rufa. Corpus nigrum.

Affinis videtur C. uniſaſciatae.

ſuturalis. 16—17. C. teſtacea coleoptris ſutura vitti duabus abbreuiatis atris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Parua ſubrotunda. Caput et thorax teſta immaculata. Elytra glabra, teſtacea lata, media, abbreuiata ſuturaque atris. C pus teſtaceum.

varians. 29—30. C. coleoptris flaueſcentibus: puncto co muni faſciisque duabus apicis nigris.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Affinis C. cingulatae at diſtincta videtur. put atrum punctis duobus albis. Tho ater nitidus angulo antico albo. Elytra ueſcentia puncto communi baſeos ſu faſciisque duabus ſinuatis ante apicem a Corpus nigrum.

Variat interdum puncto uno alteroue ad ba elytrorum.

9notata. 48—9. C. coleoptris rubris: punctis nigris n uem, capite thoracisque margine albis.

Coccinella 9notata Herbſt. Coleopt.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr. 9

Diſtincta omnino a ſequente. Caput album immaculatum. Thorax ater, nitidus ma gine antico ad latera inprimis albus. Ely trorum puncta 1. 2. 1. et communi baſe

laeta. 61—2. C. coleoptris rubris: punctis nigris tre cim, thorace atro margine punctisque duo bus albis.

Habitat in Mogadore Dom. Schousboe Muſ. Dom. Lund.

Corpus paruum. Caput album margine poſtico punctisque duobus frontalibus atris. Thorax ater margine antico lateralique, antico lineam mediam abbreuiatam exſerente punctisque duobus dorſalibus, albis. Elytra rufa punctis nigris ſex 1. 2. diſtantibus, 2. obliquis, 1 et baſeos communi. Corpus atrum.

—1. C. coleoptris rufis: ſtriga abbreuiata albida. *ſtrigata.*

Habitat in Tanger Dom. Schousboe Muſ. D. Lund.

Parua, tota obſcure rufa ſtriga fere obſoleta pallida in medio coleoptrorum, quae tamen margines haud attingit.

—4. C. coleoptris nigris immaculatis, capite ano pedibusque rufis. *capitata.*

Schymnus Schneider.

Habitat in Suecia Dom. Paykull.

Affinis C. anali, at diſtincta videtur. Caput rufum. Thorax et elytra nigra, villoſa, immaculata. Corpus nigrum ano rufo. Pedes rufi.

3—4. C. coleoptris atris immaculatis rufa thorace poſtice atro. *nigrita.*

Habitat Tranquebariae Daldorff Muſ. Dom. Lund.

Media. Caput rufum oculis nigris. Thorax ater margine antico inprimis ad latera rufus. Elytra gibba, laeuia, atra, nitida. Corpus cum pedibus rufum.

rufipes. 101—2. C. coleoptris nigris: macula magna marginali pedibusque rufis.

Habitat in Europa auſtrali Dom. Vahl Dom. Lund.

Corpus paruum, ouatum. Caput et th nigra, immaculata. Elytra atra, nitid cula magna, marginali, rufa, quae fe ſuturam extenditur. Pedes omnes ruf

12puſtulata. 110—11. C. coleoptris nigris: punctis albis decim. Linn. ſyſt. Nat. 2. 585. 45.

Habitat in Europae hortis.

Margo elytrorum albus.

argulata. 116—7. C. coleoptris atris: annulis duod flauis.

Habitat in Africa Muſ. Dom. Boſc.

Media. Caput et thorax fulua, immac Elytra nitida, atra annulis ſex. 2. 2. 2 mis obliquis contiguis, diſtinctis, flauis pus fuluum.

vulpina. 116—7. C. coleoptris atris, punctis octo f lunulisque quatuor rubris.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Magna in hoc genere. Caput album. Th ater, nitidus angulo antico albo. Elytra nitida lunulis duabus magnis marginal rufis: anteriore ſinuata punctisque quatuor bis ad ſuturam. 1. 1. 2. Corpus atrum, dibus albis.

CASSIDA. *Palpi antici* clauati.
poſtici filiformes.
Labium elongatum, integrum.
Antennae moniliformes.

10. C. brunnea clypei elytrorumque margine ferrugineo. *brunnea.*

Habitat Cajennae D. Curier.

Omnino diſtincta a C. limbata maior et magis rotundata. Corpus brunneum. Clypeus et elytra punctata, obſcure brunnea margine ferrugineo.

10. C. ſupra rubra thorace lineis tribus, elytris vitta interrupta atris. *vittata.*

Habitat in Heluetia Dom. de Clairville.

Diſtincta omnino a C. murraea duplo minor. Antennae, corpus, pedes atra, immaculata. Clypeus rufus apice pallidior. Lineae tres latae, atrae, abbreuiatae: exterioribus marginalibus antice fere coeuntibus. Elytra laeuia, rubra ſutura vittaque lata interrupta nec apicem attingente atris.

4. C. elytris flauis nigro punctatis: ſutura ferruginea margineque pallido. *ornata.*

Habitat in India orientali Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Corpus paruum, flaueſcens. Clypeus flaueſcens linea media, cuſpidata, brunnea, quae tamen marginem anticum haud attingit margineque late pallido. Elytra flaua punctis

ſeptem nigris tribus ſutura brunnea c
guis. Margo late pallidus.

brachiata. 16—7. C. obſcura margine pallido: faſcia m
obſcura.

Habitat — — Muſ. Dom. Lund.

Statura omnino praecedentium. Antennae
grae articulo primo ferrugineo. Cly
rotundatus, obſcurus, immaculatus.
tra obſcura margine pallido et in hoc m
ne faſcia obſcura. Sutura parum pall.

6notata. 18—9. C. flaueſcens elytris punctis tribus n

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Magnitudo C. nebuloſae. Corpus totum
ueſcens elytris punctis tribus longitudina
diſpoſitis nigris.

ſcripta. 21—2. C. teſtacea thorace maculis ſex, el
plurimis atris.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. D. Lund.

Statura et magnitudo C. jamaicenſis. A
nae obſcurae. Thorax rotundatus, ite
punctis quatuor dorſalibus maculaque f
ria utrinque marginali atris. Elytra ſt
punctata, teſtacea maculis plurimis v
atris. Corpus teſtaceum pedibus nigris.

gibba. 21—2. C. obſcure rufa elytris gibboſis: ma
nigris numeroſiſſimis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo omnino C. cribraria
omnino diſtincta. Clypeus antice ſubem
natus, obſcure rufus margine tenuiſſime

ctisque duobus dorſalibus obſoletis nigris. Elytra punctata, in medio clauata, gibba maculis numeroſiſſimis, fuſcis. Margo etiam tenuiſſime niger. Pedes rufi.

ı. C. rufeſcens thorace punctis nouem, elytris clathratis nigro maculatis. *clathrata.*

Habitat in India orientali Muſ. D. de Seheſtedt.

Statura et magnitudo C. deuſtae. Antennae flauae, apice nigrae. Corpus flaueſcens abdominis medio nigro. Clypeus rotundatus, integer, pallide rufus punctis nouem nigris 4. 3. 2. ultimis duobus in ipſa baſi. Elytra ſtriata, rufa et inter ſtrias puncta magna impreſſa. Verſus baſin macula magna, transuerſa, communis, in medio macula diſtincta et verſus apicem macula altera communis transuerſa. Praeterea maculae tres marginales, ultima in ipſa apice.

24—5. C. clypeo elytrisque griſeis: margine pallidiore, corpore atro. *bicolor.*

Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff.

Statura C. margaritaceae at paullo maior. Corpus atrum pedibus totis teſtaceis.

30—1. C. flaueſcens elytris tuberculatis medio nodoſis fuſcis: maculis duabus lateralibus pallidis. *clauata.*

Habitat in America boreali Dom. Hirſhel.

Statura et magnitudo C. cinctae. Corpus flaueſcens, immaculatum. Antennae flaueſcentes articulo ultimo fuſco. Clypeus pallidus

macula baſeos obſcuriore. Elytra fuſca medio tuberculo communi punctisque pl mis, eleuatis, ſparſis, atris. Maculae d pallidae in margine, altera in medio ma altera in apice.

chinenſis. 42—3. C. teſtacea margine pallidiore: ma nigra.

Habitat in China Muſ. Dom. Lund.

Statura praecedentium. Antennae teſtaceae ticulo ultimo nigro. Elytra baſi parum uata, ſubrugoſa, teſtacea margine palli re macula pone medium atra. Corpu ſtaceum.

transuerſa. 52—3. C. rufa elytrorum margine ſutura media lineolaque utrinque transuerſa ni

Caſſida clathrata Linn. ſyſt. Nat. 2. 576. 1

Habitat — — Muſ. Dom. Lund.

Magnitudo praecedentium. Clypeus rotu tus, breuis, rufus, immaculatus. El laeuia margine, vitta media ſuturaque n Inter vittam et marginem exteriorem in dio linea transuerſa, nigra, quae fere e tam et marginem exteriorem attingit. Co obſcurum.

venoſa. 56—7. C. nigra thorace immaculato, coleop rum diſco rufo reticulato: margine m lato.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Magna. Clypeus niger, immaculatus, vix em ginatus. Coleoptra nigra, cyaneo parum tida diſco rufo reticulato margine utrin

interne maculis quatuor; externe tribus minoribus, approximatis, rufis. Corpus nigrum.

7—8. C. clypeo cupreo, elytris viridi aeneis: maculis ſex rubris. *12puſtulata.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Media. Corpus nigrum. Clypeus ſubemarginatus, cupreus, immaculatus. Elytra punctata, viridi aenea punctis ſex primo in ipſa curuatura baſeos ad ſcutellum, reliquis 2. 2. 1. Maculae interiores elytrorum interdum confluunt.

CHRYSOMELA. *Palpi* ſex extrorſum craſſiores.
Labium corneum, integrum.
Antennae moniliformes.

18—9. C. ſupra obſcure aenea thorace glaberrimo, elytris vage punctatis. *obſcurata.*

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo C. Bankii. Caput et thorax obſcure aenea, nitida, glaberrima thoracis margine nullo modo incraſſato. Elytra vage punctata. Antennae, corpus, pedes nigra, immaculata.

28—9. C. obſcure teſtacea elytris punctis ſex albis. *14guttata.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.

Magnitudo et ſtatura C. Staphylaeae. Capu[illegible] thorax obſcure brunnea, immaculata. E[illegible] tra ſubtiliſſime ſtriato punctata, obſcu[illegible] brunnea punctis ſex albis 2. 2. 2. Corp[illegible] obſcure brunneum.

ebraea. 29—30. C. atra nitida elytris albis: maculis 6[illegible] riis atris.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.

Statura praecedentis paullo minor. Capu[illegible] thorax glabra, atra, nitida, immacul[illegible] Elytra ſublaeuia, pallida macula magna, [illegible] turali, atra et in hac puncta duo alba. [illegible] ſus apicem puncta tria nigra 2. 1. Corp[illegible] nigrum.

exclamationis. 53—4. C. ouata thorace pedibusque ferrugi[illegible] coleoptris flauis: ſtriis nouem atris; exte[illegible] ribus interruptis abbreuiatisque.

Habitat in America boreali Dom. Prof. Sm[illegible] Barton.

Statura et magnitudo C. ſtolidae. Caput [illegible] rugineum, immaculatum. Thorax lae[illegible] ferrugineus margine antico pallido. Scu[illegible] lum ferrugineum. Elytra laeuia, flaua [illegible] tura ſtriisque quatuor nec apicem, nec [illegible] ſin, attingentibus atris. Stria ultima [illegible] cum tertia coit, nec ultra medium exte[illegible] tur et puncto diſtincto terminatur.

6 notata. 63—4. C. nigra thorace elytrisque pallidis: p[illegible] ctis duobus nigris.

Habitat in Tanger Dom. Schousboe Muſ. Do[illegible] Lund.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Caput pallidum, nigro varium. Thorax pallidus, nitidus punctis duobus nigris. Elytra vix ſtriata, pallida punctorum pari in medio. Corpus nigrum. Pedes pallidi femoribus apice puncto nigro.

3—4. C. pallida thorace punctis duobus, elytris ſtriis quibusdam punctatis nigris. *aegrota.*

Habitat in Hiſpania Muſ. Dom. Lund.

Statura omnino C. pallidae. Caput pallidum margine poſtico nigro. Thorax laeuis, pallidus, nitidus punctis duobus nigris. Elytra laeuia, pallida ſtriis plurimis nigris quibusdam punctatis, ante apicem coeuntibus.

0—1. C. oblonga nigra thoracis margine antico elytrisque flauis nigro maculatis. *marmorata.*

Habitat Cajennae Dom. Cuvier.

Statura et magnitudo C. lapponicae. Caput nigrum antennis baſi flauis. Thorax ater laeuis nitidus margine antico tridentato, flauo dente intermedio minore. Verſus marginem poſticum lineola transuerſa, flaua. Elytra laeuia flaua lineolis maculisque variis nigris. Pedes flaui femoribus nigris.

70—1. C. oblonga ferruginea elytris maculis quatuor faſciaque media nigris. *cajennenſis.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo omnino C. lapponicae. Caput obſcure ferrugineum linea frontali antennisque nigris. Thorax oblongus, obſcure ferrugineus, immaculatus. Elytra lae-

uia, ferruginea pari macularum ad baſin
cia media maculisque duabus poſticis
nigris. Corpus ferrugineum.

ſumptuoſa. 85. C. nitidiſſima capite thoraceque aeneis,
tris violaceis.

Habitat in Inſula Trinidad Dom. Ryan Muſ.
Lund.

Statura et magnitudo omnino C. auratae.
put et thorax ſubtiliſſime punctata, ae
nitidiſſima. Elytra glaberrima, violacea,
diſſima. Corpus viridi aeneum.

bulgharenſis. 109—10. C. oblonga cyanea nitida elytris
punctatis, antennis fuſcis.

Chryſomela bulgharenſis Schrank. Enum.

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Omnino diſtincta videtur. Corpus cyane
nitidum. Thorax planiuſculus margine
craſſato. Elytra vix punctata. Pedes cy
Antennae fuſcae articulis 3. 4. ferrugi

CRIOCERIS. *Palpi* quatuor filiform
Maxilla bifida.
Labium corneum, in
grum.
Antennae filiformes.

pallida. 10—11. C. pallida antennis pectoreque nigris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Parua. Antennae nigrae, baſi pallidae.
put, thorax, elytra, laeuia, glabra, p
da, immaculata. Corpus pallidum pecto
nigro. Pedes pallidi.

2. C. ferruginea pectore elytrorum faſciis 2 *ſpinoſa.* duabus pedibusque nigris.
Habitat in Africa Dom. Boſc.
Magna, craſſa. Caput cum antennis et thorax glabra, ferruginea, immaculata. Elytra laeuia, ferruginea faſcia duabus nigris altera in medio, altera apicis, ſutura connexis. Corpus ferrugineum pectore pedibusque nigris.
Variat ſexu tuberculis coleoptrorum duobus baſeos approximatis, eleuatis, compreſſis.

5–6. C. fuſca capite elytriſque atris, thorace *bicolor.* pedibusque rufis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Maior C. melanopa et diſtincta. Caput atrum ore rufo antennisque fuſcis. Thorax laeuis rufus, nitidus. Elytra laeuia, atra, nitida, immaculata. Corpus fuſcum pedibus rufis.

10–11. C. nigra thorace ferrugineo; lineola dor- *lineola.* ſali nigra, elytris pallidis.
Crioceris lineola Panz. Fn. Germ. 34. tab. 5.
Habitat in Germania Dom. Panzer.
Statura C. Betulae at paullo minor. Antennae ferrugineae apice obſcuriores. Caput nigrum. Thorax pallide ferrugineus lineola lata dorſali nigra, quae tamen nec baſin nec apicem attingit. Elytra laeuia, pallida. Abdomen et pedes ferruginea.

10–11. C. glabra atra elytris punctatis, pedi- *glabrata.* bus rufis.

Crioceris glabrata Panz. Fn. Germ. 34. tab.
Habitat in Germania Dom. Panzer.
Statura et magnitudo praecedentis. Antennae ſubferrugineae. Thorax rotundatus mar... medio prominulo ſubſpinoſo. Elytra ... ſtata. Corpus nigrum pedibus rufis.

LEMA. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla cornea, bifida.
Labium membranaceum, ... fidum.
Antennae filiformes.

4puſtulata. 1. L. nigra elytris maculis duabus teſtaceis.
Crioceris 4puſtulata Ent. ſyſt. 1. 2. 5. 15.
Habitat in Siam Muſ. Dom. Banks.

impreſſa. 2. L. atra elytris rubris.
Crioceris impreſſa Ent. ſyſt. 1. 2. 6. 16.
Habitat in Siam Muſ. Dom. Banks.

brunnea. 3. L. ferruginea antennis pectore abdominis baſi nigris.
Crioceris brunnea Ent. ſyſt. 1. 2. 6. 17.
Habitat in Germania Dom. Smidt.

retuſa. 4. L. thorace ferrugineo, elytris teſtaceis: lin... la baſeos atra.

Lemae corpus paruum, oblongum, immarginat... tardum, capite ouato, exſerto, oculis prominulis, ... tundatis, lateralibus, antennis thorace longioribus ... cantho anteriori oculorum inſertis, thorace cylindr... ſaepius impreſſo, ſcutello paruo, rotundato, ely... longitudine abdominis, pedibus mediocribus, ... bus, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

Crioceris retuſa Ent. ſyſt. 1. 2. 6. 18.
Habitat in Inſula Guadeloupe Muſ. Dom. Boſc.
L. ſupra rubra ſubtus nigra. *merdigera.*
Crioceris merdigera Ent. ſyſt. 1. 2. 6. 19.
Habitat in Europae Convallaria.
L. rubra elytris punctis ſex nigris. *12puncta-ta.*
Crioceris 12punctata Ent. ſyſt. 1. 2. 7. 20.
Habitat in Europae Aſparago.
L. thorace fuluo: punctis quinque nigris, elytris flauis: punctis ſeptem. *14puncta-ta.*
Crioceris 14punctata Ent. ſyſt. 1. 2. 7. 21.
Habitat in Germania Dr. Schulz.
L. thorace rufo, elytris flauis: faſciis duabus nigris. *ruficollis.*
Crioceris ruficollis Ent. ſyſt. 1. 2. 7. 22.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
L. nigra thorace rufo, coleoptris flaueſcentibus: maculis quinque nigris. *5punctata.*
Crioceris 5punctata Ent. ſyſt. 1. 2. 7. 23.
Habitat in Germania Dr. Schulz.
0. L. rufa coleoptris maculis quatuor nigris: duabus communibus. *nigricornis.*
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Statura C. ruficollis at minor. Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra crenato ſtriata, rufa puncto humerali maculisque duabus communibus, altera in medio, altera verſus apicem cyaneo nigris.
11. L. rufa elytris apice atris. *praeuſta.*
Crioceris praeuſta Ent. ſyſt. 1. 2. 8. 25.

Habitat Muſ. Dom. Lund.

unifaſciata. 12. L. rufa elytris faſcia atra.
Crioceris unifaſciata Ent. ſyſt. 1. 2. 8. 26.
Habitat in noua Hollandia Muſ. Dom.

2faſciata. 13. L. rufa elytris faſciis duabus atris.
Crioceris 2faſciata Ent. ſyſt. 1. 2. 8. 27.
Habitat in noua Hollandia Muſ. Dom.

nigripes. 14. L. flaua antennis pectore pedibusque
Crioceris nigripes Ent. ſyſt. 1. 2. 8. 28.
Habitat in noua Hollandia Muſ. Dom.

tranquebarica. 15. L. rufa elytris punctato ſtriatis cyaneis.
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff
Lund.
Statura praecedentium. Corpus totum
elytris ſolis punctato ſtriatis cyaneis.
Varietas chinenſis antennis pedibusque
nullo modo differt.

melanura. 16. L. rufa elytris punctato ſtriatis apice
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff
Lund.
Statura et magnitudo omnino praecedentis
put rufum antennis nigris. Thorax
dricus, rufus, immaculatus. Elytra pu
to ſtriata, rufa, apice late cyanea. Cor
rufum pedibus nigris.

cyanea. 17. L. viridis elytris ſtriato punctatis cyaneis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Paullo maior L. cyanellae. Caput viridi
nis oculisque nigris. Thorax utrinque
ſpinoſus ſtrigis duabus impreſſis viridis,

tidus, immaculatus. Elytra punctato ſtriata, violacea. Corpus et pedes nigra.

8. L. thorace rufo elytris cyaneis margine faſciaque media flauis. *Solani.*
Habitat in Carolinae Solano nigro Dom. Boſc.
Statura praecedentium. Caput cum antennis nigrum. Thorax cylindricus, rufus, immaculatus. Elytra punctato ſtriata, nitida margini laterali faſciaque media flauis. Corpus nigrum abdomine flauo.

19. L. coerulea antennis pedibusque nigris. *cyanella.*
Crioceris cyanella Ent. ſyſt. 1. 2. 9. 35.
Habitat in Europae plantis.

20. L. coerulea thorace pedibusque rufis. *melanopa.*
Crioceris melanopa Ent. ſyſt. 1. 2. 10. 36.
Habitat in Europa boreali.

21. L. nigra thorace pedibusque flauis. *flauipes.*
Crioceris flauipes Ent. ſyſt. 1. 2. 10. 37.
Habitat in Germania.

22. L. nigra capite thorace pedibusque rufis thorace ſpinoſo. *ſubſpinoſa.*
Crioceris ſubſpinoſa Ent. ſyſt. 1. 2. 10. 38.
Habitat in Europae Betula.

23. L. atra nitida antennarum baſi pedibusque rufis. *rufipes.*
Crioceris rufipes Ent. ſyſt. 1. 2. 10. 39.
Habitat in Germaniae fruticibus.

24. L. thorace rubro: punctis duobus nigris, coleoptris flauis: cruce punctisque quatuor nigris. *Aſparagi.*

Crioceris Aſparagi Ent. ſyſt. 1. 2. 10. 41.
Habitat in Europae Aſparago.

campeſtris. 25. L. nigro coeruleſcens thoracis limbo elytris punctis tribus: poſticis margine connexis.
Crioceris campeſtris Ent. ſyſt. 1. 2 10. 44.
Habitat in Europae auſtraliori.

equeſtris. 26. L. capite thoraceque teſtaceis, elytris [...] neis: margine lineola baſeos faſciaque [...] dia flauis.
Crioceris equeſtris Ent. ſyſt. 1. 2. 10. 47.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

GALLERUCA. *Palpi* ſex: articu[...] timo acuto.
Labium bifidum
Antennae moni[...] mes.

brunnea. 4—5. G. punctata teſtacea elytrorum marg[...] nuiſſime abdomineque nigris.
Habitat in America Dom. Hybner.
Statura omnino G. flauicornis at minor. [...] pus totum porrectum, teſtaceum, ma[...] elytrorum ſubtus abdomineque nigris. [...] des poſtici elongati at femora haud incr[...] ta, vix ſaltatoria.

viridis. 5—6. G. thorace aeneo nitido, elytris pun[...] tis obſcure viridibus antennis teſtaceis.
Habitat in Carolinae Quercu Dom. Boſc.
Statura G. flauicornis at paullo minor. Ca[...] viridi aeneum antennis flauis. Thorax [...]

uis, aeneus, nitidus. Elytra punctata, viridia, obſcura. Corpus et pedes nigra.

—7. G. ſupra ferruginea elytris apice lunula cyanea. *tranquebarica.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Magna. Antennae nigrae articulo octauo in altero ſexu longiori, apice dilatato, primo ferrugineo. Caput ferrugineum. Thorax ferrugineus puncto utrinque impreſſo. Elytra laeuia, glabra ferruginea, apice lunula magna, cyanea. Corpus et pedes atra.

14—5. G. oblonga cyanea antennis oculis pedibusque nigris. *Lauſoniae.*

Habitat in Lawſonia ſpinoſa Indiae orientalis Daldorff.

Nimis affinis G. Buſſiae at paullo minor et oculi ſemper nigri. Corpus ſupra cyaneum, nitidum.

20—1. G. capite thoraceque teſtaceis fuſco maculatis, elytris viridibus. *ſericea.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis videtur G. tricolor. Antennae teſtaceae. Caput obſcure teſtaceum macula magna, verticali, fuſca. Thorax obſcure teſtaceus maculis tribus fuſcis. Elytra ſericea, viridia, nitida. Corpus teſtaceo griſeum.

53—4. G. flaueſcens elytris ferrugineis: margine punctisque duobus albis. *melanocephala.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo praecedentium. Pedes mihi deſunt et forte ſaltatorii. Caput ni-

grum. Thorax pallidus, nitidus, imm… latus. Elytra laeuia, ferruginea margine dilatato punctisque duobus dorſalibus a…

aeruginea. 53—4. G. pallida elytris viridibus, capite p… reque nigris.

Ciſtela aeruginea Ent. ſyſt. 1. 2. 46. 27. A…

Habitat in Aeſchynomene Africae flor… quos deſtruit.

albicornis. 53—4. G. capite thoraceque, fuluis, elytr… gris: faſciis duabus albis.

Habitat in St. Domingo Inſula Dom. Bron…

Statura et magnitudo G. denticornis hau… tatoria. Antennae albae articulis prio… duobus nigris. Caput et thorax laeui… bra, fulua, immaculata. Elytra laeu… gra faſciis duabus undatis, albis, alte… medio, altera verſus apicem. Corpus nig…

limbata. 54—5. G. ſaltatoria nigra thoracis limbo el… rum margine vittaque fuluis.

Habitat in Tangier Dom. Schousboe.

Statura et magnitudo G. carolinianae. C… cum antennis nigrum. Thorax ſcaber, … ger margine omni fuluo. Elytra coeru… nitida margine exteriori vittaque dorſali … ante apicem cum margine coit fuluis. … pus nigrum femoribus poſticis valde c… preſſis, incraſſatis.

faſciata. 55—6. G. ſaltatoria pallida elytris cyaneis: … cia pallida.

Habitat in St. Domingo Inſula Dom. Brong…

Magna in hac familia. Antennae baſi pallidae, apice fuſcae. Caput et thorax pallida, immaculata. Elytra laeuia, glabra, cyanea, nitida: faſcia lata pallida, verſus ſuturam attenuata. Corpus pallidum femoribus poſticis incraſſatis, cyaneis.

—8. G. ſaltatoria nigra thorace anoque rufis. *collaris.*

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput cum antennis nigrum, immaculatum. Thorax rufus macula una alteraue dorſali, nigra. Elytra glabra, nigra, immaculata. Abdomen nigrum ano rufo. Pedes nigri femoribus poſticis incraſſatis.

—8. G. ſaltatoria ferruginea capite elytrisque cyaneis. *cyanipennis.*

Habitat in St. Domingo Inſula Dom. Brongiart.

Caput nigrum fronte fulua. Thorax laeuis, glaber, ferrugineus, immaculatus. Elytra laeuia, cyanea, immaculata. Corpus ferrugineum. Pedes nigri femoribus poſticis incraſſatis, ferrugineis.

—4. G. ſaltatoria nigra thorace elytrorumque faſciis duabus albis. *abbreuiata.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Magna in hac familia. Caput nigrum fronte late alba. Thorax albus, nitens, immaculatus. Elytra violacea, nitida faſciis duabus latis albis, quae tamen nec marginem nec ſuturam attingunt. Corpus nigrum abdomini pallidiore. Pedes nigri.

4notata. 66—7. G. ſaltatoria ferruginea capite thorac albis, elytris ferrugineis: punctis albis q tuor ſimplicibus.

Habitat Cajennae Dom. Cuvier.

Statura omnino et ſumma affinitas G. albi lis. Caput album antennis ferrugineis. T rax albus nitidus, immaculatus. Elytra uia, ferruginea punctis quatuor albis 1. annulo obſcuriori cinctis. Corpus fe gineum.

liturata. 6,—70. G. ſaltatoria ſupra pallida: elytris l media atra.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Media. Antennae nigrae baſi pallidae. C et thorax pallida, immaculata. Elytra uia, pallida, nitida baſi litura, in medi nea atris. Corpus nigrum pedibus palli Femora poſtica valde incraſſata, ferrug apice nigra.

indica. 71—2. G. ſaltatoria cyanea capite thorace p busque rufis.

Habitat in India orientali Muſ. Dom. de S ſtedt.

Media. Caput et thorax rufa, immacul Elytra cyanea, immaculata. Corpus n cans pedibus rufis femoribus poſticis inc ſatis.

flauicollis. 72—3. G. ſaltatoria coerulea nitens thorace ctore pedibusque pallidis.

Habitat in America auſtrali lecta inter Coc Cacti Muſ. Dom. Lund.

Media. Caput cyaneum. Thorax glaber, nitidus, pallidus. Elytra laeuia, cyanea, nitida. Pectus pallidum. Pedes pallidi.

2—3. G. ſaltatoria ouata atra elytris teſtaceis *gibba.* apice nigris.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Media, reliquis magis gibba. Caput et thorax atra, immaculata. Antennae teſtaceae. Elytra laeuia, glabra, nitida, teſtacea, apice nigra. Corpus nigrum femoribus poſticis incraſſatis.

3—4. G. ſaltatoria atra capite thoraceque rufis: *dimidiata.* thorace puncto medio nigro.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo G. rufipis. Caput cum antennis rufum. Thorax rufus puncto medio nigro. Elytra ſtriata, atra. Corpus pedesque nigra.

19—20. G. ſaltatoria nigro aenea elytris vitta *elongata.* albida.

Habitat in America boreali Dom. Smith Barton.

Parua at reliquis longior. Antennae mihi deſunt. Caput et thorax nigro aenea, immaculata. Elytra laeuia vitta media, lata, albida. Corpus nigro aeneum femoribus poſticis valde incraſſatis.

ENDOMYCHUS. *Palpi* quatuor inæ-
quales: articu-
ultimo trunca-
Labium elong-
tum, corneu-
integrum.
Antennae apice m-
niliformes.

cruentus. 1. E. ſanguineus thorace immaculato, elytris p-
ctis tribus nigris.
Galleruca cruenta Ent. ſyſt. 1. 2. 19. 30. *
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Banks.

coccineus. 2. E. thorace ſanguineo: macula nigra, ely-
ſanguineis: maculis duabus nigris.
Galleruca coccinea Ent. ſyſt. 1. 2. 20. 31. *
Habitat in Europae borealis Corylo.

cruciatus. 3. E. ruber coleoptris cruce nigra.
Galleruca cruciata Ent. ſyſt. 1. 2. 20. 32. *
Habitat Halae Saxonum.

4puſtulatus. 4. E. niger thoracis margine elytrorum macu-
duabus pedibusque rufis.
Galleruca 4puſtulata Ent. ſyſt. 1. 2. 20. 33. *

Endomychi corpus paruum, depreſſiuſculum, o-
brum, tardum, capite exſerto, ouato, plano, ocu-
vix prominulis, rotundatis lateralibus, antennis th-
race longioribus, diſtantibus, ante oculos inſertis, th-
race plano, marginato: margine ſubreflexo, ſcutel-
minuto, rotundato, elytris abdomine longioribus -
flexis, pedibus, breuibus, validis, tarſis quadriarti-
latis: penultimo bifido, colore nitido.

Habitat in Germaniae Lycoperdis.

. E. ater nitidus antennis pedibusque rufis. *Bouiſtae.*
Galleruca Bouiſtae Ent. ſyſt. 1. 2. 20. 34.*
Habitat in Germaniae Lycoperdo Bouiſta.

EROTYLUS. *Palpi* quatuor inaequales.
antici ſecuriformes.
poſtici clauati.
Labium corneum, dilatatum, emarginatum.
Antennae perfoliatae.

14—5. E. ater elytris flauis: faſcia media lata atra. *unifaſciatus.*
Habitat — — Muſ. Dom. Lund.
Medius. Caput et thorax laeuia, atra, immaculata. Elytra baſi apiceque flaua, in medio faſcia lata, atra. Sutura margoque tenuiſſime nigra. Corpus et pedes nigra.

18—9. E. flaueſcens elytris nigris: margine omni flaueſcente. *marginatus.*
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Statura omnino E. ſurinamenſis. Antennae elongatae clauatae claua compreſſa nigrae, baſi flaueſcentes. Caput flaueſcens vertice obſcuriori. Thorax marginatus, depreſſus, flaueſcens, immaculatus. Elytra punctata, nigra margine ſuturaque flaueſcentibus. Corpus flaueſcens.
Palpi antici filiformes. *Antennae* claua compreſſa, vix perfoliata. Forte proprii generis.

triſtis. 23—4. E. oblongus niger elytris cyaneis.

Habitat — —

Praecedentibus duplo minor et diſtinctus. Caput et thorax nigra, immaculata Elytra ſtriata, cyanea. Pedes nigri plantis fuſcis.

CEBRIO. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla membranacea, unidentata.
Labium apice palpigerum.
Antennae filiformes.

ruficollis. 3. C. fuſcus thorace femoribusque rufis, elytris teſtaceis.

Habitat in Marocco Schousboe Muſ. Dom. heſtedt.

Affinis certe C. gigas at minor. Caput nigrum. Thorax villoſus, rufus lateribus fuſcis. Elytra ſubſtriata, pallida. Pedes fuſci femoribus omnibus craſſis rufis.

CISTELA. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla unidentata.
Labium membranaceum bifidum.
Antennae filiformes.

fuſcata. 22—3. C. nigra elytris ſtriatis, antennis pedibusque teſtaceis.

Habitat Kiliae.

Media. Caput et thorax fuſca, immaculata. Antennae teſtaceae. Elytra ſtriata, fuſca. Pedes teſtacei.

5—6. C. nigra thorace marginato: margine rufo. *marginata.*

Habitat in Dalekarliae Alpibus Dom. Paykull.

Reliquis magis rotundata. Caput nigrum antennarum articulo primo rufo. Thorax marginatus, rotundatus, margine anteriori et laterali rufo. Elytra laeuia, nigra. Corpus nigrum.

ZONITIS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla palpis longior, integra.
Labium emarginatum.
Antennae ſetaceae.

1. Z. thorace mutico rufo, elytris pectoreque nigris. *nigripennis.*

Habitat in Marocco Muſ. Dom. Lund.

Summa affinitas Z. praeuſtae. Differt tamen elytris totis pectoreque nigris.

Variat forte ſexu elytris apice tantum nigris pectore tamen ſemper nigro.

2. Z. thorace rufo elytris viridibus. *viridipennis.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Lund.

Minor Z. flauae. Caput atrum antennis fuſcis. Thorax gibbus, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra ſublaeuia, viridia. Pectus atrum. Abdomen rufum. Pedes nigri.

piazata. 7—8. Z. ferruginea elytris teſtaceis: vitta atra.

Habitat in Carolina Dom. Boſc.

Statura praecedentium. Caput ferrugine antennis nigris. Maxillae exſertae longi ne corporis. Thorax punctatus, ferr neus, immaculatus. Elytra laeuia, teſ vitta lata nigra, quae tamen baſin hau tingit. Corpus ferrugineum. Pedes femoribus ferrugineis. Variat ſexu ore race corporeque nigris.

SAGRA. *Palpi* quatuor inaequales, formes.

Maxilla cornea, unident

Labium breue, corneum, tundatum, ciliatum, fiſſ

Antennae cylindricae.

triſtis. 1—2. S. obſcure viridis femoribus obſcure bi tatis, tibiis unidentatis.

Habitat Cajennae.

Statura et ſumma affinitas praecedentis. An nae corpore breuiores, cyaneae. Ca thorax, elytra, corpus obſcure viridia, nime nitida. Abdomen ſubtus baſi ma media villoſa, ferruginea. Femora po incraſſata baſi interiori macula magna au apice bidentata dente poſteriori longiore. biae incuruae apice unidentatae.

CRYPTOCEPHALUS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla unidentata.
Labium corneum, integrum.
Antennae filiformes.

—8. C. glaber ater elytris punctis ſex albis. *6guttatus.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Paullo minor C. Gorteriae. Caput atrum, immaculatum. Thorax ater margine antico et laterali pallido. Elytra ſubſtriata atra punctis trium parium albis. Corpus nigrum.

—3. C. thorace atro albo trilineato, elytris rubris: punctis tribus nigris. *variabilis.*
Cryptocephalus variabilis Schneid. Magaz. 2.
Habitat in Germaniae Salice.
Affinis certe C. cordigero, cuius varietatem olim credidi. Antennae nigrae, baſi flaueſcentes. Caput nigrum puncto inter antennas flauo. Thorax ater, nitidus lineis tribus albis exterioribus fere marginalibus margine tamen ipſo tenuiſſime atro, intermedia baſi dilatata: lineola nigra. Elytra rubra, punctis tribus nigris. Corpus nigrum.
Numerus punctorum in elytris variat 2. 3. 4.

—3. C. niger thorace lineis tribus flauis. *trilineatus.*
Habitat in Germania.

Statùra C. bothnici at duplo maior. [An]nae nigrae, baſi flauae. Caput nigru[m] [ma]cula magna, frontali, flaua. Thora[x] lineis tribus latis flauis cum margine [...] flauo coeuntibus. Elytra vix punctata [ni]gra. Pedes flaui.

atratus. 34—5. C. ater nitidus antennis ferrugineis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura omnino C. obſcuri at duplo minor. [An]tennae ferrugineae: articulo ultimo [...] Thorax laeuis, glaber, ater, nitidus. [Ely]tra punctato ſtriata, nitida, immaculata [Pe]des nigri.

luridus. 34—5. C. niger obſcurus elytris ſubreticul[atis]

Habitat in America boreali Dom. Mauerh[off]

Medius. Caput obſcurum antennis lo[ngioribus] tenuiſſimis. Thorax obſcurus, m[ox im]maculatus, mox margine obſcure ci[nereo]. Elytra rugoſa, mox immaculata, mo[x ci]reo varia. Corpus obſcurum.

imperialis. 44—5. C. ater nitidus elytris teſtaceis: p[unctis] quinque nigris.

Cryptocephalus imperialis Laichart. Tyrol.

Habitat in Gallia Muſ. D. Boſc.

Statura et magnitudo omnino C. 6punctati. [An]tennae nigrae articulo 2. 3. 4. teſtaceis. [Ca]put et thorax atra, immaculata. Elytra [...]uia, teſtacea punctis quinque nigris 2. [...]

ornatus. 44—5. C. rufus elytris flauis: vittis duabus breuiatis atris.

Habitat in Carolina Muſ. Dom. Boſc.
Corpus maiusculum, rufum. Antennae ſupra nigrae, ſubtus rufae. Caput et thorax rufa, glabra, nitida. Elytra punctato ſtriata, flaua margine ſuturaque tenuiſſime vittisque duabus latis atris, quarum exterior apicem haud attingit, interior ante apicem cum ſutura coit. *Mas* minor, pallidior.

5. C. rufus elytris nigro flauoque variis. *congeſtus.*
Habitat in Carolina Dom. Boſc.
Praecedente minor. Antennae nigrae, baſi ferrugineae. Caput rufum. Thorax laeuis, rufus margine lineolisque duabus baſeos flauis. Elytra punctato ſtriata, nigra margine maculisque variis numeroſis, flauis. Corpus rufum.

5. C. ſupra teſtaceus oculis atris. *Lundii.*
Habitat Tranquebariae Muſ. D. de Scheſtedt.
Statura praecedentium. Caput, thorax, elytra laeuia, glabra; teſtacea, immaculata oculis ſolis nigris. Corpus nigrum, mox teſtaceum.

5. C. capite thoraceque rufis nitidis, elytris flauis: vitta lata atra. *Seheſtedii.*
Habitat Tranquebariae Muſ. D. de Seheſtedt.
Corpus paruum, gibbum. Caput rufum antennis elongatis fuſcis. Oculi nigri. Thorax gibbus, rufus, nitidus margine parum flaueſcente. Elytra punctato ſtriata, flaua vitta lata, atra, quae apicem haud attingit. Abdomen nigricans margine flauo. Pedes flaui.

Vahlii. 54—5. C. rufus thorace maculis duabus
elytris atris: faſcia punctoque rufis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorf.
Dom. Lund.
Medius. Caput rufum oculis cinereis. Tho-
rax glaber, rufus, nitidus maculis
magnis, oblongis, atris. Elytra ſubſ
punctato ſtriata atra faſcia media rufa.
ad ſuturam extenditur. Verſus apicem
ctum paruum, rufum. Corpus rufi

poſtulatus. 58—9. ater thoracis margine antico ely-
que baſi maculisque tribus rubris.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. L
Medius. Caput nigrum ore fronteque
Thorax glaber, ater, nitidus margin
co lateralique rufo. Elytra ſubſtri
dentata maculis duabus in medio lin
media ante apicem rufis aut potius el
ſa faſciis duabus dentatis ſutura linea
dia connexis, nigris. Corpus nigrum
bus rufis.

coloratus. 71—2. C. niger thorace fuluo: punctis q
nigris, elytris teſtaceis: lineola baſeos
ctisque duobus nigris.
Habitat in Germania Dom. Mauerhoff.
Medius. Antennae nigrae, baſi flauae. T
nigrum, obſcurum, immaculatum.
flauus punctis quatuor nigris in ſtrigam
poſitis. Elytra laeuia, teſtacea lineola
ſeos punctisque duobus oblique poſitis.
Corpus nigrum.

a. C. thorace rufo nitido, punctis duobus *Spengleri.*
nigris, elytris teſtaceis: macula poſtica cy-
anea.

bitat Tranquebariae Dom. Daldorff Muſ. de
Scheſtedt.

tura praecedentium. Antennae nigrae baſi
rufae. Caput rufum orbita oculorum nigra.
Thorax rufus, nitidus punctis duobus dor-
ſalibus atris. Elytra laeuia, teſtacea macu-
la poſtica cyanea. Corpus obſcurum pedi-
bus teſtaceis.

8. C. ..er nitidus capite thoraceque rufis, *paruulus.*
pedibus flauis.

abitat in America boreali Dom. Mauerhoff.

atura parua praecedentium. Caput rufum an-
tennis flauis apice fuſcis. Thorax rufus, ni-
tidus macula baſeos nigra. Elytra puncta-
ta. Pedes flaui.

C. fuſcus obſcurus immaculatus. *arenarius.*

Habitat in Germania Dom. Panzer.

Minutus, totus fuſcus, immaculatus. Anten-
nae porrectae nigricantes.

CLYTHRA. *Palpi* quatuor inaequa-
les filiformes.
Labium apice dilatatum,
emarginatum.
Antennae breues, ſerra-
tae.

C. nigra obſcura elytris pallidis: maculis tribus *longipes.*
nigris, pedibus anticis elongatis.

Cryptocephalus longipes Ent. ſyſt. 1. 2. 5[?]
Habitat in Germaniae Corylo.

3punctata. 2. C. nigro cyanea elytris teſtaceis: punctis nigris, pedibus anticis elongatis.
Cryptocephalus 3punctatus Ent. ſyſt. 1. 2.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

6maculata. 3. C. nigra thorace rubro immaculato, rubris: punctis tribus nigris.
Cryptocephalus 6maculatus Ent. ſyſt. 1. 2.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

4punctata. 4. C. nigra elytris rubris: punctis duobus
Cryptocephalus 4punctatus Ent. ſyſt. 1. 2.
Habitat in Europae Corylo.

4notata. 5. C. cyaneo nigra elytris rubris: maculis cyaneis.
Cryptocephalus 4notatus Ent. ſyſt. 1. 2. 5
Habitat in Barbaria D. Prof. Vahl.

3maculata. 6. C. nigra cinereo villoſa elytris rufis: tribus cyaneis; poſteriore maiore trans
Habitat in India orientali Dom. Daldorff de Seheſtedt.

Clythrae corpus paruum, immarginatum, cum, ſaepius glabrum, tardum, capite retract lis oblongis, lateralibus vix prominulis, anten racis longitudine, ſerratis, diſtantibus, ante inſertis, thorace transuerſo, rotundato; margine ſcutello minuto, rotundato, elytris abdomine bus fornicatis pedibus, validis, anticis elongatis, ſis quadriarticulatis: articulo penultimo bifido, vario.

raecedentibus minor. Antennae valde ſerratae, nigrae. Caput et thorax nigra, cinereo villoſa, immaculata. Elytra punctata, rufa maculis tribus cyaneis: anticis duabus approximatis, tertia maiori, transuerſa. Pedes rufi femoribus nigris.

C. atra elytris teſtaceis: faſciis duabus atris. *rugoſa.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.
Statura omnino C. 4punctatae at duplo minor. Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Elytra ſubrugoſa, flaua faſciis duabus undatis atris, quae nec marginem nec ſuturam attingunt. Corpus nigrum.

C. nigra thorace rubro trimaculato, elytris teſtaceis: maculis tribus nigris, tibiis rufis. *Atraphaxidis.*
Cryptocephalus Atraphaxidis Ent. ſyſt. 1. 2. 54. 9.
Habitat in Sibiriae Atraphaxide.

C. viridi cyanea thorace elytrisque eleuato tuberculatis. *monſtroſa.*
Clythra monſtroſa Oliv. Inſ.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Boſc.
Corpus magnum, totum cyaneum antennis pedibusque nigris. Thorax holoſericeus dorſo gibbo, eleuato, bidentato. Elytra rugoſa baſi tuberculo eleuato, acuto, apice tuberculis minoribus.

0. C. obſcura thorace elytrisque eleuato tuberculatis. *plicata.*
Habitat in Carolina Dom. Boſc.
Statura omnino praecedentis at triplo minor. Corpus totum obſcurum, fuſcum. Thorax

tuberculis duobus dorſalibus, eleuatis
proximatis. Elytra tuberculis plurimis e
tis acutiuſculis. Mas minor colore oliu

gibber. 11. C. nigra thorace gibbo, elytris tuberc
Habitat in Carolina Dom. Boſc.
Minuta. Antennae teſtaceae. Thorax
tus, gibboſus, immaculatus. Elytra
tuberculis plurimis paruis eleuatis.
nigri.

lunulata. 12. C. atra nitida elytris flauis: lunula faſcia
ctoque apicis nigris.
Cryptocephalus lunulatus Ent. ſyſt. 1. 2. 55
Habitat — — Muſ. Dom. Banks.

12maculata. 13. C. nigra thorace elytrisque rubris: pu
quatuor nigris.
Cryptocephalus 12maculatus Ent. ſyſt. 1. 2. 55
Habitat ad Cap. B ſpei Muſ. D. Banks.

obſita. 14. C. teſtacea antennis elytrorumque ma
nigris.
Cryptocephalus obſitus Ent. ſyſt. 1. 2. 55. 1
Habitat in America Dom. Drury.

tridentata. 15. C. coeruleſcens elytris teſtaceis: puncto h
merali nigro.
Cryptocephalus tridentatus Ent. ſyſt. 1. 2. 55
Habitat in Europae Lonicera Xyloſteo.

taxicornis. 16. C. cyanea elytris teſtaceis immaculatis.
Cryptocephalus taxicornis Ent. ſyſt. 1. 2. 56.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

8punctata. 17. C. nigra thorace rufo, elytris teſtaceis: pu
ctis quatuor nigris.

Cryptocephalus 8punctatus Ent. ſyſt. 1. 2. 56. 18.
Habitat in Barbariae plantis Dom. Vahl.

C. capite thoraceque fuluis, elytris flauis: puncto baſeos ſcutelloque nigris. *maxilloſa.*
Cryptocephalus maxilloſus Ent. ſyſt. 1. 2. 56. 19.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

C. atra thorace utrinque macula lutea, tibiis flauis. *aurita.*
Cryptocephalus auritus Ent. ſyſt. 1. 2. 57. 20.
Habitat in Germaniae Corylo.

C. coerulea elytris ſanguineis: maculis coeruleis cicatriſantibus. *Lentiſci.*
Cryptocephalus Lentiſci Ent. ſyſt. 1. 2. 57. 21.
Habitat in Africae Lentiſco.

C. rufa capitis baſi elytrorumque maculis duabus cyaneis. *4maculata.*
Cryptocephalus 4maculatus Ent. ſyſt. 1. 2. 57. 23.
Habitat in Saxoniae Corylo.

2. C. obſcure aenea elytris teſtaceis: puncto baſeos nigro. *longimana.*
Cryptocephalus longimanus Ent. ſyſt. 1. 2. 58 25.
Habitat in Trifolio montano.

3. C. rufa elytris fuſcis cyaneo nitidis, pedibus anticis elongatis. *Lar.*
Cryptocephalus Lar Ent. ſyſt. 1. 2. 58 26.
Habitat in America meridionali Muſ. Dr. Hunter.

4. C. nigra thorace elytrisque teſtaceis, capite craſſiuſculo. *plagiocephala.*
Cryptocephalus plagiocephalus Ent. ſyſt. 1. 2. 60. 37.

Habitat in Gallia meridionali Muſ. Dom. Scheſtedt.

pallens. 25. C. nigra cinereo villoſa thorace elytriſque pallidis.

Cryptocephalus pallens Ent. ſyſt. 1. 2. 61.

Habitat in China Dr. Pflug.

ruficollis. 26. C. nigra thorace rufo, elytris teſtaceis, pedibus anticis elongatis: femoribus apice dentatis.

Cryptocephalus ruficollis Ent. ſyſt. 1. 2. 61.

Habitat in Inſulà St. Helenae.

nigripes. 27. C. capite thoraceque rufis, elytris pedibus apice nigris.

Cryptocephalus nigripes Ent. ſyſt. 1. 2. 61.

Habitat in America.

cuprea. 28. C. rubro cuprea nitida ſubtus cyanea.

Cryptocephalus cupreus Ent. ſyſt. 1. 2. 62.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

cyanea. 29. C. cyanea thorace pedibusque rufis.

Cryptocephalus cyaneus Ent. ſyſt. 1. 2. 63.

Habitat in Gallia Dom. Mallet.

bucephala. 30. C. cyanea ore thoracis marginibus pedibusque rubris.

Cryptocephalus bucephalus Ent. ſyſt. 1. 2. 6

Habitat in Anthylli vulneraria.

Scopolina. 31. C. nigra thorace rufo, elytris rufis: duabus cyaneis pedibus nigris.

Cryptocephalus Scopolinus Ent. ſyſt. 1. 2. 6

Habitat in America, Europa auſtrali.

Koenigii. 32. C. rufa elytris punctis duobus coeruleſcentibus.

Cryptocephalus Koenigii Ent. ſyſt. 1. 2. 68. 80.
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

3. C. elytris flauis: lineola punctisque tribus nigris. *paracentheſis.*
Cryptocephalus paracentheſis Ent. ſyſt. 1. 2. 68. 81.
Habitat, in Europae Salice, Betula.

4. C. aenea nitida fronte cuprea. *Hordei.*
Cryptocephalus Hordei Ent. ſyſt. 1. 2. 69. 82.
Habitat in Barbariae Hordeo murino D. Vahl.

5. C. viridi aenea nitida antennis baſi flaueſcentibus, fronte impreſſa. *concolor.*
Cryptocephalus concolor Ent. ſyſt. 1. 2. 69. 83.
Habitat in Europa.

86. C. flaua thorace maculato, elytris vittis duabus poſtice coeuntibus atris. *picta.*
Habitat in Guinea Dom. Lund.
Magna in hoc genere. Antennae breues, ſerratae, nigrae, baſi pallidae. Caput nigrum. Thorax nitidus, glaber flauus maculis duabus dorſalibus margine poſtico lunato nigro connexis. Elytra nitida, flaua vittis duabus magnis, quarum interior baſin haud attingit pone medium fere in faſciam dilatatis, coeuntibus et poſtice in unicam terminantibus. Corpus nigrum cinereo nitidulum pedibus anticis elongatis.

HISPA. *Palpi* aequales, medio c
ſiores filiformes.
Maxilla bifida.
Labium corneum, integr
Antennae cylindricae.

hyſtrix. 2—3. H. antennis fuſiformibus teſtaceo nigro
variegata, thorace utrinque dilatato quin
ſpinoſo.

Habitat in India Mimoſis Dom. Daldorff.

Statura praecedentis. Caput teſtaceum o
nigris. Thorax planus teſtaceus linea m
abbreuiataque laterali nigris. Margo u
que prominens, dilatatus ſpinis quinqu
lidis, acutiſſimis, teſtaceis, apice ni
Elytra punctato ſtriata, teſtaceo nigro
varia ſpinis plurimis, eleuatis, ſparſis,
Margo poſtice dilatatus, niger ſpinis p
mis, acutis, ſerratis. Corpus et pede
ſtacea.

4puſtulata. 3—4. H. antennis ſerratis hirta atra elytris
culis duabus rufis.

Habitat in Gallia Dom. Brongiard.

Statura et magnitudo H. 2puſtulatae at el
maculis duabus rufis. Vix huius generis
detur, potius forte Lagria.

gibba. 13. H. ferruginea elytris baſi utrinque gibbis a
ce ungulato dentatis coeruleis.

Hiſpa gibba Olivier.

Habitat in Inſula St. Domingo Dom. Boſc.

Parua. Antennae fuſiformes, atrae. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra punctato ſtriata, rufa baſi utrinque tuberculo magno, eleuato, apice angulata, dentata, cyanea. Pedes rufi.

4. H. nigra elytris obſcure aeneis: vitta rufa. *vittata.*

Habitat in Carolina D. Boſc.

Statura praecedentium. Caput obſcure rufum antennis nigris. Thorax obſcure aeneo nitens lateribus rufis. Elytra ſtriata punctataque obſcure aenea, nitidula vitta lata, rufa. Corpus nigrum.

5. H. atra capite villoſo fuluo. *capitata.*

Habitat in Carolina Dom. Boſc.

Reliquis longior. Caput inaequale fuluum antennis nigris. Thorax quadratus angulo antice ſubſpinoſo. Elytra ſulcata punctataque atra margine integro.

TILLUS. *Palpi* quatuor inaequales.
antici filiformes.
poſtici ſecuriformes.
Labium membranaceum, inter palpos porrectum, integrum.
Antennae ſerratae.

1—2. T. villoſus niger thorace rufo, antennarum articulis duobus ultimis dilatato compreſſis acutis. *damicornis.*

Habitat in America boreali Dom. Hirſhell.

Statura et magnitudo omnino T. elongati. An-
tennae ſingulares, nigrae articulis duobus ul-
timis maioribus dilatatis, compreſſis, ac-
minatis. Corpus totum villoſum, nigr
obſcurum thorace ſolo rufo.

Weberi. 1—2. T. hirtus niger thorace rufo elytris co-
leis, antennarum articulis tribus ultimi
latato compreſſis.

Habitat in Germania Dom. Weber.

Statura omnino praecedentis at alius et m
Antennae vix huius generis nigrae art
tribus ultimis maioribus, compreſſis,
ro latere dilatatis. Corpus hirtum, nigr
Thorax rufus. Elytra hirta, coerulea.
des nigri.

LAGRIA. *Palpi* quatuor inaequal
antici ſecuriformes.
poſtici extrorſum cra
res.
Labium membranace
integrum.
Antennae filiformes.

viridipennis, 1—2. L. villoſa atra elytris viridibus.

Habitat in Tanger Schousboe Muſ. Dom. L
Statura et magnitudo praecedentium at
atra elytris ſolis viridibus cyaneo nitidis.

haemorrhoidalis. 10—11. L. hirta atra elytris macula apicis r

Habitat in Tanger Dom. Schousboe.

Paullo minor L. atra at eiusdem ſtaturae. Diſtincta macula magna communi, rufa ad apicem coleoptrorum.

—15. L. villoſa aenea antennis pedibusque nigris. *aenea.*

Habitat in Tanger Dom. Schousboe.

Statura et ſumma affinitas L. coeruleae. Corpus totum villoſum, viridiaeneum pedibus antennisque totis nigris.

5—6. L. liuida pedibus flaueſcentibus. *liuida.*

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Statura parua praecedentium. Antennae breues, filiformes. Corpus totum villoſum, liuidum pedibus ſolis flaueſcentibus.

LYTTA. *Palpi* quatuor inaequales.
poſtici clauati.
Maxilla bifida.
Labium truncatum.
Antennae filiformes.

12—3. L. corpore nigro cinereo tomentoſo. *cinerea.*

Habitat in America Dom. Hybner.

Nimis reliquis affinis at tota tomento cinereo tecta.

15—6. L. cinereo villoſa elytrorum marginibus albis. *villoſa.*

Pall. Icon. tab. E. fig. 30.

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Statura et magnitudo L. collaris et omnino diſtincta. Antennae nigrae articulo 1. 2. 3.

ruſis. Corpus totum cinereo villoſum
trorum margine et ſutura albis.

MYLABRIS. *Palpi* quatuor filiform
Maxilla cornea, comp
ſa, bifida.
Labium membranace
ſub marginatum.
Antennae moniliform

Sidae. 7—8. M. villoſa nigra elytris macula baſeos
ciisque duabus dentatis ferrugineis, an
nis nigris.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Nimis affinis M. Hermanniae at differt an
nis totis nigris elytrorumque faſciis obl
ferrugineis.

6maculata. 9—10. M. atra elytris teſtaceis: punctis tri
nigris.
Habitat in Roſſia meridionali Dom. Boeber.
An ſatis diſtincta a M. 10punctata. Di
tantum punctis elytrorum tribus. 2. 1. A
tennae pedesque nigrae.

geminata. 9—10. M. atra nitida elytris pallidis: punctis do
rum parium faſciaque media nigris.
Habitat in Roſſia Dom. Boeber.
Parua, atra, nitida. Elytra laeuia, palli
pari punctorum ad baſin alteroque verſus ap
cem faſciaque media, ſinuata, ſuturam ha
attingente atris.

11. M. atra antennis ferrugineis, elytris pallidis, punctis tribus faſciisque duabus atris. *ruficornis.*
Habitat in Mogador Africae Dom. Schousboe.
Parua. Caput et thorax hirta, atra antennis ferrugineis. Elytra laeuia pallida punctis tribus baſeos 1. 2. faſciisque duabus poſticis ſinuatis, quarum anterior ſuturam haud attingit, atris. Corpus atrum pedibus flauis.

M. hirta nigra elytris faſcia poſtica punctoque apicis flauis. *minuta.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dr. Weber.
Parua an a praecedentibus ſatis diſtincta tota hirta nigra. Elytra faſcia poſtica dentata et puncto magno apicis flauis.

DIRCAEA. *Palpi* quatuor inaequales, *anteriores* porrecti articulo ultimo maximo trilobo.
Antennae filiformes.

D. fuſca antennis tibiisque piceis. *barbata.*
Lymexylon barbatum Ent. ſyſt. 1. 2. 92. 4. Oliv. Inſ. 25. 5. 3. tab. 1. fig. 3.
Mordella barbata Schall. Act. Hall. 1. 322. tab. 1. fig. 7.
Serropalpus Hellenii Act. Suec.
Serropalpus Latreille Inſ. 30. 56.
Habitat in Germaniae lignis.

D. nigra elytris obſcure teſtaceis. *diſcolor.*
Serropalpus laeuigatus Hellen. Act. Suec.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino praecedentis at duplo
Antennae filiformes, fuſcae. Caput
rax nigra, obſcura. Elytra laeuia,
teſtacea. Pedes nigri tibiis fuſcis.
forte ſexu elytris totis nigris.

4guttata. 3. D. atra elytris maculis quatuor fuluis.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Statura et magnitudo praecedentis. Cap
uum antennis nigricantibus. Thorax
rectus, laeuis, ater, opacus, immac
Elytra laeuia, nigra maculis duabus
Pedes nigri tarſis pallidioribus.

ruficollis. 4. D. nigricans thorace anoque fuluis.

Habitat ſub arborum corticibus Finlandiae

Huius generis videtur. Caput atrum.
rax fuluus, immaculatus. Elytra
atra, immaculata. Corpus atrum an
fuluo.

Dircaeae corpus elongatum, ſubcylindricum,
ginatum, laeue, tardum, capite inflexo, oculis
datis vix prominulis, lateralibus, antennis co
nioribus ante oculos inſertis, thorace gibbo
angulo poſtico utrinque prominulo, elytris
paullo longioribus, pedibus curſoriis, compreſſ
ſis quatuor anticis quinque articulatis, poſticis
articularis: articulo ſecundo bilobo, colore obſ

CUCUIUS. *Palpi* quatuor aequales: articulo ultimo craſſiori, truncato.

Labium breue, bifidum: laciniis linearibus, diſtantibus.

Antennae moniliformes et filiformes.

3. C. depreſſus rufus elytris ſtriatis. *rufus.*

Habitat in Carolina Dom. Boſc.

Magnus in hoc genere. Antennae corpore paullo breuiores, craſſae, rufae: articulis diſtinctis, cylindricis. Caput rufum. Thorax planus, depreſſus margine utrinque antice poſticeque acutiuſculo. Elytra ſtriata. Pedes breues, compreſſi.

COSSYPHUS. *Palpi* quatuor inaequales.

antici ſecuriformes.

Maxilla bifida.

Antennae claua perfoliata.

1. C. antennis clypeo breuioribus Ent. ſyſt. 1, 2. 97. 1*. *depreſſus.*

Habitat in India orientali, Mauritania.

2. C. antennis clypeo longioribus.

Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Seheſtedt.

Praecedenti nimis affinis et forte mera v-
rietas duplo maior.

LAMPYRIS. *Palpi* quatuor ſub-
ti.
Maxilla bifida.
Labium integrum,
neum.
Antennae filiformes.

pallens. 15—6. L. pallida abdominis ſegmento qu-
biſſimo.
Brown. Jamaic. tab. 4. fig. 9. a. b.
Habitat in Americae meridionalis Inſul-
D. Lund.
Statura media praecedentium. Clypeus
parum anguſtatus elytraque laeuia,
pallida, immaculata. Corpus palli-
mento abdominis quarto albiſſimo.

veſpertina. 18—9. L. teſtacea elytris apice nigris, a-
ne apice albiſſimo.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Media. Caput nigrum oculis magnis,
ſis. Thorax rotundatus, teſtaceus.
laeuia, teſtacea, apice nigra. Corpus
ceum abdomine apice albiſſimo.

cajennenſis. 20—1. L. nigra thoracis clypeo rufo: ma-
rufeſcente, antennis flabellatis.
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Magnitudo L. italicae at omnino diſtincta.
tennae flabellatae, nigrae articulo primo

lido. Thoracis clypeus rotundatus, rufus margine hyalino. Elytra atra. Pedes antici teſtacei. Abdomen mihi deeſt.

2. L. nigra thorace maculato elytris margine vittaque media flaueſcentibus, abdomine apice albiſſimo. *verſicolor.*

Habitat in America boreali Dom. Hirshell.

Corpus magnum. Antennae nigrae articulis baſi parum flaueſcentibus. Caput flaueſcens ore nigro. Thorax rotundatus, planus, in medio niger utrinque macula magna rufa margineque late flaueſcente. Elytra laeuia, nigra margine, ſutura vittaque abbreuiata flaueſcentibus. Abdomen apice late albiſſimum. Pedes nigri geniculis flaueſcentibus.

3. L. pallida teſtacea thorace elytrisque maculis duabus marginalibus nigris. *maculata.*

Lampyris maculata Oliv. Inſ. 28. tab. 1. fig. 3.

Habitat Surinamo Muſ. Dom. Holthuyſen.

Statura et magnitudo L. mauritanicae. Clypeus rotundatus macula utrinque magna marginali baſeos nigra. Elytra laeuia litura dorſali baſeos maculisque duabus marginalibus ante medium nigris. Corpus ferrugineum abdominis ſegmentis ultimis albiſſimis.

LYCUS. Os roſtro cylindrico, incuruo.
Palpi quatuor: articulo ultimo craſſiori, truncato.
Antennae filiformes.

5. L. niger thoracis lateribus elytrisque rufis. *ferrugineus.*

Habitat in India orientali Muſ. Dom. de
ſtedt.

Statura praecedentis. Antennae com
ſerratae, atrae. Corpus atrum. Th
medio ater lateribus rufis. Elytra la
ta, ferruginea, immaculata. Pedes

RIPIPHORUS. *Palpi* quatuor filif
Maxilla ouata,
ſima.
Labium acutum.
Antennae flabellifo

ſpinoſus. 3—4. R. ater elytris baſi flauis, thorace
dente compreſſo recumbente.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis
v. Rohr.

Magnus. Caput et thorax atra, imm
Thorax dente magno recumbente ſup
tellum. Elytra attenuata, nigra, baſi
Corpus atrum abdominis primo ſeg
ſanguineo.

lituratus. 8—9. R. capite thoraceque ferrugineis,
teſtaceis: litura baſeos punctoque apicis

Habitat — — —

Affinis certe R. 2maculato at triplo maior
put eleuatum, ferrugineum ore atro.
rax obſcure ferrugineus, immaculatus.
tra attenuata, teſtacea lunula in ipſa
punctoque verſus apicem nigris. Co
atrum uno late ferrugineo. Pedes nigri

MORDELLA. *Palpi* quatuor inaequales.
antici clauati.
poſtici filiformes.
Maxilla bifida.
Labium membranaceum, bifidum.
Antennae moniliformes.

4. M. ano aculeato atra thorace rufo: macula nigra elytris baſi macula rufa. *variegata.*
Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.
Statura et magnitudo praecedentium. Caput nigrum. Thorax rufus macula magna baſeos nigra. Elytra nigra macula magna, oblonga baſeos rufa. Pedes rufi.

4. M. ano aculeato griſeo pubeſcens thorace macula dorſali, elytris puncto baſeos faſciisque duabus atris. *pubeſcens.*
Habitat in America Dom. Hybner.
Statura et magnitudo praecedentium. Corpus griſeo pubeſcens. Thorax macula magna, dorſali, atra, glabra. Elytra puncto diſtincto baſeos, faſciisque duabus atris. Abdomen in altero ſexu aculeatum.

5. M. ano aculeato ferruginea elytris nigris. *nigripennis.*
Habitat in America Dom. Hybner.
Statura praecedentium. Corpus totum ferrugineum elytris ſolis nigris.

DONACIA. *Palpi* quatuor filifo[rmes]
Maxilla unidentata.
Labium membrana[ceum]
integrum.
Antennae ſetaceae.

Equiſeti. 1—2. D. nigra thorace elytrisque pallidi[s, elytris] unispinoſis.

Habitat in Franconiae Equiſeto limoſo [...] Hôppe.

Reliquis minor. Caput cum antennis n[igrum]. Thorax pallidus lineolis duabus abbr[eviatis] obliquis, nigris. Elytra punctato[-striata] pallida apice ſpina porrecta, acuta. [Pedes] elongati, pallidi. Corpus nigrum.

TRICHIUS. *Palpi* quatuor filifor[mes]
Maxilla bifida.
Antennae clauato la[mella]tae.

hirtus. 17—18. T. hirtus ſupra niger, ſubtus albi[dus].

Habitat ad Cap. B. ſpei D. Daldorff.

Statura fere Melolonthae at huius generis [Ca]pitis clypeus porrectus, acutus, bide[ntatus]. Caput, thorax, elytra hirta nigra [...] triangulum. Corpus ſubtus pilis albis [...] hirtum. Pedes elongati, mutici, nigri.

piloſus. 17—18. T. hirtus ſubteſtaceus capite thora[ce] nigris elytris piceis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei D. Daldorff.

Statura praecedentis. Clypeus porrectus, acutus, bidentatus. Caput et thorax hirta, atra. Elytra picea. Scutellum triangulum. Corpus ſubtus teſtaceo hirtum.

CETONIA. *Maxilla* apice ſetoſa.
Labium coriaceum, emarginatum, palpos tegens.
Antennae lamellatae.

~6. C. obſcure viridis thoracis margine flaueſcente. *Franciſca.*
Habitat in India Dom. Daldorff.
Duplo maior C. Chryſis ſupra tota obſcure viridis, nullo modo nitida thoracis margine ſolo flaueſcente. Subtus cupro nitida ſterno porrecto, cornuto.

4~5. C. obſcure brunnea thorace punctis quatuor atris, elytris macula magna flexuoſa flaua. *flauomaculata.*
Cetonia *flauomaculata* Degeer Inſ. 7.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.
Magnitudo C. ſinuatae. Capitis clypeus porrectus ſubemarginatus, brunneus. Thorax laeuis, obſcure brunneus, nitidus punctis quatuor atris 2. 2. Elytra ſubtiliſſime punctato ſtriata macula magna pone medium flexuoſa flaua. Sternum porrectum.

9~90. C. thorace ferrugineo: punctis quatuor nigris, elytris ferrugineis: limbo atro albopunctato. *albopunctata.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lu

Media. Caput nigrum, immaculatum c emarginato. Thorax obſcure brunneu ctis quatuor atris, anticis ſubmargina Elytra vix ſtriata, ferruginea margine riori atro punctis quatuor albis, ſutura lineola alba. Anus niger prominet p quatuor albis. Corpus atrum abdomine que lineis duabus punctorum alborum.

cineraſcens. 89—90. C. thoracis dorſo atro: linea cin cente, elytris cinereis nigro maculatis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lu

Statura parua praecedentium. Caput ci cens clypeo emarginato. Thorax dorſo linea media poſtice bifida, cinerea. M cinereus puncto nigro. Elytra vix ſtriata nerea, atro maculata. Corpus cinereum domine atro maculis lateralibus trans albis.

irrorata. 89—90. C. nigra elytris ſtriatis ferrugineis n maculatis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lu

Statura praecedentium. Caput nigrum cl emarginato. Thorax niger margine a in medio parum eleuato. Elytra ſtriata ruginea punctis maculisque numeroſis, gris. Corpus nigrum.

furuata. 89—90. C. thorace elytrisque teſtaceis n punctatis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lun

Parua. Caput nigrum. Thorax teſtaceus lineolis punctisque nigris. Elytra vix ſtriata, teſtacea punctis numeroſis nigris. Corpus cinereo villoſum.

MELOLONTHA. *Maxilla* breuis, cornea, apice multidentata: dentibus ſimplicibus, acutis.
Antennae lamellatae.

7—8. M. glabra atra thorace punctato, elytris ſubſtriatis. *Morio.*
Habitat in Nympheae floribus Indiae orientalis Muſ. Dom. Lund.
Statura et magnitudo omnino M. barbatae. Caput nigrum puncto frontali impreſſo. Thorax ater, punctatus. Elytra ſubſtriata. Corpus atrum.

7—8. M. glabra obſcura elytris teſtaceis, clypeo quadridentato. *quadridens.*
Habitat in India orientali Dom. Hybner.
Statura parua M. ruficollis. Clypeus rotundatus, niger, acute quadridentatus. Thorax obſcurus, glaber, immaculatus. Elytra laeuia, teſtacea.

3—4. M. glabra punctata rufa capite nigro. *ferruginea.*
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Affinis M. melanocephalae at diſtincta. Caput

nigrum, immaculatum. Thorax et e punctata, rufa, immaculata. Corpus ru

pallens. 43—4. M. glabra pallida capitis baſi thora punctis duobus nigris.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Affinis videtur M. erythrocephalae paullo ior. Caput baſi nigrum, apice palli Thorax pallidus punctis duobus antic gris. Corpus pallidum.

moerens. 64—5. M. rufa elytris teſtaceis, pectore

Habitat in America boreali Dom. v. Roh

Statura M. horticolae. Antennarum cla gra. Caput et thorax glabra, laeuia, ruginea. Elytra ſtriata, teſtacea, abd ne breuiora. Corpus ferrugineum pe nigro.

lucicola. 66—7. M. glabra nigra thoracis margine el que teſtaceis.

Habitat in America boreali Dom. v. Roh

Statura omnino M. horticolae paullo m Caput glabrum, nigrum, immacul Thorax glaber, niger margine teſtaceo. tra ſubſtriata, teſtacea, immaculata. pus nigrum.

atrata. 66—7. M. glabra atra elytris ſtriatis.

Habitat in America boreali Dom. v. Roht.

Nimis reliquis affinis attamen diſtincta vid. Caput et thorax laeuia, glabra, atra. tra ſtriata abdomini breuiore.

4—5. M. villoſa capite thoraceque obſcure ae- *lineata.*
neis, elytris teſtaceis: marginibus lineolisque
duabus nigris.
Habitat in Africae borealis arboribus Dom.
Schousboe.
Statura omnino et ſumma affinitas praeceden-
tium. Corpus nigrum, cinereo villoſum.
Caput et thorax obſcure aenea, villoſa, cly-
peo reflexo. Elytra ſubſtriata, teſtacea mar-
gine exteriori, ſutura lineolaque baſeos alte-
raque apicis nigris.

0—1. M. nigra elytris flauis: faſcia atra femo- *calcarata.*
ribus tibiisque poſticis rufis ſpinoſis.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Lund.
Parua. Caput et thorax ſubuilloſa, nigra, im-
maculata. Elytra flaua margine exteriore
faſciaque poſtica, quae ad ſuturam valde ex-
tenditur, atris. Pedes rufi femoribus po-
ſticis incraſſatis, compreſſis, verſus apicem
uniſpinoſis, tibiis incuruis baſi apiceque uni-
ſpinoſis.

81—2. M. glabra atra baſi maculaque media pal- *pygmaea.*
lidis.
Habitat in Carolina Dom. Boſc.
M. graminicola minor. Caput nigrum clypeo
reflexo, ſubemarginato. Thorax glaber, ater,
aeneo parum nitidulus. Elytra ſtriata baſi
late maculaque media pallidis. Corpus et
pedes atra.

BUPRESTIS. *Palpi* quatuor filifor[...]
articulo ultimo ob[...]
truncato.
Maxilla obtuſa, uni[...]
tata.
Labium cylindricum, [...]
minatum.
Antennae ſerratae.

nigrita. 3—4. B. elytris acuminatis nigra glabra [...] dentato.

Habitat in Tangier Dom. Schousboe [...] Dom. Lund.

Corpus paruum, atrum, immaculatum. [...]tra valde acuminata. Anus bidentatus. [...]tus aeneo nitens. Magnitudo parua B. [...]neae.

melancholica. 20—1. B. elytris bidentatis aeneo nigra th[...] punctato nigra, elytris ſtriatis.

Habitat in Indiis Muſ. Dom. de Seheſted[...]

Magnitudo fere B. Berolinenſis. Corpus nig[...] oculis pallide teſtaceis. Thorax punct[...] niger, obſcurus. Elytra ſtriata, biden[...] nigra, aeneo nitida, inprimis verſus [...]ram. Corpus nigrum, aeneo nitidum. [...]domen atrum, nitidum.

manipularis. 73—4. B. elytris integris violaceis: ſtrigis du[...] e punctis faſciculato albis.

Habitat in Tanger Muſ. Dom. Lund.

B. Onopordi paullo maior. Antennae nig[...] Thorax hirtus, varioloſus, violaceus. [...]

tra integra, violacea ſtrigis duabus e punctis faſciculato piloſis, albis. Pedes nigri anterioribus longioribus.

—6. B. elytris integris aenea hirta pedibus concoloribus. *piloſa.*

Habitat in Marocco Muſ. Dom. Lund.

Statura et magnitudo omnino B. Onopordi at diſtincta videtur. Antennae valde ſerratae, nigrae. Corpus totum viridi aeneum pilis longioribus cineraſcentibus hirtum. Pedes aenei.

—3. B. elytris integris elongato attenuatis truncatis aenea thorace elytrisque reticulato punctatis. *reticulata.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Maior B. acuminata et omnino diſtincta. Corpus totum obſcure aeneum, minime nitidum. Thorax et elytra punctis plurimis impreſſis, confluentibus reticulata. Elytra poſtice elongata at obtuſa truncata. Abdomen ſubtus ſcabrum.

88—9. B. elytris integris ſtriatis coeruleo maculatis, corpore rufo. *ſanguinea.*

Habitat in Mogador Schousboe Muſ. Dom. Lund.

Statura et magnitudo B. tenebricoſae. Caput canaliculatum, nigrum macula magna frontali, rufa punctis duobus paruis, nigris. Thorax ſubpunctatus, rufus punctis tribus transuerſim poſitis, nigris. Elytra integra, ſtriata, rufa punctis coeruleis, 1 baſeos ad mar-

ginem 3. interiori communi, longiori
teriori minori 1. marginali transuerſo,
mo apicis communi. Subtus tomento
hirta. Pedes nigri.

10punctata. 90—1. B. elytris integris viridi aenea th
punctis duobus elytris quinque atris.
Habitat Galliae Alpibus Dom. Brongiart.
Statura B. Rubi tota aenea, nitida. Ant
nigro aeneae. Thorax punctis duobus
ſalibus elytraque quinque atris annulo
leſcente cinctis. Elytra ſtriata.

angulata. 91—2 B. elytris integris: baſi faſciisque u
cinereis, corpore aeneo cinereo villoſo.
Habitat in India Muſ. Dom. de Scheffer
Statura B. Rubi at triplo minor. Caput
rax aenea, cinereo villoſa. Elytra
nigra baſi faſciisque duabus undatis, ci
Corpus aeneum, cinereo villoſum.

exaltata. 97—8. B. elytris integris ſupra viridis th
margine corporeque aureis.
Habitat Cajennae.
Media. Caput viridi fronte aurea antennis
nigris. Thorax ſcaber obſcure viridis
dorſali pallidiore margineque aureo. El
ſubſcabra obſcure viridia, immaculata.
pus aureum, nitidiſſimum pedibus viridi

14guttata. 98—9. B. elytris integris nigra thoracis pu
utrinque tribus marginalibus elytris lepi
flaueſcentibus.
Habitat — — Dom. Weber.

arua. Caput fuſcum. Thorax fuſcus margine utrinque punctis tribus flauis poſteriore paullo maiore. Elytra crenato ſtriata, nigra punctis 1. 2. 2. 2. flauis baſeos linearibus. Corpus nigrum.

4—5. B. elytris integris laeuibus ferrugineo irroratis, corpore nigro obſcuro. *adſperſa.*

Habitat in Africa Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Statura omnino B. umbellatarum. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra ſubſtriata, nigra inprimis apice ferrugineo irrorata.

1—2. B. elytris integris; ſtrigis cinereis, corpore aeneo. *puſilla.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff Muſ. D. de Seheſtedt.

Statura omnino B. minutae at duplo adhuc minor tota aenea ſtrigis aliquot elytrorum cinereis, undatis.

13—4. B. elytris integris linearibus: lineis duabus eleuatis, thorace inaequali, corpore atro. *plana.*

Habitat in Senegallia Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Paullo maior B. viridis. Caput valde canaliculatum oculis prominulis. Thorax inaequalis, niger, immaculatus. Elytra integra, nigra lineis duabus eleuatis atomisque rarioribus, cinereis.

127—8. B. elytris integris ſubſtriatis cuprea thorace cylindrico. *paruula.*

Habitat Tangier Dom. Schousboe Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Corpus paruum cylindricum, cupreum, dum, immaculatum. Differt inprim race haud depreſſo marginato, ſed cylin Elytra ſubſtriata.

thoracica. 128—9. B. elytris integris obſcuris: macu bus viridibus impreſſis, thorace aureo

Habitat in Inſula St. Thomas Americae Lund.

Statura et magnitudo B. candens. Capu de fronte rufeſcente. Thorax rufo a nitidus, immaculatus. Elytra integra ca maculis tribus impreſſis, viridibus a ri maiori baſeos duabusque in medio ne alteram. Corpus atrum, nitidum.

ELATER. *Palpi* ſecuriformes.
Maxilla unidentata,
Labium bifidum.
Antennae filiformes.

tomentoſus. 4—5. E. niger ferrugineo tomentoſus, ſtriatis.

Habitat in India orientali.

Corpus magnum E. lurido affine at diſtin totum nigrum, tomento ferrugineo tum. Elytra magis rotundata, ſtriata.

morio. 16—17. E. ater elytris ſtriatis, ſcutello griſeo

Habitat in America boreali Dom. Hybner.

Statura E. aterrimi at duplo maior, totus nitidus. Elytra crenato ſtriata. Scutel villoſo griſeum.

17. E. ater nitidus antennis pedibusque fuſ- *laeuigatus.*
cis, elytris laeuiſſimis.
Habitat in America boreali Dom. Hybner.
Statura et magnitudo praecedentis totus ater, nitidus, immaculatus. Elytra laeuiſſima. Antennae et pedes fuſca.

9. E. corpore atro: atomis numeroſiſſimis *atomarius.*
albis.
Elater atomarius Linn. ſyſt. Nat. 2. 655. 28. Fn. Sv 738.
Elater puluerulentus Panzer. Fn. Germ.
Habitat in Germania Dom. Panzer.
Statura E. faſciati paullo minor totus ater, obſcurus atomis numeroſiſſimis, paruis undique irroratus. Thorax in medio impreſſus.

4. E. ſubpubeſcens obſcure cupreus ſcutello *aeruginoſus.*
pallido.
Elater aeruginoſus Oliv. Inſ. 31. tab. 3.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Statura omninó E. pectinicornis. Antennae ſerratae, nigrae. Caput et thorax obſcure cuprea, minime nitida. Scutellum cinereo villoſum. Elytra ſtriata.

6—7. E. ater elytris ſtriatis obſcure aeneis. *melancholicus.*
Habitat in Dalekarliae Alpibus D. de Paykull.
Statura et magnitudo omnino E. piloſi. Corpus totum atrum. Elytra ſtriata, obſcure aenea. Pedes fuſci femoribus nigris.

1—2. E. cinereus thorace poſtice tridentato. *tridentatus.*
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff Muſ. D. Lund.

Paruus. Thorax obſcure cinereus punctis dorſalibus, eleuatis, minutis. posticus tridentatus ordinariis duobus lateralibus et medio valido, compreſſo. ſtriata, cinerea. Pedes flaueſcentes.

equeſtris. 78—9. E. ater nitens elytris faſcia lata fulua.

Habitat in Germania Dom. Mauerhoff.

Statura parua praecedentium. Caput, elytra atra, nitida, laeuiſſima elytris faſcia lata fulua.

2punctatus. 78—9. E. niger elytris teſtaceis: punctis nigris.

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Lund.

Paruus. Caput, thorax, corpus nigra, culata. Elytra ſtriata, teſtacea punctis bus magnis nigris.

LUCANUS. *Penicilli* duo ſub labio pigeri. *Antennae* pectinatae les.

rufipes. 15. L. mandibulis lunatis vireſcens abdomine dibusque rufis.

Habitat in Germania.

Nimis affinis praecedenti et forte mera varietas. Differt tantum colore magis cente abdomineque et pedibus rufis.

PRIONUS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla cylindrica, integra.
Labium breuiſſimum, membranaceum.
Antennae ſetaceae.

7. P. thorace ſubmarginato unidentato pubeſcente, corpore pallido, antennis mediocribus. *pallens.*
Habitat in Africa Muſ. Dom. Lund.
Statura omnino P. depſarii at duplo fere maior. Antennae longitudine corporis ſubferrugineae. Caput et thorax nigra, cinereo pubeſcentia. Elytra laeuia, pallida, apice mucronata. Pectus cinereo pubeſcens. Abdomen pallidum. Pedes nigri.

—11. P. thorace bidentato: dente poſteriori longiori arcuato, antennarum articulis ultimis apice ſpinoſis. *tranquebaricus.*
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Medius. Antennae breues, nigrae articulis ultimis apice ſpinoſis. Mandibulae breues, arcuatae, validae. Thorax dentibus duobus validis, acutis anteriore minore, recto, poſteriore arcuato. Elytra vix ſtriata, picea. Corpus nigrum ſubtus aureo pubeſcens.

14—15. P. thorace utrinque tridentato ater elytris ferrugineis, antennis compreſſis breuibus, mandibulis elongatis forficatis extus unidentatis. *forficatus.*

Habitat in Tangier Dom. Schousboe M.
Lund.

Statura magna P. buphtalmi. Mandibu-
nae, incuruae, elongatae, forfica-
medio incraſſatae, extus dente paruo
acutae. Antennae breues, compreſ-
grae. Thorax planus, ater utrinque
bus duobus recuruis, acutis, tertio
minuto. Elytra laeuia, ferruginea,
nata. Pedes nigri.

CERAMBYX. *Palpi* quatuor filiform-
Maxilla obtuſa, un-
tata.
Labium bifidum.
Antennae ſetaceae.

longimanus. 1. C. thorace ſpinis mobilibus, elytris bi-
dentatis apiceque bidentatis, antennis
Prionus longimanus Ent. ſyſt 1. 2. 242.
Habitat in America meridionali.

cyanicornis. 12—3. C. thorace ſubſpinoſo viridis nite-
tennis breuibus, coeruleis, femoribus
cis clauatis ferrugineis.
Habitat in Aquapim Guineae Muſ. D. L.
Corpus paruum, viride. Antennae breues,
ruleae: articulo tertio longiore, incu-
Thorax rotundatus, punctatus, vix ſ-
ſus. Elytra laeuia, viridia. Pedes co-
leſcentes femoribus clauatis anticis qua-
ferrugineis.

18. C. niger thorace ſpinoſo tuberculatoque elytris baſi ſcabris apice emarginatis, antennis longis. *tuberculatus.*

Habitat Cajennae Dom. Cuvier.

Magnus. Antennae corpore longiores, inermes. Thorax niger ſpinis utrinque duabus lateralibus, una ſupra alteram tuberculis tribus dorſalibus obtuſis. Elytra obſcura baſi punctis eleuatis ſcabra apice late emarginata.

7. C. thorace ſpinoſo, elytris macula baſeos ſanguinea. *humeralis.*

Habitat in America boreali Dom. Hirſhel.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Antennae corpore paullo longiores, nigrae. Thorax ſcaber ſpinoſusque. Elytra apice emarginata, nigra macula magna, humerali, ſanguinea. Pedes nigri.

9. C. thorace inermi nigro: lineis quatuor albis, elytris obſcure cyaneis: lineolis faſciaque media abbreuiata impreſſis cinereis. *ſcriptus.*

Habitat in Isle de France Muſ. Dom. Boſc.

Medius. Antennae in altero ſexu longiſſimae, in altero mediocres, nigrae. Caput nigrum, cinereo tomentoſum. Thorax inermis, niger lineis quatuor albis. Elytra obſcure cyanea, apice bidentata linea ſuturali integra, lineolis tribus baſeos: interiore longiore, intermedia interrupta, exteriore breuiſſima, in medio faſcia lata, utrinque abbreuiata apiceque lineola ſolitaria griſeis. Corpus et pedes nigri.

LAMIA. *Palpi* quatuor fiIiform[es]
Maxilla cornea, bifida.
Labium corneum, bifid[um]
Antennae ſetaceae.

marmorata. 6—7. L. thorace acute ſpinoſo cinereo fu[ſ]
varia elytris baſi tuberculatis, antennis
Habitat in Africa Muſ. D. B. ſc.
Statura et magnitudo L. textor. Antenn[ae]
pore longiores, obſcurae. Caput ci[n]
punctis duobus verticalibus fuſcis.
acute ſpinoſus utriuque maculis tribu[s]
libus fuſcis. Elytra cinereo fuſ oq[ue]
baſi ſcabra tuberculis duobus eleuat[is]
riore acutiore. Pedes cinerei femoribu[s]
preſſis tibiisque anticis apice barbatis

mixta. 26—7. L. thorace ſpinoſo cinereo fuſcoq[ue]
gato antennis longis.
Habitat in America boreali Dom. v. Ro[h]
Statura praecedentium at minor. Tho[rax]
noſus at haud tuberculatus. Antenn[ae]
pore longiores uti totum corpus vari[e]
Femora clauata.

obſcura. 26—7. L. thorace ſpinoſo fuſca elytris ſtri[a]
ce pallidis, antennis longis.
Habitat in America boreali Dom. v. Ro
Statura praecedentis at duplo minor.
nae corpore longiores, albo nigroque
Thorax ſpinoſus, ſubtuberculatus,
Elytra lineis eleuatis ſtriata, fuſco ci

paullo mixta, apice cinerea. Corpus fuſcum. Femora clauata.

2. L. thorace ſpinoſo nigra elytris faſciis duabus continuis rufis. *bicincta.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino L. capenſis at diſtincta. Corpus punctatum, atrum, faſciis duabus elytrorum continuis, rufis. Pedes nigri.

3. L. thorace ſpinoſo elytris teſtaceo cinereoque articulatis: baſi punctis eleuatis ſcabris. *ſpinator.*

Habitat in India orientali D. Daldorff.

Affinis certe L. ſcabrator at diſtincta videtur. Antennae mediocres articulorum apicibus nigris. Caput cinereum. Thorax acute ſpinoſus, cinereus lineis duabus dorſalibus, latis, teſtaceis. Elytra teſtaceo cinereoque reticulata angulo baſeos parum prominulo punctisque eleuatis plurimis atris apice emarginata. Corpus cinereum linea laterali teſtacea. Pedes cinerei.

3. L. thorace ſpinoſo elytriſque fuſco nigroque variis albo maculatis antennarum articulo tertio faſciculo pilorum. *barbicornis.*

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Animalculum pulcherrimum. Antennae mediocres fuſcae articulo tertio faſciculo magno pilorum nigrorum quarto paruo. Caput fuſcum, nigro varium. Thorax fuſcus nigro varius linea dorſali interrupta maculiſque lateralibus lacte albis. Elytra fuſco nigroque fere undata macula geminata in me-

dio marginis exterioris duabusque verſ
cem, punctisque dorſalibus minutis
albis.

Schrſtedii. 93—4. L. thorace ſpinoſo elytrisque fuſci
culis holoſericeis niueis.

Olivier 67. tab. 10. fig. 68.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Animalculum pulcherrimum. Antenn
diocres, nigrae. Caput fuſcum,
latum. Thorax acute uniſpinoſus,
utrinque macula magna longitudin
laque parua ſupra pedes holoſericeo
Elytra fuſca macula anteriore magna
gulari verſus ſuturam, ſecunda in
iori, poſtice ſinuata et in hoc ſinu f
diſtinctum, tertia denique verſus ap
tice ſinuata holoſericeis, niueis, nit
pus et pedes fuſca.

STENOCORUS. *Palpi* quatuor
antici filiform
poſtici clava
Antennae ſeta

cylindricollis. 16—7. St. thorace mutico cylindrico ciner
tris ferrugineis: maculis duabus flau
bus obſoletis.

Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Roh

Corpus paruum, cylindricum. Anten
diocres, flauae articulo primo reliq
apicibus ferrugineis. Caput cinereum
rax cylindricus, muticus punctis duob

ſalibus, minutis, eleuatis. Elytra integra, obſcura ferruginea maculis duabus flauis, obſoletis: anteriore maiore. Corpus ferrugineum femoribus clauatis.

30. St. thorace ſpinoſo fuſco cinereoque griſeus elytris bidentatis punctató ſtriatis. *plebejus.*
Habitat in America Dom. Hybner.
Corpus mediocre, anguſtum. Antennae corpore paullo longiores, griſeae. Caput et thorax ſpinoſus obſcure griſea. Elytra bidentata, punctato ſtriata fuſco cinereoque mixta, obſcura. Pedes griſei.

SAPERDA. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla membranacea, bifida.
Labium cordatum, truncatum.
Antennae ſetaceae.

5. S. liuida antennis elytrorumque punctis atris. *morbilloſa.*
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.
Statura magna S. populneae. Antennae vix longitudine corporis, nigrae. Caput et thorax liuida, immaculata. Elytra ſupra plana liuida punctis impreſſis, ſparſis, atris, apice truncata. Corpus liuidum.

3 19. S. thorace villoſo vireſcens coleoptrorum diſco fuſco: punctis duobus faſciaque communi lunata vireſcentibus. *diſcoidea.*

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.
Media. Caput fuſcum antennis breuibus. E
rax rotundatus, villoſus, vireſcens.
punctata, fuſca margine apiceque late
cto ante medium lunulaque in medio
centibus. Corpus vireſcens. Pedes pic

hirticornis. 50—1. S. griſea antennis longis hirtis.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Le
Statura parua, cylindrica S. hirtae. Ante
corpore paullo longiores, pilis longior
hirtae. Corpus totum griſeum ſiue cin
fuſcoque mixtum.

necydalea. 52—3. S. obſcura elytris abbreuiatis pallidis
tennis longis ferrugineis.
Habitat in Inſula St. Thomas Americae
Dom. Lund.
Parua. Antennae corpore longiores, fe
neae. Caput et thorax fuſca ferrugineo
inde maculata. Elytra laeuia abdomine
to breuiora, pallida faſciola aut lineola
Corpus fuſcum ano ferrugineo. Ped
ſtacei.

marginata. 47—8. S. glabra atra thoracis margine flauo
Habitat in Carolina Dom. Boſc.
Statura et magnitudo ſ. violaceae. Ante
mediocres nigrae. Caput atrum orbita
lorum flaua. Thorax cylindricus, ater
gine flauo. Elytra punctata, atra mar
baſeos parum albicante. Corpus atrum

CALLIDIUM. *Palpi* quatuor clauati.
Maxilla membranacea, biſida.
Labium biſidum: laciniis tenuiſſimis.
Antennae ſetaceae.

10. C. thorace pubeſcente nigrum punctatum *punctatum.*
femoribus rubris, antennis mediocribus.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura ſequentium at omnino diſtinctum. Thorace elytrisque utrinque punctatis.

6. C. thorace glabro ſubſpinoſo nigrum ely- *hungaricum.*
tris obſcure aeneis.
Callidium hungaricum Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 12.
Habitat in Germania Dom. Hybner.
Statura omnino C. variabilis at duplo maior. Antennae mediocres, nigrae. Thorax planus, laeuis, utrinque ſubſpinoſus. Elytra ſubrugoſa, obſcure aenea. Corpus nigrum femoribus clauatis.

8. C. thorace elytrisque cinereo villoſis, an- *concolor.*
tennarum articulis baſi ſcutelloque niueis.
Habitat — — —
Medium. Antennae vix corporis longitudine teſtaceae articulis baſi niueis. Caput, thorax, elytra punctata cinereo villoſa, immaculata. Corpus et pedes concolora.

9. C. thorace ſubtuberculato nigrum elytris *varioloſum.*
varioloſis: ſutura acuminata.

Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.

Statura et magnitudo C. ruſtici. Antennae diocres, obſcure ferrugineae: articulo mo craſſiori, nigro. Caput punctatum, orbita oculorum cinerea. Thorax va ſus, ſubtuberculatus, niger. Elytra loſa ſiue punctis cicatriſantibus impreſſa ce ſutura acuminata. Corpus obſcure grum.

ſtrepens. 19—20. C. thorace rotundato pubeſcente gineo elytrorum ſutura acuminata, co teſtaceo, antennis longis.

Habitat in Tanger Dom. Schousboe.

Magnitudo fere C. ruſtici. Antennae co longiores, pubeſcentes, ferrugineae. put et thorax obſcure ferruginea, im lata, pubeſcentia. Elytra laeuia, teſtacea apice ſutura acuminata. Corpus lide teſtaceum.

mixtum. 29—30. C. thorace rotundato ferrugineo ci lineato, elytris teſtaceis macula griſea

Callidium griſeum Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Medium. Antennae mediocres, cinereo ſae. Caput ferrugineum oculis nigris. rax rotundatus, ſubpubeſcens, ferru utrinque linea extus repanda, cinerali Elytra laeuia, teſtacea macula magna griſea poſtice fuſca. Pedes teſtacei fe bus clauatis.

1. C. thorace plano nudo: macula dorſali fulua fuſcum pedibus teſtaceis, antennis breuibus. *melancholicum.*

Habitat in Germaniae Quercu Dom. Hybner.

Corpus paruum, fuſcum. Antennae breues, obſcure piceae. Thorax planus, nudus, fuſcus macula media obſcure fulua. Elytra laeuia fuſca. Pedes teſtacei femoribus compreſſis, vix clauatis.

9. C. nigrum thorace atro nitido, antennis breuibus. *aulicum.*

Callidium aulicum ſp. Inſ. 1.

Habitat in Daniae nemoribus.

Statura praecedentium at differt thorace glabro, atro, nitido.

7. C. thorace rotundato elytris faſciis tribus cinereis: tertia terminali. *terminans.*

Habitat in America boreali Dom. Hirſhel.

Maior C. undato. Antennae breues, ferrugineae. Caput et thorax ſcabra, obſcure nigra pube flaueſcente. Elytra nigra litura baſeos flaueſcente faſciisque tribus latis cinereis tertia in ipſa apice. Corpus piceum, utrinque maculis tribus pectoralibus flauis. Pedes picei.

3. C. thorace globoſo nigro, punctis tribus albis, elytris nigris: punctis duobus lunulisque tribus albis. *ſemipunctatum.*

Habitat in Germania.

Magnitudo et ſtatura C. atomarii. Caput nigrum antennis mediocribus, ferrugineis.

Thorax globoſus, niger punctis ſine tribus paruis, dorſalibus, albis. Scut album. Elytra laeuia, nigra puncto in ipſa baſi, altero ſubſcutello in ſutur communi, lunula prima antrorſum ar ſecunda retrorſum, tertia terminali. Co nigrum ſegmentorum marginibus albis. des ferruginei femoribus apice nigris.

luſcum. 63—4. C. thorace globoſo vireſcente: m duabus ferrugineis, elytris bidentatis n ſtrigis flauis baſi rufis.

Habitat in America boreali Dom. v. Roh

Statura magna C. arcuati. Antennae br ferrugineae. Caput vireſcens. Thor reſcens margine antico et poſtico flauo maculis duobus magnis, obſcure rufis. lum nigrum margine flauo. Elytra bidentata, nigra, baſi rufa, qui color flaua cingitur, poſtice ſtriga altera ob abbreuiata, flaua. Abdomen flauum. des ſubferruginei, poſtici elongati fem bus compreſſis nigris.

ſenile. 71—2. C. thorace rotundato nigro: tuber transuerſis, elytris teſtaceis: baſi mar que omni cinereis.

Habitat Cajennae Dom. Cuvier.

Corpus paruum, nigrum. Caput nigrum tennis ferrugineis. Thorax niger tuber lis plurimis, eleuatis, transuerſis. El apice acuminata, teſtacea baſi late mar

ſuturaque cinereis. Pedes teſtacei femoribus nigris, poſticis elongatis, compreſſis.

LEPTURA. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla unidentata, apice ſetoſa.
Labium membranaceum, bifidum.
Antennae ſetaceae.

5. L. thorace laeui nigra elytris teſtaceis apice nigris, antennarum articulis baſi flauis. *maculicornis.*

Habitat in Germania.

Statura et ſumma affinitas L. tomentoſae. Antennae nigrae articulis aliquot baſi nigris. Thorax rotundatus, laeuis, niger. Elytra teſtacea apice nigra. Margo exterior itidem parum nigricat. Corpus et pedes nigra.

20. L. aureo pubeſcens elytris ferrugineis: macula apicis flaua. *fugax.*

Habitat in America Dom. Hybner.

Corpus medium. Antennae nigrae. Caput et thorax tomento denſo, aureo tecta. Elytra abdomine breuiora, acuta et fere ſubſpinoſa, ferruginea macula flaua ante apicem. Corpus nigrum pube aurea. Pedes ferruginei.

3. L. thorace ſubſpinoſo pubeſcente, elytris faſtigiatis liuidis; taenia obſcura longitudinali ſinuata. *lamed.*

Stenocorus lamed Ent. ſyſt. 1. 2. 293. 2.

Cerambyx lamed Linn. ſyſt. nat. 2. 630. 4
Su. 649.
Geoff. Inſ. 1. 226. C.
Habitat in Europae floribus.
Affinis L. 4maculatae.

connexa. 47—8. L. fuſca elytris faſciis duabus cine
tura connexis.
Habitat Tangier Dom. Schousboe.
Parua. Caput nigrum palpis baſi rufe
bus. Thorax cylindricus, niger line
bus dorſalibus, cinereis, quae tamen
ginem anticum haud attingunt. Elytr
uia, fuſca faſciis duabus cinereis, ſutu
nexis. Corpus nigrum.

tranquebarica. 53. L. rufa elytris nigris.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. de
ſtedt.
Statura parua praecedentium. Caput cu
tennis rufum, ore nigro. Thorax cy
cus, rufus, immaculatus. Elytra
nigra. Corpus rufum.

coromandeliana. 54. L. rufa pectore elytris pedibusque cyan
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. de
ſtedt.
Caput rufum antennis nigris: articulo p
rufo. Thorax cylindricus, rufus.
punctato ſtriata, cyanea. Pectus cyan
Abdomen rufum. Pedes cyanei.

NECYDALIS. *Palpi* filiformes.

Maxilla unidentata.

Labium membranaceum, late emarginatum.

Antennae filiformes.

—7. N. nigra elytris aurulentis dorſo cinereis, pedibus poſticis quatuor elongatis compreſſo clauatis. *longipes.*

Habitat in Inſula St. Domingo Muſ. Dom. Boſc.

Praecedentibus maior. Caput nigrum fronte antennisque rufis. Thorax niger. Elytra ſubulata, aurulenta dorſo inprimis ad baſin cinereo hirto, apice emarginata. Pedes antici breues, teſtacei, poſtici quatuor valde elongati femoribus compreſſis, clauatis: claua nigra. Tibiae teſtaceae apice nigrae.

3—4. N. nigra elytris teſtaceis: margine omni nigro. *marginata.*

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Statura praecedentium. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra ſubulata, teſtacea margine omni atro. Abdomen nigrum lateribus teſtaceis. Pedes nigri.

SYNODENDRON. *Palpi* filiformes
aequales.
Maxilla uniden
Labium filifor
corneum, a
palpigerum
Antennae lam
tae.

gibbum. 1—2. S. thorace muricato gibbo, elytris re
ſtriatis.

Habitat in India orientali D. Daldorff.

Maior. S. muricato. Antennae lamellatae
ueſcentes. Caput inflexum, fuſcum
rufa piloſa. Thorax valde gibbus, elev
antice muricatus. Elytra ſtriata, picea
ce retuſa, integra niſiſtriae parum prom

puſillum. 5. S. ferrugineum elytris punctato ſtriatis int

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum, cylindricum, totum ferr
neum, immaculatum. Antennae omni
mellatae huius generis. Thorax gib
punctatus. Elytra ſtriato punctata, inte

APATE. *Palpi* filiformes, aequales
Maxilla unidentata.
Labium membranaceu
truncatum.
Antennae perfoliatae.

gonagra. 6—7. A. elytris retuſis punctatis cylindricus
ger femoribus anticis incraſſatis compre

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom. v. Rohr.

Statura omnino A. femoralis at duplo minor. Antennae craſſae, perfoliatae, flauae. Caput et thorax laeuia, nigra. Elytra punctata, poſtice retuſa. Pedes parui femoribus anticis incraſſatis, compreſſis.

11. A. elytris ſtriatis retuſis bidentatis: dente interiore elongato, thorace antice muricato. *bidens.*

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Muſ. D. Lund.

Statura et magnitudo A. tridens at differt elytris ſtriatis apiceque denticulis duobus: interiore multo maiore.

. A. thorace rugoſo niger elytris piceis. *Fagi.*

Habitat in Saxoniae Fago Dom. Hybner.

Minutus. Antennae perfoliatae videntur. Thorax niger rugis plurimis, transuerſis, eleuatis. Elytra laeuia, picea. Pedes obſcuri.

. A. thorace ſcabro elytris pedibusque griſeis. *Tiliae.*

Apate Tiliae Panz. Fn. Germ. 8. tab. 14.

Habitat in Germaniae Tilia.

Minutus. Thorax ſcaber griſeus. Elytra punctata integra pedesque griſea.

BOSTRICHUS. *Maxilla* cornea.
Labium cylindri
integrum, apic
pigerum.
Antennae claua

minimus. 24—5. B. cinereus elytris laeuibus obſcuri
Habitat ſub Abietis cortice Saxoniae D. H
Minutus. Thorax laeuis, cinereus. Ely
tegra, obſcuriora. *Variat* thorace ni
te forte aetate.

BRUCHUS. *Palpi* aequales, filifor
Maxilla membranace
fida.
Labium acuminatum
Antennae filiformes.

punctatus. 6—7. B. fuſcus thorace elytrisque cinereo
ctatis.
Habitat — — —
Forte potius Brachycerus. Magnitudo fl
umbellatarum. Corpus nigrum ſupra
ctis numeroſis, cinereis.

femoratus. 7—8. B. obſcure ferrugineus elytris fuſco m
latis, femoribus poſticis elongatis clau
Habitat in Indiae orientalis ſeminibus D
Daldorff.
Magnitudo B. Robiniae. Antennae filifor
ſerratae. Caput et thorax obſcure ferr
nea, immaculata. Elytra vix ſtriata,
ruginea maculis aliquot indiſtinctis ni

Pedes ferruginei femoribus poſticis elongatis, clauatis.

9. B. aeneus elytris baſi prominulis. *aeneus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus B. gibboſo paullo minus, totum obſcure aeneum, immaculatum. Antennae fuſcae. Elytra ſubſtriata angulo baſeos prominulo.

11. B. niger elytris ſtriatis ferrugineis: maculis tribus nigris margini connexis. *3maculatus.*

Habitat in India orientali Dom. Hybner.

Corpus paruum, nigrum. Elytra ſtriata, ferruginea puncto paruo baſeos, maiori in medio poſticoque marginali atris. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.

12. B. cinereo villoſus elytris ſtriatis, femoribus poſticis incraſſatis compreſſis. *gonagra.*

Habitat in India orientali D. Daldorff.

Medius. Antennae filiformes, ferrugineae. Corpus totum ferrugineum, cinereo villoſum. Femora poſtica magna, compreſſa, incraſſata tibiisque incuruis.

5. B. ferrugineus cinereo villoſus antennarum articulis tribus ultimis incraſſatis. *craſſicornis.*

Habitat in Indiae orientalis ſeminibus D. Daldorff.

Huius generis videtur. Antennae elongatae at ultimi articuli dilatati. Corpus ferrugineum, cinereo pubeſcens. Elytra ſubſtriata. Pedes ſimplices, teſtacei.

3. B. teſtaceus cinereo villoſus pedibus ſimplicibus. *capſincola.*

Habitat in Cajennae ſeminibus.

Paruus, totus teſtaceus villis cinereis hi de maculatus.

ANTHRIBUS. *Palpi* aequales, fi mes.

Maxilla breuiſſima fida.

Labium bifidum.

Antennae articulis mis tribus cr longioribus, cra ribus: ultimo a inſidentes roſtro ui, plano.

longicornis. 1. A. griſeus antennis corpore longioribus. Habitat in India orientali Muſ. Dom. de ſtedt.

Statura et magnitudo ſequentium. Ant corpore longiores, nigrae articulis api nereis, ultimis tribus paullo craſſioribus coloribus; ultimo longiori, ſetaceo. pus totum griſeum.

niueiroſtris. 3—4. A. roſtro latiſſimo plano elytrorumque cibus anoque albis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo omnino A. albiroſtris. put nigrum roſtro plano, breuiſſimo, Thorax niger punctis quatuor dorſalibus rugineis. Scutellum niueum. Elytra

ta punctis rarioribus, albis eleuatisque piloſis nigris, apice alba, immaculata. Anus albus prominet. Pedes nigri.

5. A. roſtro plano latiſſimo nigro aeneus roſtro thorace pedibusque rufis. *Roboris.*
Attelabus ruficollis Herbſt. Arch.
Habitat in Kiliae Robore.
Nimis affinis A. planiroſtri paullo tamen maior et thorax rufus, immaculatus, nitidus. Elytra magis nigra, nitida.

9. A. obſcure ferrugineus griſeo pubeſcens elytris apice griſeis. *pubeſcens.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Corpus paruum A. varii. Antennae ferrugineae, breues claua elongata. Frons pube cinerea. Thorax brunneus tomentoſo cinereus. Elytra ſtriata, ferruginea, apice cinerea. Corpus cinereo pubeſcens.

BRACHYCERUS. *Palpi* breuiſſimi.
antici biarticulati.
Labium rotundatum, corneum.
Antennae breues, extrorſum craſſiores, roſtro inſidentes.

5—16. B. thorace criſta duplici dentata, elytris dorſo planis reticulatis. *criſtatus.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.

Statura et magnitudo omnino B. muricati
put planum oculis eleuatis, rotundatis.
rax criſta duplici longitudinali, valde
ta, in medio interrupta. Elytra conna
ſo plano, reticulato. Pedes griſei.

undatus. 8—9. B. thorace ſpinoſo canaliculatoque,
lineis eleuatis criſpatis, corpore nigro.

Habitat in Gallia, Africa.

Affinis certe B. barbaro cuius varietatem
credidi. Differt tamen magnitudine
minore, corpore toto nigro, elytrorum
lineis magis eleuatis, criſpatis punctisq
teriectis paucioribus, magis concaten

ATTELABUS. *Palpi* filiformes.
Maxilla bifida.
Labium corneum
pos tegens.
Antennae monili
mes, roſtro in
tes.

arquebaricus. 6—7. A. rufus elytris faſciis duabus nigris:
riore interrupta.

Habitat in Tranquebar Dom. de Scheſted

Caput poſtice attenuatum, rufum ore
Thorax rufus lineis duabus fuſcis.
puncto ſtriata, rufa faſciis duabus
altera baſeos interrupta, altera in medio
tinua. Pedes elongati rufi.

8. A. fuſcus elytris varioloſis baſi uniſpinoſis, pedibus anticis elongatis: femoribus unidentatis. *dentipes.*

Habitat in Americae Inſulis Muſ. Dom. Lund.

Statura praecedentium. Antennae rufae claua fuſca. Caput et thorax punctata, fuſca, immaculata. Elytra varioloſa, fuſca dente baſeos valido, eleuato. Corpus fuſcum pedibus rufis, antici elongati femoribus clauatis, unidentatis.

Femora in altero ſexu aenea, nitida.

14. A. ater thorace poſtice attenuato rufo. *formicarius.*

Habitat in India orientali Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Corpus elongatum, atrum. Caput nigrum roſtro breui, cylindrico. Antennae moniliformes, rufae. Thorax oblongus, antice incraſſatus, rufus, immaculatus. Elytra glabra, laeuia, atra. Pedes rufi femoribus omnibus apice incraſſatis annulo nigro.

3. A. coeruleus antennis tibiisque fuſcis. *coeruleus.*

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Statura parua praecedentium. Corpus totum coeruleum antennis tibiisque fuſcis.

7. A. cinereus roſtro arcuato atro, pedibus teſtaceis. *nigriroſtris.*

Habitat in Onobrychis floribus Tangier Dom. Schousboe Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Minutus. Roſtrum arcuatum, atrum. Thorax et elytra cinerea, immaculata. Pedes teſtacei.

Pomonae. 27—8. A. niger obſcurus elytris ſtriatis c coeruleis, roſtro baſi compreſſo a bulato.

H bitat in Kiliae Pomona.

Affinis certe A. Craccae at diſtinctus e maior. Roſtrum baſi compreſſum, a bulatum. Thorax obſcurus. Elyt ta, magis coerulea.

RHINOMACER. *Palpi* extrorſ ſiores: arti timo trunca *Antennae* ſeta ſtro inſiden

varius. 1. R. albo nigroque varius.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Weber

Sequentibus quadruplo maior. Anten ceae, nigrae. Roſtrum breue, planum tum. Caput nigrum lineis duabus al rax niger dorſo albo reticulato. El bra, nigra, albo variegata. Abdom utrinque lineis duabus punctorum a Pedes nigri.

CURCULIO. *Palpi* filiformes.
Maxilla cylindrica, unidentata.
Antennae clauatae: articulo primo longiſſimo, inſidentes roſtro corneo.

7. C. longiroſtris griſeus roſtro bidentato, elytris ſubſpinoſis. *guineenſis.*

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Corpus magnum, griſeum, obſcurum. Antennae fuſcae, apice cineraſcentes. Roſtrum baſi ſulcatum, griſeum, ante antennas utrinque dente valido acuto, apice rotundatum, atrum. Thorax planus, punctis impreſſis varioloſus. Elytra punctato ſtriata punctis eleuatis albis ſubſpinoſa. Pedes antici elongati.

10. C. longiroſtris niger thorace elytrisque purpureis nigro punctatis. *cribrarius.*

Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff.

Affinis videtur praecedenti. Antennae nigrae claua compreſſa. Caput atrum roſtro arcuato. Thorax ſupra purpureus punctis ſex. 3. 3. intermedio antico maiori. Elytra abbreuiata, ſtriata, purpurea punctis quinque 2. 2. 1. ultimo maiori, tranſuerſo. Corpus nigrum. Pedes nigri.

20. C. longiroſtris ouatus cinereo villoſus thorace elytrorumque faſcia ferrugineis. *pudicus.*

Habitat in Isle de France Dom. Billardie
Statura et magnitudo praecedentium. R
cylindricum, inflexum. Thorax pun
obſcure rufus. Elytra ſtriato punct
loſo cinerea, faſcia lata, media, ferru
apice retuſa. Corpus cinereo villoſum
des inermes, antici parum elongati.

porculus. 37—8. C. longiroſtris ater thorace elytriſq
ſcuris griſeo punctatis:
Habitat Halae Saxonum.
Statura et magnitudo C. abbreuiati. Cap
roſtro et antennis atrum, nitidum,
culatum. Thorax magnus, planus,
cans punctis griſeis impreſſus. Ely
abbreuiata, obſcura punctis parum
ſtriata. Pedes atri, validi, ſimplices

famulus. 41—2. C. longiroſtris ſupra ferrugineus
dorſo elytrorum ſutura inaequaliter
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff
Lund.
Corpus medium, griſeo pubeſcens. R
elongatum, arcuatum, atrum. Thor
rugineo villoſus dorſo inprimis baſi
nitido. Elytra ferruginea villoſa ſu
aequaliter atra. Pedes cinerei, iner

Chloris. 46—7. C. longiroſtris thorace elytriſque
viridibus, corpore nigro.
Curculio Chloris Panz. Fn. Germ. 18. tab
Habitat in Germania Dr. Panzer.
Paruus. Corpus cum roſtro arcuato
Thorax punctatus obſcure viridis.

ſtriata, obſcure viridia, immaculata. Corpus atrum.

5. C. longiroſtris teſtaceus capite thoracis macula pectoreque nigris. *Chamaeropis.*

Habitat in floribus Chamaeropis humilis Tangier Dom. Schousboe Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Statura parua praecedentium. Caput cum roſtro incuruo nigrum antennis teſtaceis. Thorax teſtaceus macula magna.

2. C. longiroſtris ater thorace elytrisque ſcabris fuſcis, femoribus anticis incraſſatis. *melanocephalus.*

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Statura et fere magnitudo C. paraplectici. Antennae ferrugineae. Caput atrum, nitidum roſtro breui, truncato. Thorax transuerſus, ſcaber, fuſcus margine antico parum flaueſcente. Elytra punctis eleuatis ſcabra ad ſuturam laeuia, atra margineque ſubſerrato. Corpus atrum femoribus anticis valde incraſſatis.

7. C. longiroſtris cylindricus niger albo variegatus pedibus anticis elongatis. *Pica.*

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Statura cylindrica praecedentium. Caput cum roſtro nigrum orbita oculorum alba. Thorax punctatus, ater utrinque macula magna, palmata, alba. Elytra punctato ſtriata, atra maculis variis, albis. Corpus albidum pedibus anticis parum elongatis.

truncatulus. 107—8. C. longiroſtris cylindricus fuſcus
rus, elytris punctato ſtriatis, roſtro tr
Habitat in India orientali Dom. Daldorf
Statura et magnitudo C. Bardanae. R
nigrum, obſcurum, apice truncatum.
rax rotundatus, obſcuris. Elytra p
ſtriata. Pedes fuſci, ſubelongati.

voluulus. 107—8. C. longiroſtris cylindricus fuſcus
caſtaneis griſeo variis.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. D
Omnino diſtinctus. Thorax punctatus,
Elytra caſtanea, griſeo variegata.

elongatulus. 111—12. C. longiroſtris elongatus depr
rugineus femoribus breuibus compr
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldor
Paruus in hac familia. Caput nigrum
breuiuſculo ferrugineo. Thorax pu
in medio parum canaliculatus, ferr
Elytra ſtriato punctata, depreſſa,
nea. Corpus ferrugineum femoribus
bus, compreſſis.

pictus. 157—8. C. longiroſtris femoribus dentat
fuſcus thorace elytrisque albo ſtriatis.
Habitat in Tangier Dom. Schousboe M.
Lund.
Statura praecedentium. Caput fuſcum,
culatum. Thorax albus lineis duab
dorſalibus lituraque utrinque laterali
lineis lineolisque variis albis. Corpus
villoſum pedibus fuſcis.

7—8. C. longiroſtris femoribus dentatis niger *Fabricii.*
elytris ſtriatis ferrugineis: lineis poſticis duabus albidis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Medius. Roſtrum cylindricum, atrum. Thorax ſcaber, ater lateribus villoſo albidis. Elytra ſtriata, ferruginea pone medium lineis duabus apicem tamen haud attingentibus villoſo albidis. Pedes nigri femoribus acute dentatis.

60—1. C. longiroſtris femoribus dentatis thorace brunneo; elytris punctato ſtriatis cinereis: macula marginali brunnea. *piger.*

Habitat in Inſula Trinidad Dom. Ryan. Muſ. Dom. Lund.

Statura et magnitudo C. Mangiferae. Caput griſeum roſtro ſub pectore inflexo. Thorax brunneus, immaculatus. Elytra punctato ſtriata, cinerea macula magna, marginali, brunnea, verſus apicem parum retuſa. Pedes griſei femoribus dentatis.

170—1. C. longiroſtris femoribus dentatis cinereo piloſus, coleoptris macula dorſali atra. *olens.*

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Statura omnino praecedentium. Roſtrum nigrum. Thorax cinereo piloſus, immaculatus. Elytra cinereo piloſa macula magna ſuturali, atra. Verſus apicem macula alia ſuturalis at minuta, vix obſeruanda. Praeterea ſtria e punctis verſus marginem exteriorem punctumque unum alterumue in diſco nigra.

plagiatus. 184—5. C. longiroſtris femoribus dentati elytris ſtriatis: plaga rufa.

Habitat in Carolina Dom. Boſc.

Paruus. Corpus roſtro cylindrico antem atrum. Thorax gibbus, punctatus, Elytra ſtriata, rufa margine omni atro. pus atrum.

auarus. 196—7. C. longiroſtris femoribus dentati ſcure ferrugineus thorace linea dorſali, tris faſcia poſtica albis.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Statura et magnitudo omnino C. eſuriens tus obſcure ferrugineus, et roſtrum breuius. Thoracis linea dorſalis fa poſtica elytrorum ſcutellumque lacte Pedes antici elongati. Femora acu tata.

c album. 197—8. C. longiroſtris femoribus dentati coleoptris c. duplici albo notatis.

Habitat in India orientali Muſ. Dom. de ſtedt.

Statura omnino C. Nucum. Roſtrum lo mum, tenue, incuruum, ferrugineum apiceque nigrum. Thorax planus, maculis duabus baſeos ſtrigaque inter marginis antici albis. Elytra ſubſtriata gra ſutura Cque magno, quod a baſi ad dium ducitur dorſo ſuturae contiguo Pedes nigri femoribus dentatis.

prodigus. 238—9. C. breuiroſtris variolofus niger aur aureis numeroſiſſimis.

Habitat in Tangier Dom. Schousboe.

Medius. Caput nigrum atomis aureis roſtroque breui, late emarginato. Thorax et elytra punctis latis cicatriſantibus excauata et in his atomi aurei numeroſisſimi, cinereo micantes. Corpus nigrum. Pedes inermes, cinerei.

44—5. C. breuiroſtris cylindricus niger elytris puncto baſeos apicisque viridi. *moratus.*

Habitat in Isle de France D. Billardiere.

Medius. Caput planum, fuſcum roſtro breui antennisque nigris. Thorax cylindricus, ſubpunctatus, fuſcus, immaculatus. Elytra ſubpunctato ſtriata puncto oblongo baſeos apicisque viridi nitidis. Corpus lateribus viridi ſquamoſum. Pedes nigri, antici parum elongati.

255. C. breuiroſtris vireſcens thoracis dorſo fuluo. *ſellatus.*

Habitat in Ruſſia meridionali Dom. Boeber.

Statura et magnitudo C. viridis. Caput canaliculatum, emarginatum, viride. Thorax viridis macula magna, dorſali, fulua. Elytra ſtriata, viridia, ſubacuminata.

292—3. C. breuiroſtris griſeus elytris nigro punctatis.

Curculio *fritillum* Panz. Fn. Germ. 18. tab. 19. *fritillum.*

Habitat in Germania Dr. Panzer.

Statura praecedentium. Caput griſeum roſtro ſubcanaliculato. Thorax cylindricus, griſeus linea dorſali, in medio dilatata fuſca. Elytra

ſtriato punctata, griſea, fuſco punctata. Corpus griſeum.

ſtriga. 328—9. C. breuiroſtris niger coleoptris ſtriatis fuſcis: ſtriga baſeos niuea.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Caput cum roſtro breuiſſimo, ſubcanaliculato, atrum. Thorax punctatus, ater. Elytra ſtriata obſcura, fuſca ſtriga in ipſa baſi niuea. Corpus atrum.

verruca. 353—4. C. breuiroſtris niger obſcurus thorace varioloſo, elytris crenato ſtriatis.

Habitat in Europa,

Medius. Antennae omnino huius generis. Roſtrum breue obtuſum, punctatum. Thorax punctis latioribus impreſſus lineaque dorſali parum eleuata. Elytra connata, obſcura, ſtriato punctata.

punctum. 381—2. C. breuiroſtris femoribus anticis dentatis niger ſcutello niueo.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldorff.

Corpus C. nigrita paullo maius, magis oblongum totum nigrum, obſcurum ſcutello niueo. Femora antica acute dentata, reliqua inermia.

brunnipes. 381—2. C. breuiroſtris femoribus anticis dentatis fuſcus thorace pedibusque brunneis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldorff.

Praecedente paullo minor. Thorax punctatus obſcure rufus. Elytra punctato ſtriata, ſuſca, vix acuminata. Pedes rufi femoribus anticis acute dentatis, reliquis inermibus.

1—2. C. breuiroſtris femoribus obtuſe denta- *denticornis.* tis niger elytris cinereo maculatis, antenna- rum primo articulo apice prominulo.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldorff.

Magnitudo C. ſulcati. Antennae nigrae articu- lo primo longo apice prominente, dentem efficiente. Thorax gibbus, niger. Elytra ſtriata, nigra, cinereo maculata.

90—1. C. breuiroſtris femoribus anticis acute *roralis.* dentatis viridis nigro irroratus.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

C. Pyri paullo maior. Thorax et elytra viri- dia, nitida atomis minutis, numeroſiſſimis atris irrorata. Pedes cinerei femoribus an- ticis acute dentatis, reliquis inermibus.

397—8. C. breuiroſtris femoribus dentatis flaueſ- *dorſatus.* cens capite thoraceque trilineatis, coleoptro- rum diſco fuſco.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et ſumma affinitas C. curuicornis. An- tennae valde elongatae articulo primo incur- uo. Caput et thorax flaueſcentia lineis tri- bus latis brunneis. Elytra ſtriata flaua ad ſuturam late brunnea ſutura tamen ipſa flaua. Pedes rufi femoribus acute dentatis.

BRENTUS. *Os* roſtro porrecto, c
d ico.
Antennae moniliforme:
tra roſtri medium i
tae.

formicarius. 5—6. B. oblongus ater thorace ferrugineo.
Habitat Tranquebariae Daldorff Mul.
Lund.

Paruus in hoc genere. Roſtrum cylindr
atrum antennis rufis. Thorax laeuis, r
antice globoſus. Elytra laeuia, atra
da. Pedes rufi femoribus clauatis at
cis annulo nigro.

COLYDIUM. *Palpi* quatuor cl
articulo ultimo
iori.
Labium membran
um, emarginatu
Antennae perfoliata

rufum. 4. C. rufum elytris punctato ſtriatis.
Habitat Pariſiis Dom. Brongniart.

Corpus paruum, totum rufum. Thorax
ctatus. Elytra punctato ſtriata. Fe
compreſſa.

MYCETOPHAGUS. *Palpi* quatuor inaequales.

Maxilla membranacea, unidentata.

Labium rotundatum, integrum.

Antennae extrorſum craſſiores.

2. M. niger elytris ſtriatis: faſcia apiceque ruſis, antennis pedibusque ferrugineis. *faſciatus.*
Habitat Tranquebariae Dom. Paldorff.
Paullo minor M. 4maculato. Antennae extrorſum craſſiores, ferrugineae. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra ſtriata faſcia ante medium ſuturam haud attingente rufa. Apex late rufeſcit. Pedes rufi.

13. M. teſtaceus elytris faſciis duabus fuſcis. *Populi.*
Habitat in Sueciae Populo Muſ. Dom. Lund.
Statura parua praecedentium. Caput nigrum ore antennisque teſtaceis. Thorax laeuis, teſtaceus, immaculatus. Elytra ſtriata, teſtacea faſciis duabus latis fuſcis vel potius fuſca baſi maculaque verſus apicem teſtaceis. Corpus et pedes teſtacea.

TETRATOMA. *Palpi* quatuor
quales, cr-
culi.
Maxilla memb-
cea, bifid-
Labium breuiſſi-
rotundatum,
grum.
Antennae articul-
tuor ultimis cl-
perfoliatis.

ruficollis. 1—2. T. nigra thorace pedibusque rufis.
Habitat in Selandia Muſ. Dom. Lund.
Affinis praecedenti. Antennae rufae a-
gra. Caput nigrum. Thorax laeuis
nitidus. Elytra nigro cyanea, nitid-
pus nigrum pedibus rufis.

gazella. 1—2. T. nigra obſcura capite cornubus d-
erectis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Maior T. Fungorum tota nigra, minime
Antennae articulis ultimis quatuor cr-
bus, perfoliatis. Caput cornubus d-
erectis, compreſſis, validis. Thorax
uis, niger. Elytra ſubſtriata.

LYCTUS. *Palpi* quatuor breuiſſimi, filiformes.

Maxilla breuis, membranacea, bifida.

Labium integrum.

Antennae claua ſolida.

3. L. glaber ater nitidus capite elytrorum baſi pedibusque ferrugineis. *nitidulus.*
Habitat in Germania Dom. Mauerhoff.
Statura parua praecedentium elongata. Caput cum antennis ferrugineum. Thorax laeuis, ater, nitidus. Elytra laeuia, atra, nitida, baſi ferruginea. Corpus atrum pedibus ferrugineis.

TRITOMA. *Palpi* antici ſecuriformes.

Labium emarginatum.

Antennae claua perfoliata.

5. T. nitida rufa elytris atris. *pulchella.*
Habitat in India Muſ. Dom. de Scheſtedt.
Statura et magnitudo T. rufipes. Caput et thorax rufa, nitida, immaculata. Elytra atra. Pedes rufi.

DIAPERIS. *Palpi* quatuor ſubfilifor
Maxilla bifida.
Labium cylindricum,
ce palpigerum.
Antennae ſecundum
tam longitudinem
foliatae: foliolis c
preſſis; ultimo ov

hydactina. 1—2. D. atra elytris rufis: puncto ſutura
que atris.

Habitat in Carolinae Hydno candido
Boſc.

Statura et magnitudo D. Boleti. Caput et
rax laeuia, atra, nitida. Elytra ſtriato
ctata, rufa puncto ante medium faſcia
ca, quae ad marginem exteriorem ex
tur ſuturaque atris. Corpus atrum.

SCAPHIDIUM. *Palpi* quatuor fili
mes.
Maxilla bifida.
Labium corneum,
tundatum, integr
Antennae articulis
que clauato per
tis.

immaculatum. 2—3. S. atrum nitidum elytris immaculatis.
Scaphidium immaculatum Olivier Inſ. 2. 20
1. fig. 3.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Statura et magnitudo omnino S. 4maculati at tota atra, immaculata.

3. S. atrum nitidum capite thoraceque obſcure rufis. *bicolor.*

Habitat in Europae Boletis.
Statura et magnitudo praecedentium. Caput et thorax obſcure rufa, immaculata. Elytra laeuia, nigra. Pedes antici rufi.

IPS. *Palpi* aequales, breuiſſimi: articulo ultimo ouato.
Maxilla bifida.
Labium membranaceum, conicum, emarginatum.
Antennae perfoliatae.

1. I. nigra elytris ſtriatis: punctis quatuor rufis. *4notata.*

Habitat in Germania.
Summa affinitas I. 4puſtulatae. Differt tantum elytris ſtriatis paullo obſcurioribus.

5. I. teſtacea elytris ſubſtriatis. *teſtacea.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus paruum, teſtaceum, immaculatum. Antennae articulis tribus perfoliatis.

STAPHYLINUS. *Palpi* quatuor fili-
mes.
Maxilla unidenta-
Labium membra-
um, trifidum.
Antennae moni-
mes.

plagiatus. 32—3. St. ater elytris fuſcis: linea medi-
busque teſtaceis.
Staphylinus plagiatus Paykull Monogr.
Habitat in Europa boreali.
Medius. Antennae fuſcae. Thorax p-
rotundatus, ater, immaculatus. Ely-
uia, fuſca linea lata in medio teſtacea,
tamen nec baſin nec apicem attingit.
pus atrum pedibus pallide teſtaceis.

linearis. 41—2. St. elongatus ater elytris fuſcis, an-
pedibusque rufis.
Staphylinus linearis Oliv.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Paruus, elongatus et fere filiformis. An-
ferrugineae: articulo primo longiori
uato. Caput et thorax laeuia, atra,
da. Elytra laeuia, fuſca, immacula-
des rufi.

brunneus. 44. St. brunneus capite abdominisque medi-
Staphylinus brunneus Paykull Monograph.
Habitat in Suecia.
Paruus, filiformis. Antennae nigrae baſi-
neae. Caput atrum, nitidum. Tho-

elytra laeuia, brunnea, immaculata. Abdomen brunneum, in medio nigrum. Pedes brunnei.

7. St. ater nitidus elytris pallidis: margine nigro. *philanthus.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldorff.

Paruus. Antennae moniliformes, ſlaueſcentes. Caput et thorax atra, nitida, laeuia, immaculata. Elytra laeuia, pallida margine exteriori tenuiſſime apicis parum latiori nigro. Corpus nigrum parum ferrugineis.

50. St. niger elytris teſtaceis ad ſuturam nigris, capite tuberculato. *tuberculatus.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Paruus. Caput magnum, nigrum mandibulis exſertis, elongatis tuberculisque duobus eleuatis, obtuſis. Antennae teſtaceae. Thorax niger. Elytra teſtacea, ad ſuturam nigra. Abdomen nigrum ano teſtaceo. Pedes teſtacei.

OXYPORUS. *Palpi* quatuor inaequales.
antici filiformes.
poſtici ſecuriformes.
Labium emarginatum cum mucrone.
Antennae moniliformes.

6. O. ater nitidus thoracis margine poſtico, elytris, abdominis ſegmentorum marginibus pedibusque teſtaceis. *dimidiatus.*

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Paruus. Antennae nigrae, baſi teſtaceae. Ca-
put atrum, nitidum, immaculatum. Tho-
rax ater, nitidus margine poſtico imprimis
ad latera teſtaceo. Elytra teſtacea baſi apice-
rum nigra. Abdomen nigrum ſegmento-
rum marginibus teſtaceis. Pedes teſtacei.

CLASSIS II.

ULONATA.

MAXILLA TECTA GALEA OBTUSA.

PHASMA.

Os.

Palpi quatuor, inaequales, compreſſi, filiformes.

anteriores longiores, 5articulati: articulis ſubaequalibus, ultimo oblongo adhaerentes maxillae dorſo.

poſteriores triarticulati: articulis ſubaequalibus, ultimo oblongo acutiuſculo longitudine laciniarum exteriorum labii adnati labii medio.

Mandibula porrecta, cornea, arcuata, dentata.

Maxilla craſſa, obtuſa, compreſſa, apice dentata. *Galea* craſſa, obtuſa, longitudine maxillae.

Labium porrectum, planum, membranaceum, quadrifidum: laciniis inaequalibus; exterioribus duplo longioribus, filiformibus, obtuſiuſculis, interioribus breuibus, exterioribus fere connatis.

Antennae filiformes.

MANTIS.

Os.

Palpi quatuor inaequales, filiformes.

anteriores paullo longiores, 5articulati: ar-
lo primo breuiſſimo, reliquis longiori-
cylindricis, ſubaequalibus adhaerentes
xillae dorſo.

poſteriores paullo breuiores, triarticulati:
culis aequalibus, cylindricis adnati
medio.

Mandibula porrecta, cornea, arcuata, acuta, den-
Maxilla porrecta, compreſſa, intus ciliata,
tata, acuta. *Galea* incurua, apice in-
ta, obtuſa.

Labium porrectum, membranaceum, planum
ce quadrifidum; laciniis aequalibus ſubae-

Antennae ſetaceae.

ACRYDIUM.

Os clypeo rotundato, integro.

Mandibula cornea, arcuata, acuta, dentata.

Maxilla apice bidentata.

Galea baſi latiore, apice ſubulata.

Labium quadrifidum; laciniis exterioribus ma-
bus, linearibus, interioribus minutis,
latis.

ACHETA.

Os clypeo prominente, orbiculato, integro.

Mandibula cornea, arcuata, acuta dentata.

Maxilla apice tridentata dente interiore remo-

Galea linearis, obtuſa.

Labium elongatum, quadrifidum: laciniis ex-
oribus dilatatis, rotundatis, interioribus
bulatis, acutis.

FORFICULA. *Palpi* filiformes.
Labium trifidum.
Antennae ſetaceae.

F. forcipe elongata medio unidentata atra pedibus rufis. *herculeana.*

Habitat in Inſula St. Helena Muſ. Dom. de Scheſtedt.

Gigas in hoc genere. Caput nigrum antennis ferrugineis. Thorax planus, laeuis, niger. Elytra breuia, atra, immaculata. Corpus atrum, nitidum. Forceps longitudine fere corporis atra, in medio unidentata. Pedes rufi.

12. F. nigra thorace elytrorum diſco pedibusque ferrugineis. *ruficollis.*

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Muſ. D. Lund.

Magna. Caput atrum antennis 11 articulatis, teſtaceis. Thorax planus, ruſus, poſtice parum fuſceſcens. Elytra nigra diſco pallido. Abdomen nigrum. Forceps elongata, incurua, nigra, baſi unidentata, teſtacea. Pedes rufi.

BLATTA. *Palpi* inaequales filiformes.
Labium bifidum: laciniis fiſſis; pinnis inaequalibus.
Antennae ſetaceae.

1. B. flaueſcens thorace nigro: margine albo, palpis elongatis. *longipalpa.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura omnino B. lapponicae at paullo m
Antennae corpore longiores, brunnea
put nigrum. Thoracis clypeus planus
margine laterali hyalino albo. Elytra
uerſim ſtriata, flaueſcentia. Corpus
cens. Palpi anteriores elongati, arti
timo cylindrico, obtuſo, ſubcraſſiori.

reticulata. 22—3. B. flaueſcens thoracis elytrorumque
gine albo pellucido, elytris reticulatis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Bl. germanica paullo minor. Caput flau
antennis teſtaceis. Thorax flaueſcens
gine albido pellucido. Elytra reticulata
ueſcentia margine albido pellucido.

palliata. 24—5. B. atra thoracis margine poſtico
gineo.
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lun.
Statura omnino B. lapponicae. Caput n
Thorax laeuis, niger nitidus margine
co ferrugineo. Elytra ſubſtriata, atra.
pus atrum.

PHASMA. *Palpi* inaequales, filifor
Labium quadrifidum
niis lateralibus duplo
gioribus.
Antennae filiformes.

filiformis. 1. P. corpore filiformi aptero fuſco, pedibus
pore longioribus inermibus.

Mantis filiformis Ent. ſyſt. 2. 12. 1.
Herbſt. Arch. tab. 51. fig. 2.
Brown. Jamaic. tab. 42. fig. 5.
Petiv. Gazoph. tab. 60. fig. 2.
Habitat in America meridionali.

ferula. P. corpore filiformi aptero viridi, pedibus longitudine corporis, femoribus poſticis apice ſpinoſis.
Mantis ferula Ent. ſyſt. 2. 12. 2.
Habitat in Inſula Guadeloupe.

calamus. P. corpore filiformi aptero vireſcente, femoribus ſtriatis.
Mantis calamus Ent. ſyſt. 2. 13. 3.
Habitat in Inſula St. Croix Americes.

Roſſia. P. corpore filiformi aptero viridi, femoribus dentatis.
Mantis Roſſia Ent. ſyſt. 2. 13. 4.
Mantis Roſſia Roſſ. Fn. Etr. 1. 259. 636. tab. 8. fig. 1.
Habitat in Italia Dom. Roſſi.

angulata. P. aptera capite thoraceque ſpinoſis, elytris rotundatis breuiſſimis, femoribus ſubtus angulatis.
Mantis angulata Ent. ſyſt. 2. 13. 5.
Mantis gigas Drury Inſ. 2. tab. 50.
Habitat in Inſula Guadeloupe.

gigas. P. thorace teretiuſculo ſcabro, elytris breuiſſimis, pedibus ſpinoſis. Stoll. Spectr. tab. 2. fig. 5.
Mantis gigas Ent. ſyſt. 2. 14. 6. Linn. ſyſt. nat. 2. 689. 1.
Bradl. nat. tab. 27. fig. 6.

Petiv. Gazoph. tab. 60. fig. 2.
Seb. Muſ. 4. tab. 77. fig. 1, 2.
Habitat in Aſia.

necydaloides. 7. P. thorace ſcabro elytris ouatis angulatiſſimis, alis oblongis.
Mantis necydaloides Ent. ſyſt. 2. 14. 7. Linn. Nat. 2. 691. 14. Amoen. acad. 6. 39?
Degeer Inſ. 3. 404. 1. tab. 36. fig. 1.
Roeſ. Inſ. 2. Gryll. tab. 19.
Stoll. Spectr. tab. 3. fig. 8. tab. 4. fig. 11.
Habitat in Aſia.

atrophica. 8. P. thorace quadriſpinoſo, elytris breu. baſi ariſtato mucronatis.
Mantis atrophica Ent. ſyſt. 2. 14. 8.
Mantis atrophica Pall. ſpicil. faſc. 9. tab. 1.
Habitat in Inſula Java.

ſpinoſa. 9. P. capite thoraceque ſpinoſis, elytris ... mis acutis.
Mantis ſpinoſa Ent. ſyſt. 2. 14. 9.
Habitat in Indiis.

2ſpinoſa. 10. P. thorace teretiuſculo antice biſpinoſo, ... tris breuiſſimis: margine flauo.
Mantis 2ſpinoſa Ent. ſyſt. 2. 15. 10.
Habitat in America.

iamaicenſis. 11. P. linearis viridis elytris breuiſſimis: m... exteriori flauo.
Mantis iamaicenſis Ent. ſyſt. 2. 15. 11.
Spectrum viride Stoll. tab. 6. fig. 20. 21.
Drury Inſ. 2. tab. 49. fig. 1.
Habitat in Jamaica.

lateralis. 12. P. linearis nigra elytris breuiſſimis nigr... teribus flauis.

Mantis lateralis Ent. ſyſt. 2. 15. 12.
Spectrum nigrum Stoll. tab. 10. fig. 36. 37.
Habitat in Braſilia.

3. P. linearis fuſca elytris breuiſſimis unidentatis antennis longis albo annulatis. *annulata.*
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.
Statura omnino praecedentis. Antennae corpore duplo fere longiores, fuſcae annulis quatuor albis. Caput et thorax linearia, fuſca, immaculata. Elytra breuiſſima, fuſca margine exteriore flauo. Dens breuis, eleuatus in medio. Alae fuſcae. Pedes ferruginei.

4. P. capite thoraceque ſpinoſis, elytris breuiſſimis: tuberculo medio ſubcompreſſo. *aurita.*
Mantis aurita Ent. ſyſt. 2. 15. 13.
Habitat in India orientali.

5. P. linearis fuſca elytris breuiſſimis baſi ſubſpinoſis. *linearis.*
Mantis linearis Ent. ſyſt. 2. 15. 14.
Habitat in India.

6. P. linearis fuſca elytris breuiſſimis, alis nigris baſi albis: coſta flauo faſciata. *variegata.*
Habitat — — Dom. Weber.
Statura P. roſeae. Caput et thorax fuſca utrinque linea laterali, flaua. Elytra breuiſſima, fornicata, fuſca macula magna baſeos flaua. Alae longitudine corporis nigrae, baſi late albae coſta tota atra faſciis quatuor flauis. Corpus fuſcum.

roſea. 17. P. linearis viridis fronte fulua, elytris
ſimis uniſpinoſis, alis roſeis: coſta
Mantis roſea Ent. ſyſt. 2. 16. 15.
Stoll tab. 5. fig. 17.
Habitat in India orientali Muſ. D. Lund

MANTIS. *Palpi* ſubaequales fil
Labium quadrifidum
niis aequalibus.
Antennae ſetaceae.

cordata. 21—22. M. thorace utrinque membran
latato, elytris alis dimidio breuioribus
Habitat in Indiis Muſ. Galliae.
Statura omnino M. ſtrumaria at pau
et diſtincta. Caput pallide teſtaceum
nis longitudine corporis, ſetaceis.
lobo antico cordato, vireſcente, p
teribus ſerrulatis. Elytra viridia
duplo breuiora neruo medio eleuato
longitudine corporis magnae, virides
domen depreſſum, foliaceum, viri
linea media, eleuata, fuſca. Pedes
bus foliaceis anticis poſticisque intus

lobata. 27—8. M. thorace utrinque ſerrato gri
trorum margine viridi albo, pedibus
cis lobatis.
Habitat Cajennae Dom. Boſc.
Magnitudo et ſtatura M. oratoriae.
thorax griſea, immaculata margine va
rato. Elytra griſea, ſubhyalina, imma
culata linea marginali ultra medium

margine vero ipſo niueo. Pedes griſeo fuſcoque varii. Pedes poſtici lobo ad apicem femorum et in medio tibiarum.

38. M. thorace laeui griſeo, elytris obſcure hyalinis: maculis lateralibus fuſcis margineque viridi. *marginata.*

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Magna. Caput inerme, griſeum. Thorax filiformis, apice parum dilatatus, griſeus, immaculatus. Elytra obſcure hyalina maculis plurimis, lateralibus fuſcis margineque exteriori deflexo, viridi. Alae obſcure hyalinae macula una alteraue nigra. Pedes anteriores falcati poſteriores ſimplices vireſcentes.

39. M. cinerea elytris hyalinis, fronte porrecta lanceolata. *lanceolata.*

Habitat in India orientali Muſ. Dom. de Sehestedt.

Corpus paruum, cinereum, immaculatum elytris hyalinis longitudine abdominis. Antennae ſetaceae longitudine corporis. Frons inter oculos porrecta, plana, acuta.

ACHETA. *Palpi* inaequales, filiformes.
Labium quadrifidum: laciniis lateralibus dilatatis rotundatis.
Antennae ſetaceae.

2. A. elytris breuiſſimis apice atris, pedibus anticis palmatis. *foſſor.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldor[f]

Minuta. Caput et thorax cinereo im[maculata].
Elytra corpore triplo breuiora, alb[a]
macula atra. Alae elongatae, corp[ore lon]-
giores, haud caudatae, compreſſ[ae]
albae, apice fuſcae. Abdomen ſupra [al]-
groque faſciatum, ſubtus cinereum. P[edes an]-
tici breues, palmati, reliqui nigro [...]

maculata. 13—4. A. alis caudatis elytro longioribus,
capite thoraceque teſtaceis nigro m[aculatis].

Habitat in India orientali Dom. Daldorf.

Corpus medium. Antennae fuſcae. C[aput gi]-
boſum nigrum vertice teſtaceo lin[eis]-
que nigris: lateralibus breuioribus.
teſtaceus maculis punctisque nigris [...]
tus. Elytra plana, nigra margine [...]
abdomine breuiora. Alae caudatae
paullo longiores, albidae. Corpus [...]
ano ſetis duabus villoſis absque ſtylo.

aquea. 14—5. A. elytris albo hyalinis alis breu[ioribus]
corpore flaueſcente.

Habitat in Roſſia meridionali Dom. Bo[ber].

Corpus totum flaueſcens, immaculatum. E[ly]-
tra omnino ouata, hyalina. Alae ely[tris lon]-
giores. Pedes poſtici parum elongat[i].

LOCUSTA. *Palpi* filiformes.
Maxilla apice tridentata.
Labium bifidum: laciniis ſeta ſubulata.
Antennae ſetaceeae.

5. L. viridis thorace linea laterali ferruginea, elytris breuiſſimis, enſe recuruo; ſerrato. ***ſerricauda.***
abitat in Italia Dr. Allioni.
raecedentibus paullo minor. Antennae longiſſimae, virides. Caput viride, immaculatum. Thorax viridis linea laterali ferruginea. Elytra breuia, plana, rotundata. Enſis breuis, recuruus utrinque ſerratus.

5. L. viridis elytris compreſſis abdomine dimidio breuioribus, enſe recuruo inermi. ***hemiptera.***
abitat in Isle de France Dom. Daldorff.
orpus paruum, totum viride, immaculatum. Antennae elongatae, ſetaceae. Elytra compreſſa, ſtriata abdomine dimidio breuiora. Enſis breuis, recuruus margine integro.

L. aptera atra thorace plano: margine dilatato ſerrato. ***marginata.***
abitat in Roſſia meridionali Dom. Boeber.
rua, tota atra. Antennae ſetaceae. Thorax magnus, planus margine undique dilatato ſerrato. Abdomen breuiſſimum. Tibiae valde ſerratae.

GRYLLUS. *Palpi* filiformes.
Labium rotundatum, rotundum: laciniis rotu[ndatis]
tis.
Antennae filiformes.

obſcurus. 33—4. G. obſcurus linea dorſali flaua.
Habitat in America boreali Dom. v. Roh[r].
Statura et magnitudo G. neruoſi. Cap[ut ob]ſcurum antennis ferrugineis punctoq[ue ver]ticali flaua. Thorax ſcaber, fuſcus [linea] dorſali flaua, poſtice rotundatus. Ely[tra ob]ſcure teſtacea margine tenuiori flauo. [Alae] obſcurae. Pedes vireſcentes tibiis p[oſticis] ſpinis flauis apice nigris.

Banian. 33—4. G. flaueſcens thorace plicis quatuo[r: ſe]cunda abbreuiata.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Caput flaueſcens fronte obtuſa. Thora[x plicis] quatuor ſecunda abbreuiata, inflexa, p[oſtice] rotundatus. Elytra longitudine alarum [vi]reſcentia. Pedes flaui tibiis poſticis b[...]tis, vireſcentibus.

muricatus. 36—7. G. thorace muricato: criſta poſtice [...]tata, alis cinereis: faſcia nigra.
Gryllus muricatus Pallas Iter.
Habitat in Roſſia meridionali Dom. Boeb[er ...]de ſonorus.
Statura et magnitudo G. ſtriduli. Thora[x fuſ]cus margine antico parum palleſcente, [mu]ricatus antice criſta eleuata, poſtice bi[...]

ta. Elytra obſcura. Alae hyalinae faſcia nigra.

9—60. G. vireſcens thoracis dorſo elytrisque fuſcis, tibiis ſanguineis. *ſanguinipes.*

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Antennae ferrugineae, apice nigrae. Caput vireſcens vertice fuſco. Thoracis dorſum late fuſcum. Elytra fuſca. Abdomen vireſcens. Tibiae poſticae ſanguineae dentibus nigris.

1—2. G. fuſcus elytris baſi linea marginali viridi apice maculatis, pedibus poſticis variegatis. *Tamulus.*

Habitat in India orientali D. Daldorff.

Statura parua praecedentium. Caput fuſcum fronte vix prominula. Thorax fuſcus linea dorſali ſubcarinata, teſtacea. Elytra baſi fuſca linea marginali viridi, apice hyalina, fuſco maculata. Alae fuſcae, baſi flaueſcentes. Pedes fuſci, poſtici femoribus extus fuſcis, apice albis, intus baſi fuſcis margine rufis, tunc annulo albo, fuſco, albo apiceque nigris. Tibiae baſi nigrae, tunc albae, tandem cyaneae, denique rufae.

61—2. G. thorace carinato obſcurus alis ſanguineis, femoribus poſticis ciliatis. *ciliatus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Paruus. Caput fuſcum fronte vix prominula. Thorax carinatus, fuſcus. Elytra teſtacea,

immaculata. Alae ſanguineae. Pedes ſ[illegible]
ci, poſtici teſtacei femoribus compreſ[illegible]
margine ſuperiori pilis breuibus albis [illegible]
liato.

ſcaber. 62—3. G. ſcaber fuſcus elytris abbreuiatis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
An declaratus? Corpus paruum, fuſcum, p[illegible]
ctis eleuatis ſcabrum. Elytra corpore p[illegible]
lo breuiora.

CLASSIS III.

SYNISTATA.

MAXILLA BASI GENICULATA, CONNATA CUM LABIO.

LEPISMA.

Os elypeo breui, rotundato, integro.
Palpi quatuor inaequales.
anteriores longiores filiformes, 6articulati: articulo ultimo longiori, ſubulato adnati maxillae dorſo.
poſteriores breuiores, triarticulati: articulo ultimo craſſiori, ſubſecuriformi adhaerentes labii medio.
Mandibula cornea, arcuata, acuta, edentula.
Maxilla bifida: laciniis aequalibus: exteriore rotundata, ſetoſa, interiore acuta.
Labium membranaceum, rotundatum, profunde emarginatum.
Antennae ſetaceae.

PHRYGANEA.

Os clypeo porrecto, anguſto, acuto.
Mandibulae nullae.

Labium porrectum, acutum, membranaceum,
ce ſubemarginatum.

PSOCUS.

Os clypeo parum porrecto, rotundato, e
ginato.

Palpi quatuor inaequales.

anteriores ſubfiliformes quadriarticulati: ar
lis ſubaequalibus; exteriore parum craſ
adhaerentes maxillae dorſo.

poſteriores longiores quadriarticulati adnati
medio.

Mandibula lata, cornea, arcuata, intus uni
tata.

Maxilla cornea, elongata, linearis, apice bi
nata in vagina membranacea, obtuſa la
baſi ſquama duplici ſuffulta.

Labium membranaceum, apice quadrifidum
ciniis lateralibus maioribus, palpiformibus

Antennae ſetaceae.

PANORPA.

Os clypeo ouato, fornicato, ciliato.

Palpi poſteriores biarticulati, articulo baſeos
to, craſſiori, ſecundo cylindrico, obtuſo

Mandibula cornea, recta, apice unidentata.

Labium breue, rotundatum, apice emarginatum
palpigerum.

LEPISMA. *Palpi* inaequales.
Labium membranaceum, rotundatum, emarginatum.
Antennae ſetaceae.

2. L. griſea nitens cauda triſeta: intermedia longiſſima. *thezeana.*

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Statura et magnitudo L. polypodae. Antennae corpore fere longiores, fuſco pallidoque variae. Corpus totum ſquamoſum, griſeum, nitidum. Cauda triſeta ſetis albis: intermedia corporis longitudine, lateralibus duplo minoribus.

4. L. cauda triſeta, thorace membranaceo rotunda, abdomine lineato. *vittata.*

Habitat in Italia Muſ. Dom. Boſc.

Statura et magnitudo L. lineatae. Caput fuſceſcens antennis longis, pallidis. Thorax planus lateribus membranaceis, rotundatis, pallidis, Abdomen fuſcum vittis quinque albidis, micantibus. Cauda pilis tribus villoſis et ſubtus ſetulis aliquot: intermedia elongata. Pedes pallidi.

PODURA. *Palpi* quatuor ſubclauati.
Labium bifidum.
Antennae filiformes.

16—17. P. albida cauda extenſa bifida, thorace antice eleuato criſtato. *criſtata.*

Habitat in Kiliae ſyluis Dom. Weber.
Magna in hoc genere pallida antennis ob[ſ]...
ribus. Thorax antice eleuatus, cr...
Cauda corpore dimidio breuior, alba.

SEMBLIS. *Maxilla* bifida.
Labium corneum.
Antennae filiformes.

planata. 6—7. S. nigra capite maculis duabus ferru...
abdomine ſubtus griſeo: ano ferrugin...
Habitat ad Galliae aquas Dom. Boſc.
Maior S. bicaudata. Caput depreſſum, ni...
maculis duabus magnis baſeos ferru...
Thorax quadratus, ater, immaculatu...
abdomine fere duplo longiores, obſ...
nigro maculatae. Abdomen griſeſcen...
ferrugineo ſetis duabus longitudine abd...
nis, nigris. Pedes nigri.

fuſcata. 10—11. S. ecaudata fuſca alis fuſco hyalin...
gro neruoſis.
Habitat in Italia Dom. Allioni.
Statura S. viridis at paullo maior. Corpus
cum, immaculatum. Pedes teſtacei.
obſcure hyalinae neruis nigris ſtriatae.

PHRYGANEA. *Maxillae* totae co...
tae cum labio.
Antennae ſetaceae.

villoſa. 6—7. P. teſtacea alis hirtis pallidioribus.
Habitat in Dalekarliae Alpibus Dom. Payk...

imis affinis P. piloſae at paullo minor et breuior. Antennae breues, ferrugineae. Caput et thorax hirta. Alae pallidiores pilis elongatis, erectis hirtae.

17. P. nigra alis griſeis: venis atris ſtriatis. *neruoſa.*

Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

Statura et magnitudo P. ſtriatae. Antennae nigrae, corpore longiores. Caput et thorax villoſa, nigra. Alae griſeae neruis eleuatis, diſtinctis, atris. Pedes palleſcentes.

17. P. teſtacea alis vitta nigricante, antennis longitudine corporis. *vittata.*

Habitat ad Kiliae aquas.

Parua. Antennae vix alis longiores, rufae. Caput nigrum. Thorax teſtaceus. Alae teſtaceae vitta media nigricante, quae baſin haud attingit ad apicem vero dilatatus.

19. P. alis fuſcis, macula poſtica lunata flaueſcente. *tigurinenſis.*

Habitat frequens in lacu Tigurinenſi.

Parua. Antennae flaueſcentes, apice obſcuriores longitudine fere corporis. Caput et thorax nigra, immaculata. Alae fuſcae macula magna lunata, flaueſcente, quae interdum annulum format. Pedes flaueſcentes.

9. P. alis griſeis ciliatis, antennis breuibus. *Waeneri.*

Phryganea Waeneri Linn. ſyſt. nat. 2. 911. 16. Fn. Sv. 1493.

Habitat ad lacum Waeneri Sueciae.

1. P. cinerea alis albis immaculatis. *alba.*

Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

Statura parua. P. minutae. Antennae
Corpus cinereum. Alae albae,
latae.

pygmaea. 31—2. P. atra alis fuſcis immaculatis,
mediocribus.

Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

Statura parua P. puſillae. Corpus cum
nis corpore haud longioribus atrum.
omnes fuſcae.

HEMEROBIUS. *Maxilla* recta,
fiſſa.
Labium corneum
nicatum.
Antennae ſetaceae

nebuloſus. 1—2. H. fuſcus alis albo nigroque nebuloſ

Habitat in America boreali Dom. v. Roh

Sequentibus maior. Alae valde deflexae
loſae.

candidus. 5—6. H. pallidus alis hyalinis: anticis p
tribus fuſcis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus vix H. albo minus, tenerum, pall
antennis filoſis, corpore longioribus.
magnae, patulae, hyalinae, nitidae p
anticarum tribus nigris, altero ad baſin
ginis tenuioris, ſecundo pone medium
tertio verſus apicem marginis craſſioris.

[PS]OCUS. *Maxilla* elongata, linearis ſquama duplici baſeos ſuffulta.

Labium quadrifidum.

Antennae ſetaceae.

[P.] niger ore pedibusque pallidis, antennis longioribus fuſcis. *longicornis.*

[H]emerobius *longicornis* Ent. ſyſt. 2. 84. 14.

[H]abitat in Holſatia.

[P.] niger thorace abdomineque flauis. *flauicans.*

Hemerobius *flauicans* Ent. ſyſt. 2. 86. 22. Linn. ſyſt. nat. 2. 913. 13. Fn. Su. 1512.

Habitat in Europae hortis.

P. fuſcus flauo maculatus, alis fuſco ſtriatis: poſticis immaculatis. *ſtriatulus.*

Hemerobius *ſtriatulus* Ent. ſyſt. 2. 85. 15.

Habitat in Europae hortis.

P. alis albis: faſciis tribus atomisque numeroſis nigris. *faſciatus.*

Hemerobius *faſciatus* Ent. ſyſt. 2. 85. 17.

Habitat Kiliae.

P. alis albis: maculis fuſcis poſtice punctis ſex diſtinctis, antennis fuſcis. *6punctatus.*

Hemerobius *6punctatus* Ent. ſyſt. 2. 86. 20. Linn. ſyſt. Nat. 2. 913. 12. Fn. Su. 1511.

Pſoci corpus paruum, tenerum, glabrum immarginatum, agile, capite exſerto ouato, ore obtuſo, oculis globoſis, prominulis, lateralibus, antennis elongatis, diſtantibus, in cantho oculorum inſertis, thorace gibbo, abdomine breui, ouato, alis quatuor aequalibus, corpore longioribus, compreſſis, pedibus tenuibus, longiuſculis, tarſis quinquearticulatis, colore vario.

Geoff. Inſ. 2. 250. 10.
Habitat in Europae hortis.

picicornis. 6. P. niger alis anticis albo fuſcoque va[riis,]
tennis longis hirtis.
Hemerobius picicornis Ent. ſyſt. 2. 86.
Habitat in Dania Dom. de Seheſtedt.

2punctatus. 7. P. flauo fuſcoque variis alis punctis
nigris.
Hemerobius 2punctatus Ent. ſyſt. 2. 86.
Fn. Su. 1514.
Habitat in Europae hortis.

4punctatus. 8. P. alis albis: baſi punctis quatuor at[ris]
fuſco radiatis.
Hemerobius 4punctatus Ent. ſyſt. 2. 86.
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

abdominalis. 9. P. fuſcus abdomine flauo: ano nigro.
Hemerobius abdominalis Ent. ſyſt. 2. 86.
Habitat in Anglia, Norwegia.

pulſatorius. 10. P. apterus ore rubro, oculis luteis.
Hemerobius pulſatorius Ent. ſyſt. 2. 87.
Termes pulſatorium Linn. ſyſt. nat. 2.
Fn. Su. 1937. Geoff. Inſ. 2. 601. 12.
Degeer Inſ. 7. 41. 1. tab. 4. fig. 1.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 29. fig. 3.
Roland. Act. Holm. 1754. 152.
Schaeff. Elem. tab. 22. fig. 144.
Bradl. nat. tab. 27. fig. 3.
Habitat in Europa, America frequens in
mibus.

fatidicus. 11. P. apterus ore pallido, oculis fuſcis.
Hemerobius fatidicus Ent. ſyſt. 2. 87. 27.

[Hemerobius] fatidicum Linn. ſyſt. Nat. 2. 1016. 3.
[Fau]n. Su. 1938.
[Ge]h. Inſ. 11. 2. tab. 10.
[Hab]itat in Europae quisquiliis.
[N]a praecedente ſatis diſtinctus.

[MY]RMELEON. *Palpi* ſex inaequales. *poſtici* multo longiores: articulis ultimis duobus extrorſum craſſioribus.
Antennae extrorſum craſſiores.

[1]. M. alis hyalinis: macula marginis tenuioris fuſca, thorace flauo lineato. *tetragrammicum.*
[M]yrmeleon *tetragrammicum* Pallas Iter.
[H]abitat in Roſſia meridionali Dom. Boeber.
[N]ullo maior M. formicario. Antennae extrorſum craſſiores, multiarticulatae, nigrae articulorum apicibus flauis. Caput nigrum ore flauo. Thorax niger lineis tribus flauis. Abdomen teſte amiciſſimo Boeber in ſpecimine viuo coeruleo fuſcoque annulatum, in noſtro emortuo nigrum. Alae hyalinae, anticis maculis aliquot fuſcis, omnibus macula diſtincta ad marginem tenuiorem ſtigmateque ordinario albo. Pedes flaui.

6. M. alis hyalinis immaculatis: neruo marginali nigro alboque punctato, thorace nigro flauo lineato. *lineatum.*

Habitat in Roſſia meridionali Dom. Br

Statura et magnitudo M. formicarii. A nigrae. Caput fuſcum ore flauo fr flauo variegato. Thorax niger line li flaua. Abdomen fuſcum, imma Alae hyalinae neruo ad marginem ex albo nigroque punctato, reliquis fl tibus. Stigma ordinarium album. flaui femoribus apice nigris.

pictum. 6—7. M. alis hyalinis immaculatis, capite ceque flauis nigro maculatis, abdom gro: linea laterali flaua.

Habitat in Roſſia meridionali Dom. B

Statura et magnitudo praecedentium. C nae extrorſum craſſiores, nigrae. uum macula magna, frontali lineaq ticali nigris. Thorax flauus linea d turaque ante alas nigris. Abdomen utrinque linea laterali flaua. Alae h ſtigmate ordinario pallido, obſoleto. flaui.

ermineum. 6—7. M. alis hyalinis immaculatis: neruo ginali flaueſcente griſeum abdomine

Habitat in India orientali Dom. Daldorff

Medium. Antennae extrorſum craſſiores nicatae, griſeae. Caput et thorax griſ maculata. Abdomen nigrum, immacul Alae hyalinae, nitidae neruis reticulat uoque maiori ante marginem exteriore ſtaceo.

8. M. alis hyalinis: neruis albo nigroque pun- *muſtelinum.*
ctatis apice fuſco punctatis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus paruum. Antennae extrorſum craſſiores, incúruae. Caput et thorax obſcure cinerea, fuſco lineata. Abdomen fuſcum. Alae hyalinae neruis albo nigroque punctatis et apice ſtrigae duae e maculis minutis fuſcis. Stigma ordinarium ómnino deeſt.

9. M. alis hyalinis immaculatis fuſcum capite *urſinum.*
flauó nigro maculato.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus paruum. Antennae mihi deſunt. Caput flauum vertice maculis plurimis fuſcis. Thorax et abdomen fuſca, immaculata. Alae hyalinae, neruis reticulatae, immaculatae. Pedes cinerei.

ASCALAPHUS. *Palpi* ſex ſubaequales, filiformes.
Antennae elongatae, clauatae.

5. A. alis albis: poſticis macula anguli ani fuſ- *ſurinamenſis.*
ca, antennis claua fulua.
Habitat Surinami Dom. Weber.
Statura praecedentium. Antennae longiſſimae, nigrae claua oblonga, fulua. Corpus hirtum, nigrum abdomine ſubtus fuluo maculato. Alae albae poſticae macula ad angulum ani fuſca.

PANORPA. *Os* porrectum, co
Maxilla truncata,
Antennae filiformes.

Coa. 7. P. alis erectis flauis nigro variegatis:
lineasribus nigris: faſciis tribus albis.
Panorpa Coa Ent. ſyſt. 2. 98. 7. Linn. ſyſt
2. 915. 4. Act. Holm. 1747. 176.
fig. 1.
Ruyſch. Theſ. Anim. tab. 1. fig. 2. D.
Petiv. Gazoph. 1. tab. 73. fig. 1.
Forsk. Deſcript. Anim. 97. tab. 25. fig.
Habitat in Archipelagi Inſulis.
Corpus nigrum. Alae anticae erectae,
datae flauae, nigro variegatae, poſticae
giſſimae, lineares, apice lanceolatae
tribus pone medium albis: poſteriore
nali.

halterata 8. P. alis erectis pallidis: coſta fuſca, poſt
nearibus longiſſimis ſubbiclauatis.
Habitat in Barbaria Mus. Dom. Boſc.
Omnino a praecedente diſtincta. Corpus
uum, nigro varium. Alae anticae rotun
tae, pallidae, reticulatae, coſta late fu
Poſticae lineares, nigrae apice dilatatae,
medio coarctatae, faſciis tribus albis: in
media minore.

CLASSIS IV.

PIEZATA.

MAXILLA CORNEA, COMPRESSA, SAEPE ELONGATA.

ORYSSUS.

Os clypeo rotundato, porrecto, integro.
Palpi quatuor, inaequales.
anteriores porrecti, filiformes, quinquearticulati: articulo tertio longiori, cylindrico maxillae dorſo inſerti.
poſteriores breuiores, triarticulati: articulis duobus baſeos cylindricis, ultimo ſublongiori, ouato labii medio interiori inſerti.
Mandibula breuis, craſſa, cornea, edentula.
Maxilla coriacea, compreſſa, ápice membranacea, rotundata.
Labium membranaceum, apice coriaceum, elongatum, rotundatum, integrum.
Antennae laterales maris 12articulatae, feminae 10articulatae, filiformes.

BANCHUS.

Os clypeo breui, corneo, rotundato, integro.
Palpi quatuor porrecti, inaequales, filiformes.

anteriores longiores, ſexarticulati: artic[ulis cy]lindricis, aequalibus adhaerentes m[axil]lae dorſo.

poſteriores paullo breuiores, quadriart[iculati]: articulis cylindricis aequalibus adnat[i labii] medio.

Mandibula magna, lata, fornicata, apice tr[unca]ta, dentata.

Maxilla breuis, membranacea, rotundata, [in]tegra.

Labium baſi corneum, cylindricum, apice [mem]branaceum, rotundatum, integrum.

Antennae ſetaceae.

OPHION.

Os clypeo breui rotundato, integro.

Palpi quatuor elongati, inaequales, filiform[es]: *anteriores* longiores, ſexarticulati: articul[is cy]lindricis, ſubaequalibus adhaerentes [maxil]lae dorſo.

poſteriores quadriarticulati: articulis cyli[ndricis], adnati labii apice.

Mandibula porrecta, cornea, incurua apice b[iden]tata.

Maxilla breuis, membranacea, rotundata, [in]tegra.

Labium breue, ouatum, membranaceum, [inte]grum, apice palpigerum.

Antennae ſetaceae.

FOENUS.

Os clypeo breui, rotundato, emarginato,

[Pa]lpi quatuor breues, ſubaequales, filiformes.
anteriores vix maxilla longiores, ſexarticulati: articulis cylindricis, ſubaequalibus adhaerentes maxillae dorſo.
poſteriores paullo breuiores, quadriarticulati adnati labii medio.
[M]andibula cornea, arcuata, acuta, edentula.
[M]axilla breuis, membranacea, compreſſa, apice rotundata, intus unidentata.
[L]abium breue, membranaceum, transuerſum, integrum.
[A]ntennae breues, filiformes.

SPHEX.

[Or]a lingua porrecta, trifida.
[Cl]ypeus breuis rotundatus, corneus, integer.
[Pa]lpi quatuor porrecti, ſubaequales, filiformes.
anteriores vix longiores, ſexarticulati: articulis cylindricis adhaerentes maxillae dorſo.
poſteriores quinquearticulati: articulis cylindricis, aequalibus adnati labio pone medium.
[M]andibula incurua, obtuſa, cornea, in medio unidentata.
[M]axilla elongata, compreſſa, cornea, integra laciniam exteriorem linguae vaginantem conſtituens.
[L]abium maxilla paullo longius, baſi corneum, cylindricum, apice membranaceum, depreſſum, in medio ſeta parua, ſubulata ſuffultum apice emarginatum.
[An]tennae filiformes.

S. ſpecioſa, ichneumonea, groſſa aliae lab
maius, magis emarginatum gerunt at
ſtinctum genus.

POMPILUS.

Os clypeo breui, corneo, rotundato, integ
Palpi quatuor porrecti, inaequales, filiform
anteriores longiores, ſexarticulati: articu
bus anterioribus ſubrhomboidalibus,
quis longioribus, cylindricis maxillae
adhaerentes.
poſteriores breuiores, quadriarticulati: arti
tribus ſubrhomboidalibus: ultimo ouat
nati labii apice.

Mandibula recta, cornea, medio unidentata
Maxilla breuis, compreſſa bifida: lacinia exte
re cornea, rotundata, interiore membr
cea, obtuſa.

Labium breue longitudine maxillarum, corne
rotundatum, integrum apice palpigerum
Antennae breues, ſetaceae.

CYNIPS. *Palpi* inaequales, ſubcapitati.
Labium corneum, integrum.
Antennae moniliformes.

2. C. atra nitida abdomine compreſſo, tibiis ferrugineis. *compreſſa.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Magna in hoc genere. Corpus totum atrum, nitidum, immaculatum tibiis ſolis rufis. Abdomen valde compreſſum.

—11. C. atra nitida thorace pedibusque pallide flauis. *Quercus Ilicis.*

Habitat in Galla parua, depreſſa, aſſociata, monothalama Ilicis Gallo Provinciae Muſ. Dom. Boſc.

Parua. Caput atrum, nitidum. Thorax ſtriatus, pallide flauus. Abdomen compreſſum, atrum, nitidum. Alae elongatae, albae. Pedes pallidi.

—11. C. griſea abdomine ferrugineo nitido: macula dorſali atra. *Quercus radicis.*

Cynips quercus radicis Boſc. Journ. de Phyſ. 1794. fig.

Habitat in Galla lignea, polythalama dura in radicibus Quercus Roboris.

Statura et ſumma certe affinitas C. Quercus Tojae at galla omnino differt.

—11. C. ferrugineo flaua, alis hyalinis immaculatis. *Quercus terminalis.*

Reaum. Inſ. 3. tab. 41. fig. 1—5.

Habitat in Galla magna, fungoſa, rotun[da]
polythalama ramulos Quercus termin[ans]
Muſ. Dom. Boſc.

Media tota flaua alis hyalinis.

Serratulae. 15—6. C. atra nitida antennis verticillato pi[loſis]
Reaum. Inſ. 3. tab. 1.

Habitat in Galla lignea, rotundata, utrin[que]
attenuata, polythalama caulis Serratulae
venſis Galliae Muſ. Dom. Boſc.

Media, tota atra, nitida alis ſolis albis. [An-]
tennae filiformes, nigrae, verticillatae, p[iloſae]
ſae. Abdomen compreſſum, adſcend[ens].
Pedes nigri, tibiis obſcure piceis. *Variat*
te ſexu maior antennis minus verticillatis,
tamen diſtincta.

TENTHREDO. *Palpi* filiformes.
Labium trifidum.
Antennae clauatae
aut filiformes.

laeta. 10—11. T. antennis clauatis nigra abdominis ſ[eg-]
mentis margine laterali flauis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo T. ſericeae. *Caput*, [an-]
tennae, thorax nigra, immaculata. *Abdo-*
men nigrum ſegmentis baſeos utrinque m[ar-]
gine, reliquis margine toto flauo. *Alae*
bidae coſta baſi flaueſcente.

furcata. 28—29. T. antennis furcatis pectinatisque nig[ris]
abdomine rufo.

Tenthredo *furcata* Vill. 3. tab. 7. fig. 16. 17.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Statura et magnitudo omnino T. Juniperi. Antennae nigrae usque ad articulum primum bifidae: laciniis pectinatis. Caput et thorax nigra. Abdomen ferrugineum articulo primo et ſecundo nigris. Alae hyalinae. Pedes ferruginei. Variat ſexu antennis haud furcatis.

2. T. antennis ſeptemnodiis nigra antennis ſcutello abdominisque ſegmentis apice albidis. *pallicornis.*
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Magnitudo T. flavicornis. Caput nigrum labio mox albo, mox nigro. Thorax ater margine antico utrinque puncto maiori, terminali, albo. Scutellum album. Abdomen ſegmentis baſi nigris, apice late pallidis. Pedes flavi femoribus nigris.

4. T. antennis ſeptemnodiis atra thorace immaculato, abdominis ſegmentis apice tibiisque albis. *ſegmentaria.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Magna. Caput cum antennis atrum. Thorax ater, immaculatus. Abdomen atrum ſegmentorum margine albo. Pedes nigri, tibiis albis.

7. T. antennis ſeptemnodiis nigra abdominis, ſegmentis intermediis rufis, ſcutello ſtigmateque alarum albis. *ſtigma.*

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Affinis omnino T. naſſatae. Antennae nigrae, ſubtus piceae. Caput atrum. rax ater puncto calloſo ante alas margi bo in: cto. Scutellum album et punc parua ſub ſcutello. Abdomen nigrum mento 3. 4. 5. 6. rufis. Alae hyalinae mate ordinario, albo. Pedes rufi.

abdominalis. 38—9. T. antennis ſeptemnodiis atra, abdo rufo baſi atro.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Caput atrum ore rufo. Antennae ſupra ni ſubtus rufae. Thorax ater. Abdomen ue, ouatum, rufum ſegmentis anticis bus atris. Alae baſi nigrae, apice obſ Pedes rufi.

melanocephala. 38—9. T. antennis ſeptemnodiis flaua capite

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Statura parua T. Alni. Caput cum ant atrum. Thorax rufus ſcutello ſubnig te. Abdomen parum pallidius. Alae in bentes, hyalinae. Pedes flaui.

velox. 47—8. T. antennis ſeptemnodiis atra ore an narum apice punctoque femorali albis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Diſtincta omnino a praecedentibus et mi Antennae nigrae, apice albae. Caput at ore albo. Thorax ater, immaculatus. domen breue, depreſſum, atrum, imm latum. Pedes ferruginei femoribus poſ baſi atris puncto albo. Alae hyalinae.

52. T. antennis ſeptemnodiis atra ſcutello abdominis cingulis duobus anoque albis. *2cincta.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino praecedentis at diſtincta et alia. Antennae breues, nigrae articulo primo craſſiori albo. Caput nigrum ore albo. Thorax niger macula utrinque ante alas ſcutelloque albis. Abdomen atrum cingulis duobus anoque albis. Pedes albi, poſtici nigri femoribus tibiisque baſi albis.

9. T. antennis ſeptemnodiis atra abdominis ſegmento quarto rufo, penultimis duobus utrinque linea albida. *ſtrigoſa.*

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Statura omnino T. blandae. Caput atrum labio albo. Thorax niger puncto ante alas ſcutelloque albis. Abdomen cylindricum, nigrum ſegmento quarto ferrugineo, ſeptimo et octauo utrinque lineola glauca. Pedes rufi tibiis baſi annulo nigro.

1. T. antennis ſeptemnodiis atra thorace abdomine femoribusque poſticis albo punctatis. *fera.*

Tenthredo fera Scop. Fl. et Fn. Inſ. tab. 22.

Geoff. Inſ. 2. Tenth. 18.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Affinis videtur T. 12punctatae. Antennae nigrae. Caput nigrum labio albo. Thorax niger punctis duobus anticis ſcutelloque albis. Abdomen nigrum utrinque lineolis duabus approximatis pone medium anoque albis. Pedes nigri femoribus poſticis macula

magna baſeos tibiisque omnibus albis. obſcurae.

punctata. 71—2. T. antennis multiarticulatis nigra ... punctis thorace margine abdomine ... albis.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Statura omnino T. ſyluatica. Caput ma... atrum punctis quinque albis in orbem ...tis. Thorax niger margine antico albo. ...domen planum, atrum ſtrigis 4—5 ... obſoletis. Pedes ferruginei femoribus ...cula nigra.

ORYSSUS. *Palpi* poſtici breuiores ...formes.

Labium elongatum, ro...datum, integrum.

Antennae filiformes.

coronatus. 1. O. thorace maculato abdomine apice rufo: ...cto anali albo.

Sphex abietina Scopol. Ent. carn. 788.

Habitat in Galliae arboribus Dom. Latreille.

Corpus medium ſtatura Sirex. Antennae ni... articulo 2. 3. 4. ſuperne albis. Caput nig... orbita oculorum alba. Thorax ſcaber, n... puncto utrinque ante alas albo. Abdom... baſi nigrum apice rufum puncto anali al... Alae albae ante apicem nigrae. Pedes ... femoribus nigris.

Faemina aculeo conuoluto, elongato.

0. thorace immaculato, abdomine baſi nigro apice ruſo. *Veſpertilio.*

Sirex *Veſpertilio* Ent. ſyſt. 2. 129. 19.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura et ſumma affinitas praecedentis at paullo maior.

ICHNEUMON. *Labium* cylindricum, apice membranaceum, emarginatum; medio palpigerum. *Antennae* ſetaceae.

18. I. ſcutello albo, thorace maculato ater abdominis ſegmento ſecundo tertioque punctis duobus albis. *natatorius.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus magnum, atrum. Antennae atrae annulo in medio albo. Caput atrum orbita oculorum albida. Thorax niger punctis duobus ante alas ſcutelloque flauicantibus. Abdomen atrum, nitidum ſegmento ſecundo punctis duobus maioribus baſi coeuntibus, tertio punctis duobus diſtinctis flauicantibus. Pedes ruſi.

1. I. ſcutello albo ater thorace maculato, abdomine ruſo: primo ſegmento nigro. *exſpectorius.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Differt manifeſte ab. I. piſorio minor. Caput atrum mandibulis ruſis, apice nigris. Thorax ater, nitidus punctis duobus ante alas

albis. Scutellum niueum. Abdom[en]
longum, planum, rufum primo [...]
to atro. Pedes rufi femoribus nigris[...]

laminatorius. 38—4. I. ſcutello albo thorace maculato [la]bio albo: lineis tribus nigris.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Magnus. Antennae nigrae, immaculatae. [Ca]put atrum labio albo lineis tribus ab[...]tis, nigris. Orbita oculorum alba. [Tho]rax niger puncto calloſo ante alas, [...] ſub alis lineaque utrinque ad m[...] ducta ſcutelloque albis. Abdomen [...] Pedes albo nigroque varii.

nugatorius. 39—40. I. ſcutello albo, thorace maculato abdominis ſegmento ſecundo tertioque flauis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino I. faſciatorii. Antennae [...]tus rufae. Caput atrum orbita oculorum [...]ciaque labii flauis. Thorax ater pu[ncto ante] alis albo, ſub ſcutello biſpinoſus. Ab[domen] oblongum, atrum ſegmento ſecundo [...]que baſi flauis. Petiolus canaliculatus [...] flaueſcentes. Pedes ferruginei fem[oribus] atris.

flauatorius. 54—5. I. ſcutello albo fuluus antennis ab[domi]nisque ultimis ſegmentis atris.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Magnus. Antennae totae atrae. Cap[ut fuluum] oculis ſtemmatibusque verticalibus [...] Thorax fuluus interdum immaculatus[...]

terdum dorſo nigro. Scutellum album. Abdomen oblongum, planum, fuluum ultimis duobus ſegmentis atris, nitidis. Alae flaueſcentes. Pedes fului femoribus poſticis apice atris.

6. I. ſcutello albo, thorace maculato, abdomine ruſo: petiolo nigro. *ſimilatorius.*

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Affinis I. fuſorio at minor. Antennae porrectae, nigrae. Caput nigrum orbita oculorum parua, alba. Thorax niger lineola antica utrinque ſcutelloque albis. Abdomen ouatum, rufum petiolo nigro. Pedes rufi femoribus nigris.

8. I. ſcutello albo: puncto fuluo niger thorace ante ſcutellum fuluo flauoque vario. *oculatorius.*

Habitat Pariſiis Muſ. D. Boſc.

Medius. Caput nigrum ſub antennis oculorumque orbita albis. Thorax niger ante ſcutellum flauus: maculis tribus magnis, oblongis, obſcure fuluis: intermedia minore, pone ſcutellum niger. Scutellum album macula magna media fulua. Abdomen longiuſculum, atrum ſegmentorum marginibus vix fuluis. Alae hyalinae. Pedes rufi.

4. I. ſcutello albo, thorace immaculato, abdominis ſegmento ſecundo tertioque rufis. *erictorius.*

Habitat Kiliae.

Statura et magnitudo I. luctatorii at diſtinctus et alius. Caput et thorax atra, immaculata. Scutellum album. Abdominis primum

ſegmentum nigrum linea dorſali eleu
3. rufa, reliqua nigra. Pedes rufi tib
ſticis baſi albis.

truncator. 81—2. I. niger thorace pedibusque ferru
Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.
Paruus. Antennae ſubferrugineae fa
alba. Caput nigrum mandibulis p
albidis. Thorax laeuis, ferrugine
maculatus. Abdomen longiuſculum,
lindricum, atrum aculeo breuiſſimo.
vix abdominis longitudine, hyalinae.
des rufi.

luteator. 87—8. I. ferrugineus abdomine apice atro:
albo.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Medius. Antennae primo articulo ferru
baſi fuſcae, apice nigrae, in medio alb
nulatae. Caput et thorax ferruginea
maculata. Abdomen ferrugineum,
atrum ano ſupra albo. Pedes ferrugine
ſtici geniculis atris.

brunneator. 28—9. I. ferrugineus capite atro.
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Paruus. Antennae porrectae annulo lato
Caput atrum, immaculatum. Corpus
rugineum. Alae hyalinae, nitidae.

abbreuiator. 89—90. I. ater abdomine rufo apice atro: ſti
alba, alis breuiſſimis.
Habitat in Kiliae muris Dom. Weber.
Medius. Antennae baſi rufae, medio albae,

[Ba]ſe nigrae. Caput et thorax atra, immacu[l]ata. Abdomen rufum ano late nigro: ſtri[g]a poſtica niuea. Alae breuiſſimae, oua[t]ae, albidae. Pedes rufi femoribus poſticis apice nigris.

3. I. ferrugineus capitis vertice atro, alis fuſ[c]is: coſta dimidiata ferruginea. *laminator.*

[H]abitat in India orientali Dom. Daldorff.

[Af]finis videtur I. caſtrator at duplo maior. Caput ferrugineum antennis, vertice nuchaque atris. Thorax ferrugineus puncto paruo, dorſali, atro. Abdomen planum, depreſſum, ferrugineum aculeo exſerto, nigro. Alae fuſcae, baſi pallidiores coſta ferruginea, in medio ſtigmate magno, ferrugineo utrinque atro notato. Pedes ferruginei.

3. I. ferrugineus antennis capitis vertice thoraciſque dorſo nigris, alis fuſcis: ſtigmate nigro; puncto flaueſcente. *caſtrator.*

[H]abitat in Italia Dr. Allioni.

[St]atura et magnitudo I. deſertor. Antennae nigrae. Caput ferrugineum vertice nigro. Thorax niger margine antico et laterali, ferrugineo. Abdomen ferrugineum aculeo breui, atro: ſetis lateralibus breuioribus. Alae fuſcae ſtigmate flauo utrinque nigro terminato. Pedes ferruginei femoribus tibiisque poſticis apice puncto nigro.

4. I. niger abdomine coccineo, alis albidis: faſcia lata nigra. *faſciator.*

[H]abitat Cajennae Dom. Richard.

Medius. Caput et thorax atra, nitida,
culata. Abdomen rufum. Anus ſ
ger mihi deeſt. Alae albidae faſcia
ta, nigra. Pedes nigri.

ſpinator. 100—1. I. ferrugineus vertice atro abdom
mentis punctis duobus alarumque
apicis nigris.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldo
Medius. Antennae nigrae, baſi flau
put ferrugineum vertice atro. Thor
rugineus linea dorſali, antica atra.
men ferrugineum ſegmento ſingulo
duobus paruis, nigris. Alae hyalin
cula magna verſus apicem fuſca. Pe
ruginei.

ſerrator. 106—7. I. ater alis fuſcis: lunula pallida,
minis ſegmento primo ſecundo tertioq
fis, femoribus poſticis ſerratis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Maior. Caput orbiculatum et thorax at
maculata. Alae fuſcae lunula obſoleta
lida ad marginem craſſiorem. Abdom
uatum ſegmento primo elongato, c
co, ſecundo tertioque rufis. Aculeus
tudine corporis. Pedes rufi, femoribus
puncto apicis albo, poſtica ſerrata.

urinator. 111—12. I. niger thorace antice rufo, abd
ne rufo: maculis dorſalibus nigris, alis
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura parua I. denigratoris. Antennae n
Caput nigrum, immaculatum. Thora

tice rufus, poſtice niger. Abdomen rufum maculis dorſalibus baſeos nigris. Alae fuſcae. Pedes nigri.

1—12. I. ater abdomine rufo: linea dorſali atra, alis fuſcis. *minutator.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum, atrum, immaculatum. Abdomen rufum linea dorſali atra. Alae fuſceſcentes. Pedes rufi femoribus baſi nigris.

1—12. I. niger abdomine ferrugineo alis fuſcis: macula flaua baſi pallidioribus. *elector.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Diſtincta omnino ab. I. denigrator corpore paullo maiore, minus atro, abdomine magis elongato ferrugineo, aculeo nigro. Alae baſi pallidiores, apice fuſcae ſtigmate marginali magno, flauo. Pedes nigri.

7—28. I. niger abdomine obſcure ferrugineo: petiolo bicarinato nigro. *carinator.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Medius. Caput nigrum, ſub antennis album linea media nigra. Thorax niger puncto ante alas alioque ſub alis albis. Abdomen obſcure rufum petiolo breui lineis duabus eleuatis carinato, nigro. Pedes rufi, poſtici nigri.

31—2. I. ater thorace antice pedibusque ferrugineis. *calculator.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Medius. Caput nigrum ore flauo. Thorax antice rufus, poſtice ſub ſcutello ſubtusque ni-

gër. Abdomen ſubpetiolatum, atrum
leo exſerto fere longitudine corporis.
rufi, poſtici atri tibiis baſi albis. Ala
linae ſtigmate atro.

Alium ecaudatum abdomine ſeſſili ex Itali
pi, an diſtinctus?

firmator. 135—6. I. ecaudatus ater abdominis ſeg
ſecundo tertioque rufis, ultimis apic
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura et magnitudo I. caſtigatoris. T
atrum ſub antennis punctis pallidis.
ater, immaculatus. Abdominis prim
mentum incuruum, atrum, 2. 3. f
nea, ultima margine albo. Pedes f
nei, poſtici nigri.

tripunctator. 135—6. I. ecaudatus ater thorace imma
abdomine punctis tribus albis.
Habitat in Gallia Dom. Coquebert.
Medius. Corpus atrum. Puncta duo
ſegmento ſecundo et unicum in quin
mora poſtica rufa.

exhauſtator. 138—9. I. niger abdomine rufo baſi apice
gro: aculeo recuruo falcato.
Habitat Kiliae Dom. Weber.
Paruus. Caput et thorax nigra, imma
mandibulis ſolis ferrugineis. Abdom
ue, petiolatum, apice compreſſum,
catum, rufum baſi apiceque nigrum.
leus longitudine abdominis recuruus,
tus, niger. Pedes ferruginei femoribu

preſſis. Alae obſcurae macula marginali atra.

7—8. I. ater abdominis ſegmento ſecundo maximo ferrugineo, pedibus rufis. *campanulator.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Caput, antennae, thorax nigra, immaculata. Abdomen nitidum, baſi apiceque attenuatum, nigrum ſegmento ſecundo maximo, campanulato, ferrugineo. Alae hyalinae puncto coſtali nigro. Pedes rufi.

2—3. I. ater abdomine depreſſo plano, pedibus rufis. *deprimator.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum, atrum, immaculatum. Abdomen ſingulare in hoc genere breue, depreſſum, planum. Alae obſcurae. Pedes omnes rufi.

62—3. I. ater abdomine piceo: aculeo falcato, pedibus rufis alis abbreuiatis. *emarciator.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Caput et thorax atra immaculata. Abdomen oblongum, piceum, nitidum aculeo longitudine abdominis, rigido, falcato. Alae breues at bene explicatae, obſcurae puncto magno coſtali nigro. Pedes rufi.

89—90. I. fuſco ferrugineoque varius abdomine clauato ferrugineo: lunulis lateralibus flauis nigro innatis. *clauatus.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Maximus in hoc genere. Antennae luteae. Caput et thorax ferrugineo fuſcoque varia.

Abdomen compreſſum, clauatum an
tuto ferrugineum lunula magna flaua
la nigra innata utrinque in ſingulo ſeg
primo toto flauo. Aculeus corpore lo
Pedes flaui.

ferrugineus. 189—90. I. fuluus abdominis ſegmentis
que puncto flauo.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Magnus. Caput fuluum mandibulis fl
tibusque nigris. Thorax fuluus line
bus dorſalibus, fere obſoletis, nigris
que ſub alis flauo. Abdomen petio
fuluum utrinque punctis 4—6 flauis.
leus niger longitudine abdominis.
bidae macula ordinaria flaua.

teſtaceus. 189—90. I. luteus abdomine ouato depr
ſtigmate luteo.

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Medius. Corpus totum luteum, immacu
Antennae paulio obſcuriores articulo
luteo. Alae hyalinae ſtigmate luteo.
domen ouatum, depreſſum ſegmentis
ctis. Aculeus breuiſſimus.

bidens. 203—4. I. ater abdominis ſegmentis ultim
gine albis, petiolo bidentato.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Medius. Antennae ferrugineae. Caput n
ſub antennis flauum macula magna, f
li, triangulari nigra. Thorax niger
maculatus. Abdomen petiolatum, ou
atrum ſegmentorum marginibus inpri

timis albis. Petiolus in medio denticulis duobus paruis, eleuatis. Pedes rufi plantis poſticis fuſcis. Alae hyalinae ſtigmate flauo.

5—6. I. flauus capitis vertice thorace ſub ſcutello aculeoque nigris, alis puncto marginali flauo. *ſtiſticus.*

Habitat Kiliae Weber.

Paruus. Antennae flauae, nigro annulatae. Caput flauum vertice nigro. Thorax flauus puncto eleuato marginis antici atro, ſub ſcutello niger. Abdomen ouatum, flauum aculeo breui, nigro. Alae hyalinae macula marginali, ordinaria, flaua. Pedes flaui.

7—8. I. ater abdominis petiolo ferrugineo, alis fuſcis: ſtriga media apiceque albis. *umbratus.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum I. cincti. Antennae ferrugineae. Caput nigrum. Thorax niger, ſub ſcutello ferrugineus. Abdomen atrum, nitidum petiolo toto ferrugineo. Aculeus exſertus longitudine abdominis. Alae fuſcae ſtriga media apiceque albis. Pedes nigri.

11—12. I. cyaneus abdomine baſi fuluo apice nigro. *ſplendens.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura praecedentium. Caput cyaneum, nitidum antennis nigris. Thorax cyaneus, immaculatus. Abdomen baſi fuluum, apice nigrum. Pedes nigri.

Ichneumones hi minores forte proprii generis at characterem eruere nondum valui.

ſtigmatizans. 212—13. I. thorace aeneo nitido, abdom[...]
uo: dorſo nigro.
Habitat in Galliae laruis Dom. Boſc.
Statura praecedentium. Caput viride, [...] ſub antennis flauum. Thorax viridis, [...] immaculatus. Abdomen ouatum, [...] dorſo nigro. Aculeus exſertus, niger [...] tudine corporis. Pedes flaui. Alae [...] puncto magno ſubcoſtali, nigro.

feſtiuus. 213—14. I. ater abdomine falcato: ſegmen[...] tio rufo.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Magnus in hac familia. Antennae om[...] liformes, nigrae. Caput et thorax atra [...] maculata. Abdomen breue, falcatum, [...] ce valde compreſſum, dilatatum, [...] ſegmento tertio rufo. Pedes ferrugine[...]

fulgens. 213—14. I. thorace cupreo poſtice viridi, [...] mine compreſſo atro; faſcia fulua.
Habitat in Galliae laruis. Muſ. Dom. Boſc.
Statura praecedentium. Caput cupreum [...] tennis breuibus, nigris: articulo prim[...] tus flaueſcente. Thorax cupreus, [...] poſtice viridis. Abdomen magnum, [...] preſſum, nigrum faſcia lata, flaua. [...] leus exſertus longitudine corporis. [...] rufi.

obſoletus. 218—19. I. niger capite viridi, abdomine [...] aeneo, alis albis: puncto fuſco.
Habitat in Italia Muſ. Dom. Boſc.

Paruus. Caput viride ſub antennis, nigrum. Antennae nigrae. Thorax niger, obſcurus. Abdomen nigro aeneum, nitidum aculeo longitudine abdominis. Alae albae puncto coſtali fuſco. Pedes flaui femoribus aeneis.

18–19. I. pallidus capitis thoracisque dorſo viridi aeneo alis macula transuerſa fuſca. *dorſalis.*

Habitat in Gallia Dom. Boſc.

Caput pallidum antennis nigris maculaque quadrata verticis viridi aenea. Thorax pallidus dorſo viridi aeneo, nitido. Abdomen compreſſum, pallidum dorſo obſcuro. Aculeus exſertus, niger. Alae albae macula magna, transuerſa, fuſca. Pedes pallidi.

18–19. I. nigro cyaneus thorace obſcure aeneo. *cyaneus.*

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Paruus. Caput et abdomen nigro cyanea, nitida. Thorax obſcure aeneus. Antennae breues, craſſae. Pedes atri.

120–1. I. obſcure aureus abdomine depreſſo cyaneo, alis apice fuſcis: macula faſciaque poſtica albis. *depreſſus.*

Habitat Pariſiis Dom. Boſc.

Paruus. Antennae capite concolores puncto apicis atro. Caput et thorax obſcure aurea, vix nitida. Abdomen depreſſum, cyaneum, nitidum. Alae albae, apice fuſcae puncto marginali magno faſciaque terminali albis. Pedes flaui.

120–1. I. viridi aeneus nitidus abdomine purpuraſcente: primo ſegmento aeneo. *purpuraſcens.*

Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

Paruus. Caput viride antennis nigris. Th
viridi aeneus, nitidus, immaculatus,
domen purpuraſcens ſegmento primo
no, viridi aeneo. Pedes flaui.

aleuarius. 232—3. I. flauus thorace poſtice abdomin
dorſo nigris.

Reaum. Inſ. 2. tab. 35. fig. 7.

Geoff. Inſ. 2. Ichn. 3.

Habitat in Galliae Phalaenae crataegatae l
Exiens net folliculos numeroſos, aggreg
albos, operculo clauſos.

Corpus paruum. Antennae ſetaceae, n
Caput et thorax flaua thorace poſtice
Abdomen flauum dorſo nigro. Alae hyal

verticillatus. 235—6. I. ater antennis verticillatis, alis al

Habitat in Germania.

Duplo maior I. pectinicorni. Antennae f
mes, nigrae articulo ſingulo pilis vert
to. Caput et thorax atra, immaculata.
domen ſubpetiolatum, breue, compr
adſcendens, atrum. Alae albae. Ped
gri, apice ferruginei.

feſtinans. 247. I. apterus niger pedibus cineraſcentibus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Minutus, totus niger pedibus ſolis cineraſ
tibus.

BANCHUS. *Palpi* quatuor elongati: articulis cylindricis.

Labium baſi cylindricum, corneum, apice membranaceum, rotundatum integrum.

Antennae ſetaceae.

B. niger abdomine ſubfalcato: baſi ſubtus incarnata, pedibus rufis. *venator.*

Ichneumon venator Ent. ſyſt. 2. 168. 143. Linn. ſyſt. nat. 2. 935. 36. Fn. Su. 1612.

Habitat in Europae nemoribus.

B. ater abdominis ſegmentis margine rufis, ſcutello eleuato uniſpinoſo. *haſtator.*

Ichneumon haſtator Ent. ſyſt. 2. 167. 141.*

Habitat in Europae hortis.

B. ater abdomine clauato fornicato immaculato, pedibus rufis. *fornicator.*

Ichneumon fornicator Ent. ſyſt. 2. 168. 144.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Banchi corpus medium, oblongum, glabrum, immarginatum, agile, capite exſerto, rotundato, transuerſo, oculis magnis, oblongis, lateralibus, ſubprominulis, antennis longiuſculis, approximatis, inter oculos inſertis: articulo primo clauato, vertice ſtemmatibus tribus, thorace eleuato, gibbo, ſcutello paruo, gibbo, abdomine vix petiolato, compreſſo; apice acuto abſque aculeo, alis abdomine breuioribus, pedibus curſoriis, tarſis quinque articulatis, colore vario,

variegator. 4. B. niger thorace variegato, abdomine preſſo clauato, ſegmentorum marginibus, ſcutello acuminato.

Ichneumon variegator Ent. ſyſt. 2. 173.

Habitat in Suecia.

compreſſus. 5. B. abdomine compreſſo: ſegmentorum nibus flauis, antennis pedibusque lute

Ichneumon compreſſus Ent. ſyſt. 2. 180. 19

varius. 6. B. luteus pectore atro vario.

Ichneumon varius Ent. ſyſt. 2. 181. 196.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

pictus. 7. B. niger flauo varius ſcutello ſubſpinoſo.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Simillimus omnino praecedenti, cuius va tem olim credidi. Antennae luteae. nigrum ſub antennis flauum: linea fr nigra. Orbita oculorum poſtice flaua. rax niger punctis duobus anticis, duobu alis, ſcutello valde acuminato, punctis bus ſub ſcutello paruis tribusque inferior majoribus: intermedio transuerſo Abdomen compreſſum nigrum: faſciis rimis flauis. Pedes flaui.

falcatorius, 8. B. ſcutello flauicante thorace variegato, mine ferrugineo baſi apiceque nigro.

Ichneumon falcatorius Ent. ſyſt. 2. 148. 59

Habitat Hafniae.

hiſtrio. 9. B. ſcutello flauicante, thorace variegato, mine rufo.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura praecedentis at minor. Antennae porrectae, nigrae. Caput nigrum, ſub antennis flauum. Thorax niger margine lineisque duabus dorſalibus baſi abbreuiatis, apice hamatis, flauis. Scutellum flauicans puncto nigro. Alae hyalinae. Abdomen compreſſum, rufum ano ſubfuſco. Pedes rufi.

OPHION. *Palpi* quatuor porrecti: articulis cylindricis.

Labium ouatum, membranaceum, integrum.

Antennae ſetaceae.

* *Antennis luteis.*

1\. O. luteus thorace ſtriato, *luteus.*
Ichneumon luteus Ent. ſyſt. 2. 178. 186, Linn. ſyſt. Nat. 2. 937. 55. Fn. Su. 1628.
Geoff. Inſ. 2. 330. 72.
Goed. Inſ. 2. tab. 37.
— — tab. 20. fig. 6.
Schaeff. Icon, tab. 1. fig. 12.

Ophionis corpus medium, elongatum, glabrum, immarginatum, agile, capite exſerto, rotundato, transuerſo, oculis magnis, ouatis, lateralibus, ſubprominulis, antennis longitudine corporis, approximatis, inter oculos inſertis: articulo primo craſſiuſculo, vertice ſtemmatibus tribus, thorace eleuato, gibbo, ſcutello paruo, ſubacuminato, abdomine elongato, petiolato, falcato, poſtice clauato, aculeo breuiſſimo, vix exſerto, alis quatuor planis, poſterioribus breuioribus, pedibus longiuſculis, curſoriis, tarſis quinque articulatis, colore vario.

Schaeff. Icon. tab. 29. fig. 16. 17.
Sulz. Inſ. tab. 18. fig. 118.
Habitat in Europae laruis.

ramidulus. 2. O. luteus abdomine apice nigro.
Ichneumon ramidulus Ent. ſyſt. 2. 17
Linn. Fn. Su. 1629.
Habitat in Germania Dom. Smidt.

flauus. 3. O. luteus vertice atro, abdomine apice
Ichneumon flauus Ent. ſyſt. 2. 179. 18
Habitat in Americae meridionalis Inſul
v. Rohr.

glaucopterus. 4. O. luteus pectore anoque nigris.
Ichneumon glaucopterus Ent. ſyſt. 2. 18
Linn. ſyſt. nat. 2. 938. 57. Fn. Su. 1
Schaeff. Icon. tab. 82. fig. 3.
Habitat in Europae hortis.

relictus. 5. O. obſcure ferrugineus abdomine nigro ferrugineo.
Habitat in America boreali Dom. v. Roh
Statura omnino O. circumflexi at alius v
Caput, thorax, antennae obſcure ferru
Abdomen falcatum, atrum, nitidum
ferrugineum. Alae breues, obſcurae
des ferruginei tibiis pollicis apice nigri

circumflexus. 6. O. niger abdomine antice flauo, pedibus
ſticis nigro geniculatis, ſcutello flauo.
Ichneumon circumflexus Ent. ſyſt. 2. 181.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 938. 59. Fn. Su. 16
Habitat in Europae nemoribus.

O. obſcurus thoracis dorſo luteo: lineis tribus abbreuiatis punctoque fuſcis, abdominis lateribus flauo maculatis. *obſcuratus.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura et magnitudo O. lutei. Antennae obſcure luteae. Caput flaueſcens, immaculatum. Thoracis dorſum flaueſcens lineis tribus latis, fuſcis, lateralibus antice abbreuiatis, intermedia poſtice punctoque terminata. Abdomen obſcurum maculis lateralibus flauis. Pedes obſcuri.

O. ater alis cyaneis. *morio.*
Ichneumon morio Ent. ſyſt. 2. 180. 194.
Habitat in America boreali Muſ. Dom. Banks.

O. niger abdominis ſegmento tertio quartoque rufis. *flauifrons.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Medius. Antennae ferrugineae. Caput nigrum ſub antennis flauum. Thorax niger puncto paruo callolo ad baſin alarum. Abdomen nigrum ſegmento tertio, quartoque rufis. Pedes rufi.

10. O. niger antennis pedibusque ferrugineis. *amictus.*
Ichneumon amictus Ent. ſyſt. 2. 181. 197.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.

* * *Antennis nigris.*

11. O. niger thorace ſubmaculato abdominis ſegmento ſecundo tertio quartoque rufis. *falcator.*
Ichneumon falcator Ent. ſyſt. 2. 174. 170.
Habitat in Suecia.

pugillator. 12. O. thorace immaculato, abdomine ru[illegible] apiceque nigro, pedibus tenuibus [illegible]gineis.

Ichneumon pugillator Ent. ſyſt. 2. 17[illegible] Linn. ſyſt. Nat. 2. 936. 50. Fn. Su. 16[illegible]

Geoff. Inſ. 2. 332. 24.

Degeer Inſ. 1. tab. 6. fig. 12.

Habitat in Bombyx Ziczac larva.

ſaltator. 13. O. ater abdomine breuiſſimo, pedibus [illegible]cis elongatis.

Ichneumon ſaltator Ent. ſyſt. 2. 175. 17[illegible]

Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.

erigator. 14. O. ater, thorace immaculato, abdomin[illegible]ui: ſegmento tertio pedibusque rufis.

Ichneumon erigator Ent. ſyſt. 2. 175. 17[illegible]

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

jocator. 15. O. niger thorace immaculato, abdomin[illegible] rugineo: petiolo ſegmento ſecundo m[illegible] tertio baſi nigris.

Ichneumon jocator Ent. ſyſt. 2. 175. 175.

Habitat Kiliae.

compenſator. 16. O. ater thorace immaculato, abdomine [illegible]uiſſimo: ſegmento ſecundo tertio quart[illegible] rufis.

Ichneumon compenſator Ent. ſyſt. 2. 176. 1[illegible]

Habitat in Germania Dom. Smidt.

mercator. 17. O. ater thorace immaculato, abdomine [illegible]ui: ſegmento ſecundo apice tertio toto [illegible]toque baſi flauis.

Ichneumon mercator Ent. ſyſt. 176. 177.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

O. ater thorace immaculato, abdomine breui, ſegmento ſecundo tertioque nigris, pedibus rufis: femoribus poſticis nigris. *flagellator.*

Ichneumon flagellator Ent. ſyſt. 2. 176. 178.

Habitat Kiliae.

O. niger thorace maculato abdomine falcato rufo; petiolo nigro, fronte plantisque poſticis flauis. *cunctator.*

Ichneumon cunctator Ent. ſyſt. 2. 176. 179.

Habitat Kiliae.

O. ater abdomine compreſſo acutiſſimo ferrugineo, ſcutello acuminato. *cultellator.*

Ichneumon cultellator Ent. ſyſt. 2. 167. 142.

Ichneumon leucoſpoides Act. Berol. 6. 345. tab. 8. fig. 5. 6.

Habitat in Germaniae Pino. Dom. de Loewenſkiold.

O. nigro ferrugineoque varius abdomine atro, alis abbreuiatis. *foliator.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Paruus. Caput et thorax nigro obſcureque ferrugineo varia. Abdomen falcatum, atrum, nitidum aculeo breuiſſimo, exſerto. Alae abbreuiatae, hyalinae. Pedes ferruginei femoribus baſi nigris.

FOENUS. *Palpi* breues: artic[ulis cy]lindricis.
Labium breue, m[embra]naceum, transuer[ſum].
Antennae filiformes.

jaculator. 1. F. niger abdomine falcato medio ruf[o, tibiis] poſticis clauatis baſi apiceque albis.
Ichneumon jaculator Ent. ſyſt. 2. 177. 18[?]. ſyſt. Nat. 2. 937. 52. Fn. Su. 1626.
Geoff. Inſ. 2. 328. 16.
Degeer Inſ. 1. tab. 36. fig. 10.
Reaum. Inſ. 4. tab. 10. fig. 14.
Habitat in Apum Sphegumque laruis.

aſſectator. 2. F. niger abdomine falcato: maculis tr[i]... teralibus rufis, tibiis poſticis clauat[is].
Ichneumon aſſectator Ent. ſyſt. 2. 178. 18[?]. ſyſt. Nat. 2. 937. 35. Fn. Su. 1627.
Geoff. Inſ. 2. 329. 17.
Habitat in Europae hortis.

Foeni corpus elongatum, glabrum, inaur... agile, capite ouato, inſidente collo elongato, ... to, oculis magnis, oblongis ſubprominulis, ... bus, ſtemmatibus tribus verticalibus, anten[nis] ... bus cylindricis: articulo primo diſtincto, th... uato, gibbo, pectore antice in collum p... tello lato, transuerſo, abdomine petiolato, ... incuruo, clauato, ſub ſcutello inſerto, acule[o] ... longitudine abdominis, alis quatuor breuibus, pedibus curſoriis, tibiis poſticis compreſſis, tarſis quinque articulatis.

EVANIA. *Palpi* poſtici incurui: articulo tertio quadrato.
Labium corneum, apice membranaceum, integrum.
Antennae ſetaceae.

3. E. nigra albo maculata abdomine rufo apice nigro: maculis tribus albis. *variegata.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura omnino E. maculatae. Antennae nigrae. Caput nigrum, ſub antennis album macula media nigra. Thorax niger margine antico in medio interrupto ſcutelloque albis. Abdomen breue, ſeſſile, baſi rufum, apice nigrum lunulis duabus pone medium maculaque anali albis. Pedes rufi geniculis nigris.

3. E. nigra albo varia abdominis ſegmentis margine flauis. *hiſtrio.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura omnino praecedentium. Antennae nigrae ſubtus ferrugineae. Caput nigrum, ſub antennis album. Thorax niger margine antico, maculis duabus utrinque ſub margine, ſcutello, puncto ſub ſcutello albis. Abdomen nigrum ſegmentorum marginibus albis. Pedes rufi.

4. E. atra thorace rufo, abdominis ſegmentis margine albis. *ruficollis.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Parua. Caput nigrum orbita oculorum
Thorax rufus pectore nigro. Ab
atrum, nitidum ſegmentorum mar
albis: primo interrupto. Pedes ruf
ſtici nigri.

cincta. 3—4. E. nigra abdominis faſcia media ciner
Habitat in Mogador Dom. Schousboe.
Statura parua praecedentium. Caput
rax nigra, immaculata. Abdomen
cylindricum faſcia media cineraſcente
des nigri.

petiolata. 5—6. E. flaueſcens abdomine petiolato b
mo dorſo impoſito atro.
Habitat in Americae Inſulis Muſ. Dom. L
Statura et magnitudo E. minutae. An
nigrae. Caput flaueſcens, cinereo p
ceus. Thorax flaueſcens ſcutello atro.
domen petiolatum, compreſſum, bre
mum, atrum petiolo elongato, flauo.
des flaui geniculis nigris.

CHALCIS. *Palpi* aequales.
Antennae breues, cyli
cae, fere fuſiformes
ticulo primo ſubcrat

conica. 1—2. C. atra abdomine conico acutiſſimo,
moribus poſticis incraſſatis: linea dorſali
Habitat Cajennae in nido Veſpae nidulantis
uti videtur eius laruis victitat. Figura
aum. Inſ. 6. tab. 20 — 24. ſub nomine Ab

cartonniere cum hac convenit, nec Veſpam repreſentat.

Magna in hoc genere. Caput atrum orbita oculorum albicante. Thorax ater, immaculatus. Abdomen elongatum, conicum, parum, compreſſum, acutum, nigrum. Femora poſtica incraſſata, compreſſa, atra linea dorſali alba. Tibiae incuruae, albae.

C. thorace nigro: lineolis ſcutelloque flauis, femoribus poſticis flauis nigro maculatis. ***nigricornis.***

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura omnino C. maculatae. Caput flauum vertice antennisque nigris. Thorax niger margine antico lineolis quatuor obliquis: lateralibus interruptis, flauis. Scutellum flauum linea abbreuiata nigra. Abdomen breue petiolatum, flauum faſcia media anoque ferrugineis. Pedes flaui femoribus poſticis incraſſatis, dentatis utrinque maculis duabus nigris.

SPHEX. *Os* lingua porrecta, trifida.
Labium emarginatum, ſeta inſtructum.
Antennae filiformes.

S. glabra atra thorace ſub alis maculis duobus argenteis, abdominis petiolo biarticulato. ***binodis.***

Habitat Cajennae Muſ. Dom. Boſc.

Statura S. ſabuloſae at paullo minor. Caput atrum, immaculatum. Thorax laeuis, ater

maculis utrinque duabus ſub alis. Ab-
nis petiolus elongatus, biarticulatus,
Abdomen paruum, ouatum, paullo
nitidum. Alae breues, obſcurae.

hemiptera. 11—12. S. villoſa nigra abdominis petiolo
gato, uniarticulato, alis breuibus obſ
Habitat in Isle de France Muſ. Dom. Boſ
Magnitudo fere S. ſabuloſae. Caput et
villoſa, nigra, obſcura. Abdominis
lus abdomine fere longior, cylindricus
articulatus. Abdomen ouatum, imm
tum. Alae vix petiolo longiores, ob
ferrugineo parum nitentes. Pedes n

atra. 18—9. S. atra labio argenteo villoſo, alis
minis longitudine.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Differt manifeſta S. ſigulo. Caput nig
bio pube argentea nitido. Thorax
Abdomen atrum, nitidum, immacu
petiolo longiori, incuruo. Alae ob
abdominis longitudine. Pedes nigri.

cruenta. 54—5. S. atra thorace rufo, abdomine
duabus albis.
Habitat in Gallia Dom. Boſc.
Statura parua S. ſanguinolentae. Caput ni
orbita oculorum alba. Thorax rufus
ſcutellari, antice bifida nigra. Abd
atrum, nitidum ſegmento ſecundo et
to apice ſtriga albida. Pedes nigri. Al
bidae.

8—9. S. coerulea alis totis obſcure rufis. *heros.*
Habitat in America meridionali Muſ. Dom. Boſc.

Maxima in hoc genere. Antennae fuſcae: articulo primo cyaneo. Corpus totum coeruleum, immaculatum. Alae magnae, obſcure ferrugineae. Pedes nigri tibiis poſticis ſerratis.

9—90. S. coerulea alis cyaneis apice albis. *groſſa.*
Habitat in India.

Affinis S. coeruleae eiusdemque magnitudinis et ſtaturae. Antennae porrectae, nigrae. Corpus coeruleum, nitidum. Alae cyaneae, omnes apice albae. Pedes nigri.

89—90. S. atra capite thoracis antico abdominisque ſegmentis baſi flauis, alis ferrugineis apice atris. *annulata.*
Habitat in Italia Muſ. Dom. Boſc.

Magna. Caput cum antennis ferrugineum, immaculatum. Thorax niger lobo antico dorſoque obſcure ferrugineis. Abdomen atrum nitidum ſegmentis 2. 3. 4. 5. baſi late flauis. Pedes flaui femoribus baſi nigris. Alae ferrugineae apice nigrae.

POMPILUS. *Maxilla* bifida.
Labium breue, corne
integrum.
Antennae ſetaceae.

analis. 1. P. glaber ater abdomine apice ferrugineo,
albis.
Sphex analis Ent. ſyſt. 2. 209. 42.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Bank

ſimilis. 2. P. glaber ater abdomine apice ferrugineo
nigris.
Sphex ſimilis Ent. ſyſt. 2. 209. 43.
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. D. B

fuſcus. 3. P. glaber ater abdomine baſi ferrugineo.
Sphex fuſca Ent. ſyſt. 2. 210. 46. Linn.
Nat. 2. 944. 16. Fn. Su. 1652.
Geoff. Inſ. 2. 254. 74.
Degeer Inſ. 2. 2. 147. tab. 28. fig. 6.
Goed. Inſ. 1. tab. 58.
Habitat in Europae ſabuletis laruas attrah
ſepeliens.

viaticus. 4. P. pubeſcens niger alis fuſcis, abdomine
ce ferrugineo: cingulis nigris.

Pompili corpus oblongum, immarginatum, capite exſerto, rotundato, transuerſo, thorace la oculis magnis, oblongis, lateralibus, antennis ximatis, ſupra os inſertis: articulo primo cr thorace ouato, planiuſculo, ſcutello vix ullo. ab ne ouato, ſeſſili, alis inaequalibus, pedibus tenu elongatis, tarſis quinquearticulatis, colore vario.

Genus Sphegibus nimis affine.

Sphex viatica Ent. ſyſt. 2. 210. 47. Linn. ſyſt. Nat. 2. 943. 15. Fn. Su. 1651.
Degeer Inſ. 2. 2. 153. 6. tab. 28. fig. 16.
Friſh. Inſ. 2. tab. 1. fig. 13.
Habitat in Europae ſabuletis laruas ouo impoſito ſepeliens.

P. hirtus ater abdominis ſegmento ſecundo ferrugineo, alis atris. *urſus.*
Sphex urſus Ent. ſyſt. 2. 210. 48.
Habitat — — Dom. Lund.

P. cyaneus antennis pedibusque nigris. *amethyſtinus.*
Sphex amethyſtina Ent. ſyſt. 2. 210. 49.
Habitat in Inſula St. Crucis Dr. Pflug.

P. niger fronte thoracis ſtriga antica abdominisque ſegmentorum marginibus cinereis. *cingulatus.*
Sphex cingulata Ent. ſyſt. 2. 210. 50.
Habitat in noua Hollandia Muſ. Dom. Banks.

P. niger abdomine ſegmentorum marginibus lucidis. *niger.*
Sphex nigra Ent. ſyſt. 2. 211. 51.
Habitat in Europae ſabuletis.

P. niger abdomine ſegmentorum marginibus cinereis, alis teſtaceis apice fuſcis. *labiatus.*
Sphex labiata Ent. ſyſt. 2. 211. 52.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dr. Pflug.

P. ater albo maculatus thorace ſub ſcutello rufo, alis apice fuſcis. *variegatus.*
Sphex variegata Ent. ſyſt. 2. 211. 53.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

P. niger femoribus poſticis rufis. *maurus.*

Sphex maura Ent. ſyſt. 2. 212. 55.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

mixtus. 12. P. niger flauo varius abdomine flauo: tribus nigris.

Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Rohr.

Medius. Antennae rufae, apice nigrae. put nigrum orbita oculorum, ore lin frontali flauis. Thorax niger margin co ſub alas extenſo lineolis duabus dorſ ſcutello maculisque ſub ſcutello flauis. domen ſeſſile flauum faſciis quatuor gris. Pedes flaui. Alae anticae ſubte

hyalinatus. 13. P. ater femoribus quatuor poſticis rufis hyalinis.

Sphex hyalinata Ent. ſyſt. 2. 212. 56.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

fuſcatus. 14. P. ater abdomine utrinque puncto tran albo, femoribus poſticis rufis, alis fuſcis.

Sphex fuſcata Ent. ſyſt. 2. 212. 57.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

6punctatus. 15 P. ater punctis duobus ſub ſcutello qu abdominis albis alis apice fuſcis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino P. fuſcati. Caput rotund immaculatum. Thorax compreſſus, ſub ſcutello punctis duobus albis. Abd atrum, nitidum punctorum duobus pa albis. Alae albidae apice fuſcae. Pede

bifaſciatus. 16. P. ater immaculatus alis albis: faſciis d nigris.

Sphex biſaſciata Ent. ſyſt. 2. 212. 58.
Geoff. Inſ. 2. 337. 37.
Habitat in agro Pariſino Dom. Boſc.

P. niger abdomine ferrugineo apice fuſco, *gibbus.* alis anticis apice fuſcis.
Sphex gibba Ent. ſyſt. 2. 212. 59. Linn. ſyſt. Nat. 2. 946. 33. Fn. Su. 1658. Scop. carn. 570.
Habitat in Europae ſyluis.

8. P. ater thorace ſtriga abdominis ſegmento *2guttatus.* tertio punctis duobus baſeos albis.
Habitat in America ſeptentrionali Muſ. Dom. Boſc.
Paruus. Caput cum antennis atrum. Thorax ater ſtriga antica impreſſa, cinerea. Abdomen atrum ſegmento tertio utrinque puncto baſeos albo. Pedes nigri.

9. P. cinereo pubeſcens abdominis ſegmentis baſi *pulcher.* atris, alis albis apice nigris.
Habitat in Italia Muſ. Dom. Boſc.
Paruus cinereo pubeſcens antennis nigris. Thorax immaculatus. Abdominis ſegmenta baſi atra apice cinerea pubeſcentia. Alae albae, apice nigrae.

10. P. niger antennis rufis, alis albis: faſciis dua- *faſciatus.* bus fuſcis.
Sphex faſciata Ent. ſyſt. 2. 213. 60.
Habitat in noua Hollandia Muſ. Dom. Banks.

11. P. niger abdominis ſegmento ſecundo tertio- *lunicornis.* que rufis, antennarum ultimo articulo lunato.

Habitat in Gallia Dom. Cuvier.

Minutus. Antennae ſingulares, nigra-ceae articulo ultimo arcuato. Caput-rax nigra, immaculata. Abdomen a-nitidum ſegmentis duobus rufis. Pe-gri. Alae hyalinae.

cinereus. 22. P. cinereus abdominis ſegmentis baſi at-ce fuſcis.

Sphex cinerea Ent. ſyſt. 2. 213. 61.

Habitat in noua Hollandia Muſ. Dom. B-

tropicus. 23. P. niger abdominis ſegmento ſecundo-ginco.

Sphex tropica Ent. ſyſt. 2. 213. 62. Linn. nat. 2. 945. 27. Muſ. Lud. Ulr. 408.

Habitat in America.

fugax. 24. P. thorace tomentoſo aureo, abdomine-rugineo, alis flaueſcentibus: faſcia fuſ-

Sphex fugax Ent. ſyſt. 2. 213. 63.

Habitat in noua Zelandia Muſ. Dom. Banks

auratus. 25. P. capite thoraceque tomentoſo aureis, ab-mine nigro: ſegmentorum marginibus-nereis.

Sphex aurata Ent. ſyſt. 2. 213. 64.

Habitat in India orientali Dom. de Schlanbu-

nitidus. 26. P. ferrugineus thorace poſtice aureo, flaueſcentibus.

Sphex nitida Ent. ſyſt. 2. 214. 65.

Habitat in noua Hollandia Muſ. Dom. Ban-

rufipes. 27. P. ater abdominis ſegmentis utrinque pu-albo, alis apice fuſcis.

Sphex rufipes Ent. ſyſt. 2. 214. 66. Linn. ſyſt. Nat. 2. 945. 29. Fn. Su. 1659.
Habitat in Europae ſabuletis.

P. glaber ater abdomine punctis duobus faſciaque poſtica albis, alis apice fuſcis. *2punctatus.*
Sphex 2punctata Ent. ſyſt. 2. 214. 67.
Habitat in Europa.

P. ater capite thoraceque rufis. *nigricornis.*
Sphex nigricornis Ent. ſyſt. 2. 214. 68.
Habitat in noua Hollandia Muſ. Dom. Banks.

P. niger alis apice fuſcis: puncto albo. *hircana.*
Habitat in Gallia Dom. Cuvier.
Nimis affinis P. exaltati et forte mera varietas. Differt tantum corpore toto atro, immaculato. Alae albae faſcia media apiceque fuſcis et in hac apice punctum magnum album.

1. P. niger abdomine rufo apice atro, alis apice fuſcis: puncto albo. *exaltatus.*
Sphex exaltata Ent. ſyſt. 2. 214. 69.
Habitat in Europae ſabuloſis.

2. P. ater thorace albo maculato, abdominis ſegmento primo rufo, reliquis utrinque linea transuerſa alba. *maculatus.*
Sphex maculata Ent. ſyſt. 2. 215. 70.
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

3. P. niger abdomine utrinque lunulis argenteo ſericeis: baſi rufo, apice nigro. *tricolor.*
Sphex tricolor Ent. ſyſt. 2. 215. 71.
Habitat in Barbaria Muſ. Dom. Desfontaines.

guttatus. 34. P. glaber ater thorace albo maculato,
mine rufo: punctis transuerſis albis
apicem nigro.
Sphex guttata Ent. ſyſt. 2. 215. 72.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

nigripes. 35. P. niger abdomine ferrugineo, alis ob
pedibus nigris.
Sphex nigripes Ent. ſyſt. 2. 216. 77.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lu

hirtus. 36. P. ater abdomine villoſo teſtaceo, alis c
Habitat in India orientali Dom. Daldorf
Affinis certe P. villoſi at duplo fere maior
pus atrum, immaculatum abdomine
teſtaceo. Alae cyaneae.

villoſus. 37. P. niger abdomine villoſo teſtaceo, alis
Sphex villoſa Ent. ſyſt. 2. 216. 78.
Habitat ad littora malabarica Dr. Koenig.

LARRA. *Maxilla* breuis, cornea,
nicata.
Labium exſertum, apice m
branaceum, emarginat
Antennae filiformes.

2faſciata. 5—6. L. atra abdomine faſciis duabus fuluis
nigris apice albis.
Habitat in Tangier Dom. Schousboe Muſ. D
Lund.
Statura omnino L. ichneumoniformis. C
et thorax atra, immaculata. Abdo
atrum, nitidum ſegmento ſecundo tertio

faſcia dorſali late fuluis: Alae nigrae, apice albae. Pedes nigri.

7. L. flaua thorace nigro lineato, abdomine faſciato. *cingulata.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Media. Labium flauum argenteo pubeſcens. Antennae ferrugineae. Thorax obſcurior lineis tribus abbreuiatis, nigris. Scutellum flauum ſtriga nigra. Abdomen flauum faſciis ſex nigris. Alae albidae macula magna coſtali ante apicem fuſca. Pedes flaui.

8. L. nigra capite thoracis antico anoque fuluis, alis ante apicem late atris. *faſciata.*

Habitat Tranquebariae D. Daldorff Muſ. D. de Scheſtedt.

Statura et magnitudo praecedentis. Caput cum antennis ferrugineum. Thorax antice fuluus, poſtice niger. Abdomen atrum ultimis ſegmentis fuluis. Alae albae, nitidae ante apicem late atris apice tamen albo. Pedes fului.

Variat obſcurior capite thoracis antico anoque fuſcis nullo modo diſtincta.

TIPHIA. *Maxilla* membranacea
tundata.
Labium breue, corn
tridentatum, medio
pigerum.
Antennae filiformes.

glabrata. 1—2. T. glabra atra antennis baſi pedibusq
rugineis.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura omnino T. femoratae at duplo m
Antennae nigrae, baſi rufeſcentes. C
atrum, glabrum, immaculatum. Pedes
ſi femoribus angulatis.

hemiptera. 1—2. T. glabra atra alis breuiſſimis.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura parua praecedentis tota atra. Alae b
uiſſimae et fere tantum rudimentum alar

mixta. 10—11. T. hirta ferrugineo flauoque varia,
rum coſta ferruginea apice nigra.
Habitat Tranquebariae Dom. Lund.
Media. Antennae ferrugineae. Mandibul
ferrugineae, apice nigrae. Caput flau
oculis magnis reniformibus nigris. Tho
hirtus, ferrugineus lobo antico ſcutelloq
flauis. Abdomen ferrugineum ſegmento
4. ſupra flauis margine lineaque dorſali f
rugineis. Alae obſcurae anticarum coſta f
ruginea apice nigra. Pedes ferruginei.

thoracica. 15—16. T. atra thorace cinereo villoſo, alis c
aneis.

Habitat ad littora malabarica.
Affinis certe T. collari cuius varietatem olim credidi. Differt tamen capite toto atro, thorace toto cinereo villoſo alisque anticis totis cyaneis.

SCOLIA. *Os* lingua inflexa, trifida.
Labium porrectum, apice membranaceum, integrum medio palpigerum.
Antennae filiformes.

6—17. S. hirta nigra abdomine faſciis quatuor flauis, ano tridentato. *4faſciata.*
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Nimis affinis S. radula. Differt tantum ano tridentato alias ſimillima.

16—17. S. hirta atra abdomine faſciis duabus flauis, alis ferrugineis apice cyaneis, capite ferrugineo. *erythrocephala.*
Habitat in Europa auſtrali Dom. Lund.
Diſtincta omnino a S. hortorum. Caput cum antennis ferrugineum. Thorax hirtus, obſcure ferrugineus fere niger. Abdomen atrum faſciis duabus dorſalibus flauis: anteriore maiore, integra, poſteriore ſubinterrupta. Corpus atrum.

24—5. S. atra abdomine faſciis duabus flauis: anteriore utrinque puncto atro. *notata.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Statura omnino S. cinctae at diſtincta videtur. Caput atrum maculis tribus frontalibus fla-

uis: lateralibus lunatis. Thorax imm
tus. Abdomen atrum ſupra faſciis
latis, aequalibus, flauis: anteriore
puncto atro notata. Pone faſcias pr
par punctorum paruorum, flauorum
cyaneae. Pedes atri.

hiſtrionica. 35—6. S. flauo ferrugineoque varia alis m
coſtali apicis fuſca.

Habitat Tranquebariae Muſ. D. de Seh
Media. Antennae breues, incuruae,
neae. Caput flauum linea transuerſa
cali ferruginea et in hac ſtemmata
naria. Thorax ferrugineus lobo anti
que flauo. Abdominis ſegmentum pr
ferrugineum, immaculatum, 2 flauum
que puncto paruo apiceque ferrugine
flauis baſi apiceque lineaque dorſali fe
neis, reliqua ferruginea pilis aureis.
ſubferrugineae, nitidae macula magna
li verſus apicem fuſca. Pedes ferru
femoribus compreſſis, poſticis apice p
dilatatis.

voluulus. 38. S. nigra cinereo hirta thorace flauo macu
abdomine faſciis ſex flauis.

Habitat Tangier Dom. Schousboe Muſ. D.
de Seheſtedt.

Statura et magnitudo omnino S. cylind
Antennae cylindricae, porrectae,
Caput nigrum, cinereo tomentoſum.
rax cinereo tomentoſus antice faſciis du
flauis. Abdomen cylindricum, atrum

ciis ſex flauis aculeo paruo, recuruo. Alae abdomine breuiores, albidae.

9. S. hirta nigra abdominis ſegmentis apice coeruleis, antennis apice cochleatis. *cochleata.*

Habitat in Guinea Dom. Iſert Muſ. Dom. Lund.

Animalculum ſingulare huius generis videtur. Caput fuſcum, cinereo pubeſcens antennis filiformibus: articulo primo longiore, ante apicem tenuiſſimis, petiolatis, apice dilatatis, rotundatis, depreſſis. Thorax fuſcus, immaculatus. Abdominis ſegmenta baſi atra, apice coerulea. Alae obſcurae. Pedes fuſci, poſtici femoribus breuibus, incraſſatis, tibiis incuruis, vix longioribus, apice parum dilatatis.

CHRYSIS. *Labium* porrectum, maxilla lineari multo longius, apice membranaceum, emarginatum.

Antennae filiformes.

5. C. coerulea nitida ſcutello abdomineque aureis, ano coeruleo. *ſcutellaris.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Affinis videtur C. calens. Caput coeruleum antennis nigris. Thorax coeruleus, viridi nitens ſcutello aureo et ſub-ſcutello viridi nitens. Abdomen aureum, nitidum ano coeruleo, vix dentato. Pedes coerulei.

10. C. glabra nitida auro purpurea antennis thoracisque poſtico nigris. *coeruleſcens.*

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Statura et magnitudo C. ignitae. Caput,
rax, abdomen auro purpurea, nitida,
tennae totae nigrae. Thorax ſub ſcutell
ger. Pectus pedesque coerulea, nitida

maculata. 12—13. C. glabra viridis, nitida occipite
abdomine maculis dorſalibus atris, ano
tegro.

Habitat in Americae Inſulis Muſ. Dom. Boſ

Statura et magnitudo C. auratae. Caput
de aeneum, nitidum occipite faſcia
Antennae nigrae. Thorax viridis
antica coeruleſcente. Abdomen aene
macula magna ad baſin ſinguli ſegment

dimidiata. 15—16. C. glabra viridis nitens thorace abd
nisque ſegmentis duobus anticis aureis,
quadridentato.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Caput viride, nitens antennis maculaque
ticis nigris. Thorax aureus pectore
Abdomen aureum ano quadridentato,

ſexdentata. 20—1. C. glabra viridis nitida abdominis
mentis baſi cyaneis, ano ſexdentato.

Parua. Caput viride antennis nigris. Th
viridis, immaculatus. Abdomen viride
mentis baſi cyaneis. Anus ſex dentatus

LEUCOSPIS. *Palpi* breues, aequales.
Labium maxilla longius, emarginatum.
Antennae extrorſum craſſiores.

1. L. abdomine ſubpetiolato corpore atro cinereo pubeſcente. ***atra.***

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Caput nigrum, cinereo pubeſcens. Thorax eleuatus, punctatus, niger, cinereo ſubpubeſcens ſtrigis duabus anticis tenuiſſimis, teſtaceis. Abdomen nigrum ſegmento primo cylindrico, quaſi petiolo, reliquis compreſſis aculeo in canali dorſali recondendo. Pedes nigri femoribus poſticis incraſſatis, ſubtus dentatis.

BEMBEX. *Os* lingua inflexa, quinquefida.
Labium ſuperius porrectum, os obtegens.
Antennae filiformes.

6. B. labio conico flauo nigra abdominis ſegmentis apice glaucis. ***labiata.***

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Paullo minor B. glaucae. Antennae nigrae articulo primo ſubtus flauo. Labium magnum, porrectum, flauum. Caput et thorax nigra, cinereo villoſa. Abdomen nigrum ſeg-

mentorum marginibus glaucis. Alae
linae.

ſpinoſa. 9—10. B. labio conico nigra thorace mac
poſtice utrinque unidendato, abdomin
gis ſex interruptis flauis.

Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Rohr
Media. Antennae nigrae articulo primo
tus flauo. Caput nigrum labio conico
Thorax niger margine antico, linea lat
lineolis duabus dorſalibus punctis du
ſub alis, punctis duobus lineolisque du
transuerſis loco ſcutelli flauis poſtice u
que excurrit in dentem validum, fla
Abdomen glabrum, atrum, nitidum
ſex, in medio late interruptis, flauis. P
flaui femoribus nigris.

VESPA. *Labium* porrectum, ma
longius, emarginatum,
trinque ſeta inſtructum
Antennae extrorſum cr
res.

labiata. 18—19. V. nigra thoracis margine antico
abdomine atro: ſegmentorum marg
albis.

Habitat Tangier Dom. Schousboe.
Paullo minor V. maculatae. Antennae n
articulo primo ſubtus albo. Caput nig
labio, mandibulis maculaque inter ant
albis. Thorax niger margine antico in

dio interrupto albo. Abdomen atrum, nitidum ſegmentorum marginibus albis. Alae plicatae, obſcurae. Pedes flaueſcentes femoribus baſi nigris.

3. V. brunnea abdominis ſegmento ſecundo tertioque baſi atris, alis apice nigris. *carnatica.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Corpus magnum, brunneum, immaculatum abdominis ſegmento ſecundo tertioque baſi atris. Alae plicatae, brunneae, apice nigrae.

1. V. teſtacea abdominis ultimis ſegmentis nigris. *analis.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo V. marginalis. Antennae ferrugineae. Caput et thorax teſtacea, flauo parum mixta. Abdominis ſegmentum ſecundum magis obſcurum margine nigro. Reliqua nigra. Alae pedesque teſtacea.

1. V. obſcure ferruginea thorace ſubſcutello flauo lineato, abdominis ſegmento ſecundo punctis duobus flauis. *myops.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Media. Antennae ferrugineae, in medio nigrae. Caput et thorax obſcure ferruginea, immaculata et ſub ſcutello niger ſtriga lineisque duabus flauis. Abdomen ouatum, ferrugineum primo ſecundoque ſegmentis obſcurioribus et in hoc puncta duo flaueſcentia. Alae obſcure ferrugineae. Pedes ferruginei femoribus nigris.

Neſtor. 42—3. V. fuſca fronte flaua, abdomine fer[...] neo: ſegmentis baſi macula nigra ma[...] que flauo.

Habitat in America boreali Dom. v. Roh[...]

Paullo maior V. marginali. Antennae n[...] ſubtus ferrugineae. Caput fuſcum [...] oreque late flauis. Thorax fuſcus ma[...] antico tenuiſſime lineolis duabus an[...] liquis lineolisque duabus abbreuiatis ſub[...] tello flauis. Scutellum ferrugineum. [...] domen ferrugineum ſegmento ſingulo [...] la baſeos nigra margineque flauo. Al[...] rugineae. Pedes ferruginei.

nitidula. 44—5. V. atra argento nitida thoracis angul[...] ſtico utrinque dilatato argenteo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus V. atrata paullo maius, totum a[...] argento certo ſitu nitidulum. Thorax [...] ctatus poſtice ſub alis angulo utrinque d[...] to, argenteo, nitido. Scutellum em[...] natum. Alae cyaneae.

atrata. 44—5. V. atra labio albo, alis hyalinis.

Habitat in Americae meridionalis inſulis D[...] Lund.

Media, tota atra, immaculata. Labium [...] albo argenteis tectum. Alae hyalinae.

minuta. 65—6. V. atra labio thoracis punctis duob[...] ticis abdominisque faſciis duabus flauis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus minutum. Antennae nigrae. [...] nigrum labio eleuato, flauo. Thorax [...]

punctis duobus marginis antici punctoque paruo calloſo ante alas flauis. Abdomen glabrum, atrum ſtrigis duabus flauis. Pedes variegati.

6—7. V. nigra antennis ano pedibusque rufis, alis cyaneis baſi apiceque albis. *aſſimilis.*

Sphex aſſimilis Ent. ſyſt. 2. 209. 44.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

8—9. V. ferruginea abdomine ſtriga baſeos faſciaque media flauis, alis apice macula nigra. *Tamula.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et ſumma affinitas V. flaueſcentis. Differt tantum abdominis ſegmento primo apice tertio apice quartoque baſi flauis.

6—7. V. nigra abdominis petiolo clauato, alis cyaneis. *coeruleopennis.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Praecedentibus minor. Corpus totum atrum alis ſolis cyaneis. Abdominis petiolus breuis, clauatus.

8—9. V. ferruginea abdomine atro: ano ferrugineo. *diadema.*

Habitat Cajennae.

Specimen mihi mutilatum. Corpus magnum. Caput ferrugineum vertice nigro: ſtriga ferruginea. Thorax ferrugineus linea punctisque duobus dorſalibus nigris. Petiolus elongatus, incuruus, niger, apice parum ferrugineus. Abdomen ouatum, atrum ano late ferrugineo. Alae deſunt. Pedes ferruginei.

morio. 98—9. V. atra immaculata abdominis petioli
uato, alarum coſta nigra.
Habitat Cajennae in nido obconico, pap
ceo, rudiore, griſeo, truncato: or
paruo, laterali Dom. Cuvier. Corpus
uum, totum atrum, immaculatum tib
lis parum cineraſcentibus. Alarum co
te nigra.

binodis. 100—1. V. atra abdominis petiolo biartic
ſegmentis ſtriga tenuiſſima teſtacea.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Boſc.
Parua. Caput, antennae, thorax, pedes
immaculata. Abdomen petiolo biartic
primo clauato, ſecundo baſin ſecund
menti efficiens, tenuiſſimo, atrum ſin
ſegmento ante marginem ſtriga tenui
teſtacea. Alae obſcurae.

reiecta. 100—1. V. nigra abdominis ferruginei pe
clauato nigro.
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Parua. Caput nigrum. Thorax niger m
ne lobi antici flauo. Abdomen ferru
um petiolo breui, clauato, nigro. Alae
rugineae, apice fuſcae. Pedes nigri.

atrophica. 101—2. V. atra abdominis petiolo ſegment
primo apice flauis.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Lun
Parua. Caput nigrum puncto paruo inter
tennas flauo. Thorax niger margine an
ſcutellique linea transuerſa flauis. Abd
nis petiolus elongatus, incuruus, apic

uus. Segmentum primum maius, atrum, apice flauum, reliqua breuiſſima, nigra. Pedes nigri.

3. V. flaueſcens thoracis dorſo nigro: lineis duabus flauis. *cajennenſis.*

Habitat Cajennae Dom. Boſc.

Parua. Caput flauum antennis ferrugineis. Mandibulae apice nigrae. Thorax flauus dorſo nigro: lineis duabus, quae tamen margines haud attingunt flauis. Abdomen flaueſcens. Alae obſcurae.

MELLINUS. *Palpi* elongati: articulis cylindricis.

Labium ouatum longitudine maxillae, ſub apice palpigerum.

Antennae cylindricae: articulo primo longiori.

2. M. niger thorace maculato, abdomine atro: utrinque macula transuerſa cineraſcente. *2punctatus.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum. Caput nigrum utrinque ſub antennis macula angulata, flaua. Thorax niger margine antico punctoque ſub alis flauis. Abdomen atrum, nitidum utrinque macula ſecundi ſegmenti transuerſa cineraſcente. Pedes nigri tibiis poſticis baſi albis.

2. M. niger thorace maculato, abdomine baſi rufo. *variegatus.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo praecedentis et fort ra eius varietas. Differt tantum abdo ſegmento primo toto, ſecundo baſi fe neis, reliquis margine cineraſcentibus

interruptus. 4—5. M. ater nitidus abdomine faſciis trib terruptis albis, pedibus rufis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura parua praecedentium. Caput nig labio pube parum cineraſcente. Thor ger margine antico punctoque laterali ſub ſcutello utrinque ſpinoſus. Ab atrum, nitidum faſciis tribus flauis om interruptis, ultimis duabus approx Pedes rufi.

triſtrigatus. 4—5. M. niger thorace maculato ſub ſcute punctato, abdomine faſciis tribus flau

Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Roh

Paruus. Antennae nigrae articulo prim tus flauo. Caput nigrum ore flauo. rax niger puncto ante alas et ſub alis Scutellum flauum et puncta duo mag ſcutello. Abdomen atrum faſciis trib tegris, flauis. Alae apice fuſcae. Pe ui femoribus nigris.

ſcaber. 7—8. M. ſcaber niger abdominis ſegment mo macula media, reliquis laterali fla

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Paruus. Antennae ſupra nigrae, ſubtu gineae. Caput nigrum, ſub ante uum. Thorax niger punctis duobus

tis lobi antici, calloſoque ante alas flauis. Abdomen ſcabrum, atrum primo ſegmento macula media transuerſa, flauo, reliquis utrinque laterali, quarum prima maior, intus emarginata. Anus ſiue ultimum ſegmentum immaculatum. Pedes flaui femoribus nigris.

8. M. niger thorace maculato, capite ſub antennis tibiisque albis. *labiatus.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Paruus. Antennae breues, nigrae: articulo primo latiori, ſubtus albo. Caput nigrum, ſub antennis album. Thorax niger margine antico, puncto ſub alis duobusque dorſalibus albis. Abdomen nigrum ſegmentorum marginibus parum piceis. Pedes nigri tibiis albis, poſticis annulo albo.

M. ater fronte punctis duobus, thorace quatuor anticis albis. *nigrita.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Paruus. Antennae nigrae. Caput nigrum utrinque puncto oblongo in cantho oculorum albo. Thorax niger margine antico punctis duobus transuerſis punctoque ante alas albis. Abdomen nigrum, immaculatum. Pedes nigri tibiis poſticis annulo albo.

PHILANTHUS. *Labium* compre-
rotundatum, m-
lis longius.
Antennae filifor-
in medio fron-
ſertae.

auritus. 1—2. P. niger capite thoraceque macula-
dominis primo ſegmento maculis du-
reliquis faſcia flauis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura et magnitudo P. coronati. An-
nigrae articulo primo flauo. Caput
labio, orbita oculorum antice lata p-
que magno pone oculos flauis. Tho-
ger margine antico interrupto, puncto
alas, ſcutello maculisque duabus ſub
lo fuluis. Abdomen nigrum primo ſe-
to paruo maculis duabus magnis fla-
faſcia flaua, in medio antico late em-
ta, 3. 4. faſcia integra, lineari, ſin-
lato. Pedes flaui.

ventilabris. 3—4. P. niger thoracis margine antico p-
que abdominis faſciis tribus flauis: a-
re latiore.

Habitat in Carolina Dom. Boſc.

Magnitudo praecedentium. Antennae
ſubtus baſi flauae. Caput nigrum ſub-
nis maculaque magna frontali flauis.
rax ſcaber, niger margine antico pos-
integris, flauis. Abdomen ſcabrum

grum ſegmento primo utrinque puncto flauo, ſecundo faſcia lata; in medio ſubinterrupta, reliquis margine parum flauicantibus. Pedes flaui femoribus rufis. Alae baſi flaueſcentes, apice fuſcae.

12. P. niger flauo varius abdominis ſegmento primo rufo, alis apice nigris. *interſtinctus.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo P. ruficornis. Antennae ferrugineae articulo primo flauo. Caput flauum vertice nigro. Thorax niger margine antico, puncto calloſo ante alas, lineis duabus ſcutelli, macula utrinque ſub alis et ſubſcutello flauis. Abdomen nigrum ſegmento primo rufo, reliquis apice flauis, ano tamen toto nigro. Alae albae, anticae apice nigrae. Pedes flaui geniculis nigris.

13. P. niger flauo varius abdominis baſi rufo: macula flaua. *diſſectus.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Praecedente paullo minor. Antennae rufae, baſi flauae. Caput nigrum labio albo. Thorax niger margine antico utrinque lineola, puncto ante alas ſcutelloque flauis. Abdomen nigrum petiolo toto ferrugineo, ſegmento primo baſi ferrugineo: macula flaua, ſecundo quartoque apice inprimis ad latera flauis. Pedes flaui femoribus ſupra nigris.

CRABRO. *Palpi* articulis compre
rhomboidalibus.
Labium breue, corne
apice palpigerum.
Antennae filiformes.

mediatus. 16—17. C. niger thorace maculato, abdo
atro: faſciis quinque flauis; anticis qua
interruptis.

Habitat in Europa.

Medius. Caput nigrum labio argenteo. An
tennae nigrae primo articulo ſubtu
Thorax niger punctis duobus transu
marginis antici, puncto ſub alis, linea
transuerſa ſcutelli flauis. Abdomen at
faſciis quinque flauis, quatuor anticis in
ruptis. Pedes flaui femoribus nigris.

tridens. 24—5. C. ſcutello bidentato mucronatoque
immaculatus abdominis ſegmentis utrin
macula transuerſa flaua.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino C. mucronati at distinctu
alius. Corpus paullo maius. Caput nigr
labii pube argentea. Thorax niger, im
culatus. Scutellum denticulis duobus
tis, flaueſcentibus ſubtusque mucrone
iori, canaliculato, nigro. Abdomen at
glabrum ſegmentis omnibus utrinque m
la flaua. Pedes rufi femoribus nigris.

craſſipes. 26—7. C. ater abdomine petiolato: ſegmento
cundo margine flauo.

[H]abitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
[M]agnitudo et ſtatura omnino C. leucoſtomae.
Caput nigrum labio argenteo. Antennae nigrae articulo primo toto flauo. Thorax niger puncto calloſo flauo ad baſin alarum. Abdomen petiolatum, atrum ſegmento ſecundo margine flauo. Pedes variegati tibiis poſticis apice incraſſatis, rufis.

[7]8. C. ater abdomine petiolato: primo ſegmento nodoſo, tibiis flaueſcentibus. *tibialis.*
[H]abitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
[S]tatura et magnitudo C. leucoſtoma. Caput nigrum mandibulis apice flauis. Antennae nigrae articulo primo ſubtus flauo. Thorax niger, immaculatus. Abdomen nigrum, nitidum primo ſegmento baſi attenuato, apice nodoſo. Anus flaueſcens aculeo breuiſſimo, flaueſcente. Alae aqueae. Pedes flaui femoribus in medio atris. Tibiae poſticae ferrugineae.

[7]8. C. ater antennarum medio pedibusque rufis. *varicornis.*
[H]abitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
[S]tatura parua praecedentis. Antennae nigrae in medio rufae. Caput et thorax nigra, immaculata. Abdomen atrum, nitidum. Pedes ruſi.

HYLAEUS. *Os* lingua inflexa, tr
Maxilla breuis, co
Labium in medio
xum, trifidum: l
intermedia emarg
Antennae cylindric

minutus. 16—17. H. ater nitens antennis ſubtus f
neis, fronte cinereo villoſa.
Habitat in Americae Inſulis.
Minutus totus ater, nitidus. Antenn
tum ſubtus ferrugineae et frons ciner
beſcens. Alae albo hyalinae.

ANDRENA. *Os* lingua trifida.
Labium cylindricum
xilla longius, m
ſetis duabus me
naceis.
Antennae filiformes

griſea. 4—5. A. cinereo villoſa abdomine atro
quatuor albis; anticis duabus interr
Habitat in Italia Dr. Allioni.
A. cornutae affinis videtur attamen di
Antennae nigrae. Caput et thorax c
villoſa, immaculata. Abdomen atru
tidum faſciis quatuor albis prima obſ
cundaque interruptis. Pedes cinerei
tibiis poſticis pilis rufis.

APIS. *Os* lingua inflexa, quinquefida.
Palpi breuiſſimi.
Antennae filiformes.

4. A. atra alis violaceis baſi hyalinis. *feneſtrata.*
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Nimis affinis A. violaceae at alae omnes baſi hyalinae nec unquam eundem nidum cum illa cohalitat obſeruante Daldorfio.

14. A. hirſuta thorace flaueſcente: faſcia atra, abdomine atro: faſcia flaueſcente. *Cajennenſis.*
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Statura et magnitudo praecedentium. Caput atrum antennis fuſcis. Thorax niger, ſupra flaueſcens faſcia lata inter alas nigra. Abdomen nigrum faſcia media flaueſcente. Corpus nigrum. Alae obſcurae.

1. A. hirſuta atra thorace ferrugineo, abdominis ſegmento ſecundo flauo. *marylandica.*
Habitat in America Dom. Weber.
Magna. Caput atrum labio ferrugineo. Antennae nigrae primo articulo ferrugineo. Thorax hirtus, ferrugineus. Abdomen hirtum, atrum ſegmento ſecundo flauo. Pedes poſtici hirſutiſſimi. Alae violaceo nigrae.

30. A. hirſuta atra thorace fuluo, ano albo. *aprica.*
Habitat in Lapponiae Alpibus Dom. de Paykull.
Minor A. agrorum et diſtincta. Caput atrum vertice parum ferrugineo. Thorax ſupra fuluus, immaculatus. Abdomen atrum ano albo.

nidulans. 33—4. A. hirſuta flaua thorace faſcia nigr[a] fuluo.

Habitat in America boreali.

Statura et ſumma affinitas A. pratorum a[t] lo major. Caput atrum antennis lo[n]... bus. Thorax flauus faſcia inter alas nigr[a]. ... domen flauum ano parum fuluo. Pe[des] ...

feruida. 43—4. A. hirta flaueſcens capite thorac[e] anoque atris.

Habitat in America boreali Dom. v. Ro[hr]. ...

Parua in hac familia. Caput atrum, ... latum. Thorax hirtus, flaueſcens ... ter alas nigra. Abdomen hirtum ... cens ano atro. Corpus atrum.

alata. 43—4. A. hirta flaueſcens capite anoqu[e] ...

Habitat in America boreali Dom. v. R[ohr].

Statura praecedentis at thorax immacu[latus] ...

muraria. 50—1. A. hirta nigra aut fulua pedibus ... tarſis teſtaceis.

Geoff. Inſ. 2. 409. 4.

Reaum. Inſ. 6. tab. 7. 8.

Schaeff. Monogr. Mouerbiene.

Habitat in Germaniae, Galliae muris ... e ſabulo plures cellulas continentem ... at ſolitaria.

Affinis A. amethyſtinae at diſtincta ... totus hirtus, ater tarſis ſolis teſtaceis ... cyaneae. Faemina nigra fronte thor[ace] ... dominisque dorſo fuluo. Alae albae ...

indica. 59—60. A. cinereo villoſa abdomine ... ano nigro.

Habitat in Indiae arboribus cauis, aedificiis ſtrenue mellificans Dom. Daldorff.

A. mellifica duplo minor. Antennae nigrae. Caput et thorax cinereo villoſa, immaculata. Scutellum teſtaceum. Abdomen nudum, teſtaceum ano nigro. Pedes nigri tibiis poſticis compreſſis.

60. A. atra alis coeruleſcenti fuſcis. *carbonaria.*

Apis carbonaria Linn. ſyſt. Nat. 2. 954. 7.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Diſtincta omnino ab Andrena carbonaria. Frons cinereo hirta. Corpus atrum. Alae fuſco coeruleae.

3. A. thorace ferrugineo tomentoſo, abdomine ſubgloboſo nigro: ſegmentis margine flauis. *fauoſa.*

Habitat Cajennae ſtrenue mellificans Dom. Boſc.

Statura parua praecedentium. Labium flauum lineolis duabus fuſcis. Antennae ferrugineae articulo primo longiori, nigro. Thorax ferrugineo hirtus. Abdomen ſubgloboſum, nigrum ſegmentorum marginibus flauis. Pedes nigricantes.

4. A. hirto nigra thorace ferrugineo, pedibus flauis. *atrata.*

Habitat in America boreali ſtrenue mellificans cera atra Dom. Boſc.

Statura et ſumma affinitas A. fauoſae. Thorax pilis denſis, ferrugineis hirtus. Abdomen ſubgloboſum, nigrum. Pedes flaui.

griſea. 101—2. A. ferrugineo villoſa abdomine n[illegible] ſegmentorum marginibus griſeis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Parua. Antennae nigrae. Caput et thor[illegible] ea, ferrugineo villoſa. Abdomen nigrum [illegible] mentorum marginibus cinerèo ferrug[illegible] Pedes ferruginei.

pallens. 110—1. A. pallide teſtacea labio cinereo vi[illegible]

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Parua tota pallide teſtacea labio ſolo ci[illegible] pubeſcente. Tibiae poſticae valde co[illegible] ſae. Alae albidae.

flauicornis. 111—12. A. nigra abdominis ſegmentis [illegible] apice albis, antennis flauis, tibiis p[illegible] hirſutiſſimis.

Habitat Surinami Dom. Richard.

Parua. Caput et thorax nigra hirſutie [illegible] cinerea. Antennae flauae. Abdom[illegible] grum ſegmento 2. 3. 4. apice albidis. [illegible] nigri tibiis poſticis hirſutiſſimis.

4cincta. 119—20. A. cinereo pubeſcens abdomine ſegmentorum marginibus albo ciliatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum, nigrum. Caput et [illegible] cinereo pubeſcentia. Abdomen atrum [illegible] tidum ſegmentorum marginibus albo [illegible] tis. Alae albae coſta nigra. Pedes [illegible] centes.

ſeladonia. 120—1. A. hirta vireſcens abdominis ſeg[illegible] margine albo.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Parua. Caput et thorax vireſcentia, cinereo pubeſcentia. Abdomen vireſcens ſegmentorum marginibus late albis. Pedes cinerei femoribus albis.

1—2. A. viridis nitida antennis pedibusque nigris. *aenea.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Nimis affinis A. ſmaragdula et forte mera eius varietas. Corpus totum nudum, viridi aeneum, nitidum. Labium cinereum. Antennae pedesque nigri.

2—3. A. atra coeruleo nitida labio puncto, thorace calloſo utrinque ante alas albis. *calloſa.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino A. minutae at paullo maior. Corpus atrum, coeruleo nitidum. Labium puncto oblongo albo. Thorax ater puncto utrinque calloſo ante alas albo. Pedes nigri apice pilis pallidis ciliati.

3—4. A. nigra viridi nitida abdomine albo: ſegmentis baſi atris. *paruula.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Minutiſſima. Antennae ſupra nigrae, ſubtus albidae. Caput nigrum, viridi nitens labio albido. Thorax viridi nitens ſcutello albo: ſtriga media nigra. Abdomen album, nitidum ſegmentis baſi nigris. Pedes piloſi, albi.

EUCERA. *Os* lingua ſeptemfida.
Labium quinquefidum:
ciniis intermediis m
bus, apice palpiger
Antennae cylindricae.

breuicornis. 8. E. ferrugineo hirta abdomine aeneo,
nis breuibus nigris.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Antennae cylindricae omnino huius gen
thorace breuiores. Caput et thorac
gineo hirta. Abdomen obſcure a
pilis rarioribus hirtum. Pedes ferr
hirti.

craſſipes. 9. E. cinereo hirta abdomine atro: ſegmen
marginibus vireſcentibus, femoribu
cis incraſſatis.

Habitat Tranquebariae D. Daldorff Mu
Lund.

Statura omnino huius generis. Anten
lindricae, thorace breuiores, pice
put et thorax cinereo hirta. Abdome
ſegmentorum marginibus vireſcentib
obſcurae, apice fuſcae. Pedes flau
femoribus poſticis incraſſatis, denta
gris tibiis incuruis, dentatis, flauis.

FORMICA. *Palpi* inaequales: articulis cylindricis.
Labium ſubmembranaceum, cylindricum, apice palpigerum.
Antennae filiformes.

10. F. atra abdomine cinereo ſericeo, thorace poſtice bidentato. *ſericea.*
Habitat in Senegalia Muſ. Dom. Boſc.
Statura F. nigrae. Caput magnum, atrum antennarum primo articulo baſi ruſo. Thorax niger, poſtice compreſſus, canaliculatus terminatus denticulis duobus obtuſis. Abdomen ſubgloboſum, cinereo nitidum, ſericeum. Pedes nigri.

12. F. nigra thorace abdominis primo ſegmento femoribusque ferrugineis. *ferruginea.*
Habitat in America.
Statura F. rufae at duplo maior. Caput magnum, glabrum, nigrum. Thorax compreſſus, ferrugineus ſquama integerrima, ouata. Abdomen hirtum, fuſcum primo ſegmento ferrugineo. Pedes nigri femoribus ferrugineis.

8. F. nigra pedibus ferrugineis, abdomine conico. *conica.*
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.
F. pallipes paullo maior. Corpus atrum, nitidum pedibus ſolis rufis. Abdomen conicum, acutum ſquama integerrima ouata, obtuſa.

cylindrica. 31—2. F. atra capite cylindrico rufo: ore a
Habitat in India Muſ. Dom. Boſc.
Media. Caput magnum, cylindricum, ru
ore atro. Th
Mandibulae exſertae, intus dentatae.
parum compreſſus, ater. Abdomen c
dricum, atrum, immaculatum. Pedes
gri. Alae obſcurae.

flauicornis. 38—9. F. thorace hirto ferrugineo nigra an
nis apice flauis.
Habitat Cajennae.
Magna, elongata. Caput nigrum, obſcu
mandibulis porrectis, apice incraſſatis
lique truncatis, ſerratis. Antennae ni
apice flauae. Thorax pilis denſis fe
neis tectus. Petiolus breuis, baſi parum
culorum obtuſorum. Squama integerr
craſſa, latiſſima. Abdomen ouatum, ob
rum. Pedes nigri. Alae ſubferruginei

tarſata. 38—9. F. thorace inermi nigra tarſis antic
tus rufo hirtis.
Habitat in Inſula Goré Africae Dom. Boſc.
Statura et magnitudo praecedentis tota
immaculata, diſtincta tarſis anticis
hirtis.

2tuberculata. 38—9. F. thorace inermi ferruginea mand
exſertis dentatis, petiolo binodi.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Boſc.
Praecedentibus minor. Corpus totum pilo
ferrugineum. Petiolus elongatus tuber
duobus eleuatis.

3. F. thorace antice biſpinoſo nigra mandibulis exſertis apice truncatis ſerratis. *fungoſa.*
Habitat Cajennae in nidis magnis, fungoſis e tomento plantarum confectis.
Parua. Caput medium, ouatum, nigrum antennarum primo articulo ferrugineo. Mandibulae exſertae, truncatae, ſerratae. Thorax antice utrinque ſpina valida armatus, niger, immaculatus. Abdomen rotundatum, atrum.

MUTILLA. *Palpi* articulis obconicis.
Labium porrectum, corneum, obconicum, apice palpigerum.
Antennae filiformes.

14. M. nigra abdomine puncto dorſali faſciisque albis. *dorſata.*
Habitat in Americae Inſulis Muſ. Dom. Boſc.
Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen hirtum, atrum macula magna dorſali ſecundi ſegmenti apicibusque approximatis reliquorum ſegmentorum albis. Pedes nigri.

20. M. hirta nigra thoracis margine antico cinereo, abdominis ſecundo ſegmento rufo poſticeque faſciis duabus cinereis. *pedemontana.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
M. italica duplo minor. Caput atrum. Thorax niger margine antico ſcutelloque cinereis. Abdomen conicum ſegmento ſecundo

rufo quarto quintoque faſcia e pilis ci-
argenteis. Alae fuſcae. Pedes nigri.

calua. 24—5. M. nigra vertice thoraceque rufis, a-
mine ſegmentis margine cinereis.

Habitat in Gallia Dom. Latreille.

Corpus paruum, hirtum, nigrum. Cap-
grum vertice antennisque rufis. T-
rufus. Abdomen nigrum ſegmentorum
ginibus cinereo ciliatis. Pedes rufi.

vagans. 27—8. M. rufa abdomine obſcuriore ſegm-
rum marginibus punctisque duobus ſe-
ſegmenti albis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo M. nigripes. Cap-
fum antennis nigris. Thorax hirtus.
Abdomen magis obſcurum ſegmenti-
bus margine albis ſecundoque maiori
ctis duobus dorſalibus albis. Pedes a-
biis obſcurioribus.

CLASSIS V.

O D O N A T A.

MAXILLA CORNEA, DENTATA. PALPI DUO.

LIBELLULA. *Labium* trifidum: lacinia dorſali minutiſſima.

Antennae tenuiſſimae, filiformes.

14. L. alis omnibus ſtria marginali flaua apiceque macula fuſca. *conſpurcata.*

Habitat Kiliae Dom. Weber.

Statura omnino L. 4maculatae at diſtincta. Os veſiculoſum, flaueſcens. Thorax villoſus. Abdomen triangulare, flaueſcens linea dorſali atra. Alae planae, anticae ſtria ante marginem craſſiorem flaua, quae tamen apicem haud attingit. Macula ordinaria marginalis et macula magna fuſca alam terminat. Poſticae anticis concolores at macula baſeos nigra.

15. L. thoracis lateribus flauis: lineis ramoſis nigris. *aſiatica.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura L. vulgatiſſimae. Caput flauum, Th-
la frontali, biloba, coerulea. Thorax ſu-
pra fuſcus lineis duabus dorſalibus, ap-
matis, flauis, lateribus flauis lineis
nigris. Abdomen rubicundum. Ala-
linae ſtigmate ordinario fuſco.

gibba. 14—15. L. flauo nigroque varia abdomi-
gibbo, alis obſcuris: ſtigmate albo.
Habitat in India orientali Dom. Daldorf.
Statura praecedentis. Caput flaueſcens.
rax flaueſcens, undique nigro lineatum.
domen tenue, cylindricum baſi ſupr-
que gibbum, apice compreſſum,
baſi nigro lineatum, medio faſciatum
totum nigrum. Alae albidae at obſcur-
mate ordinario albo.

carnatica. 18—9. L. alis hyalinis: ſtigmate margi-
corpore nigro immaculato.
Habitat in India orientali Dom. Daldorf.
Corpus nigrum, immaculatum ore fem-
que baſi parum piceis. Alae hyalinae
maculatae ſtigmate ordinario, fuſco.

braminea. 18—19. L. alis hyalinis ſtigmate marginali
corpore flauo nigro lineato.
Habitat in India orientali Dom. Daldorf.
Statura et magnitudo praecedentis. Ca-
uum antennis nigris. Thorax eleuat-
uus lineis quinque impreſſis, fuſcis.
men flauum linea dorſali integra, la-
bus interruptis nigris. Alae hyalinae
maculatae ſtigmate marginali ordinario,

19. L. alis hyalinis: ſtigmate niueo, corpore flaueſcente. *flaueſcens.*
Habitat in India Dom. Daldorff.
Statura praecedentium. Caput flaueſcens oculis magnis, fuſcis. Thorax flaueſcens, immaculatus. Abdomen compreſſum, flaueſcens linea dorſali nigra. Alae albae ſtigmate marginali niueo.

19. L. alis hyalinis: ſtigmate marginali fuſco, corpore coeruleſcente. *coeruleſcens.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Media. Os flaueſcens fronte nigricante. Corpus coeruleſcens, immaculatum. Alae baſi immaculatae.

6. L. alis hyalinis: poſticis macula media flaueſcente adiacente albae, corpore flaueſcente. *Tillarga.*
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus medium totum flaueſcens. Alae anticae hyalinae, immaculatae, poſticae hyalinae macula magna, media, flaueſcente, cui adjacet macula niuea.

AESHNA. *Labium* trifidum: laciniis aequalibus, lateralibus truncatis, dentatis, intermedia emarginata.
Antennae tenuiſſimae, filiformes.

2. A. fuſca thorace maculis duabus anticis lineisque duabus ſub alis viridibus, cauda unguiculata. *heros.*

Habitat in America boreali Dom. v. Ro[h]

A. grandis adhuc maior. Caput veſic[ulo]
eleuatum, flaueſcens. Thorax obſcu[re ...]
culis duabus anticis lineisque duab[us ...]
que ſub alis obliquis, viridibus. Ab[domen]
cylindricum, in noſtris fuſcum cau[da]
appendiculata. Alae reticulatae, o[...]

Abdomen animalculo viuente forte var[ie ...]

annulata. 4—5. A. thorace fuſco, abdomine p[...]
ſegmentorum marginibus atris.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Media. Caput punctatum, obſcure fl[...]
Thorax villoſus, fuſcus. Alae alb[...]
nae ſtigmate albido. Abdomen cyl[indricum]
obſcure flaueſcens ſegmentorum ma[rginibus]
atris. Pedes flaueſcentes.

AGRION. *Labium* trifidum: [...] exterioribus bifid[is]. *Antennae* tenuiſſima[e ...]formes.

barbara. 2—3. A. ſupra viridis ſubtus flaua alis [...]
nigro albo.

Habitat in Barbaria Dom. de Rehbinde[r].

Statura et magnitudo A. puellae. C[aput ...]
de ore flauo. Thorax ſupra viridis [...]
bus dorſalibus, flauis, ſubtus flau[us ...]
domen cylindricum, ſupra viride, [ſubtus]
flauum. Alae hyalinae ſtigmate o[...]
nigro, dimidiato albo.

4. A. flaueſcens pedibus nigro ciliatis. *coromandeliana.*
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura praecedentium. Corpus totum flaueſcens. Alae hyalinae, abdomine breuiores, ſtigmate ordinario albo. Pedes flaui, intus ſpinis nigris ciliati.

4. A. viridiaenea thoracis lateribus flauo lineatis, alis baſi ſanguineis. *americana.*
Habitat in America Dom. Hybner.
Statura omnino praecedentium. Caput villoſum, aeneum. Thorax villoſus, aeneus, interdum aureus lateribus ſemper flauo lineatis. Alae hyalinae macula magna baſeos ſanguinea. Abdomen cylindricum, aeneum. Pedes valde ciliati.

CLASSIS VI.

MITOSATA.

MAXILLA CORNEA, FORNICATA, H
PALPIGERA.

SCOLOPENDRA.

Os maxillis palpisque.

Palpi quatuor inaequales:

anteriores ſubbreuiores, arcuati, filiformes
driarticulati: articulo ſecundo longior
curuo, ultimo ſubtenuiori, unguicula
connati, liberi inter maxillas et labium
ſerti

poſteriores maxillas aemulantes, validi, cr
arcuati, quadriarticulati: articulo primo
iori, craſſiori; apice interiori tridentato
cundo tertioque breuiſſimis, quarto lo
mo, arcuato, acuto labii medio ex
adnati.

Mandibula breuis, cornea, fornicata baſi in
ri dente valido acuto, fere palpiformi, a
rotundata, edentula.

Maxilla mandibulis longior, cornea, valida
nicata, baſi interiori dente valido arcu
apice truncata, quinque dentata.

[La]bium craſſum, fiſſum, apice ſexdentatum.
[A]ntennae ſetaceae.

SCOLOPENDRA. *Palpi* quatuor.
anteriores baſi connati, liberi.
poſteriores arcuati, mandibuliformes.
Antennae ſetaceae.

7. S. pedibus utrinque 20 violacea capite caudaque rufis. *violacea.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.
S. electrica paullo maior. Caput rufum antennis violaceis. Primum corporis ſegmentum et ultima tria cum pedibus caudalibus rufa. Pedes reliqui violacei.

JULUS. *Labium* crenatum, emarginatum.
Antennae moniliformes, extrorſum craſſiores.

6. I. pedibus utrinque 72. plumbeus: ſegmento ſingulo punctis duobus coccineis. *guttulatus.*
Julus guttulatus Act. Hiſt. nat. Angl.
Habitat Pariſiis in arboribus pomiferis Dom. Boſc.
Minuta. Puncta coccinea pereunt cum vita.

CLASSIS VII.

VNOGATA.

MAXILLA CORNEA, VNGUICULAT[A]

SOLPUGA.

Os mandibulis palpisque.

Palpi quatuor inaequales.

anteriores longiores, craſſi: articulo ul[timo]
globoſo.

poſteriores paullo breuiores, filiformes: ar[ticu-]
lis aequalibus.

Mandibula magna, chelifera, ſeſſilis.

Maxilla depreſſa, falcata, acuta.

Labium hauſtelliforme.

Antennae nullae.

Genus omnino diſtinctum videtur at charact[er na-]
turalis nondum rite elaboratus.

ARANEA. *Palpi* duo incurui, maris clauati.
Labium breue, apice rotundatum.
Antennae nullae.

2. A. pallide teſtacea mandibulis ferrugineis: unguibus nigris. *pallens.*
Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Rohr.
Corpus magnum, totum pallide teſtaceum mandibulis ſolis obſcurioribus unguibus nigris. Abdomen paruum, rotundatum. Pedes extenſi, primi paris paullo longiores, tertii breuiores.

5. A. villoſa cinerea pectore atro. *nobilis.*
Habitat in India.
Magna tota villoſa cinerea. Margo capitis ſub oculis albus, qui ramum usque ad dimidium mandibulae exſerit. Pectus atrum. Pedes cinerei tibiis ſubtus nigro faſciatis.

11. A. ferruginea abdomine globoſo flaueſcente. *bicolor.*
Habitat in America.
Media. Caput et thorax obſcure ferruginea, immaculata. Abdomen globoſum, flaueſcens. Pedes ferruginei.

9. A. atra maculis villoſo argenteis, abdomine ouato cinereo. *eſuriens.*
Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.
Magna. Thorax ater maculis inprimis poſtice villoſis, argenteis. Abdomen ouatum, vil-

loſum, cinereum. Pedes elongati fe
bus tibiisque ferrugineis: geniculis in
tis nigris, apice nigri.

rapax. 33—4. A. teſtacea abdomine cylindrico
mandibulis longiſſimis biarticulatis de
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus medium, teſtaceum abdomine elo
to, cylindrico, fuſco. Palpi maris pe
clavati, apice attenuati, cylindrici.
dibulae exſertae, longiſſimae, biarticul
articulis aequalibus; primo craſſiori,
dentato, ſecundo ſubulato, acuto.
longiſſimi, villoſi, teſtacei.

geminata. 38—9. A. abdomine tranſverſo: ambitu ſ
noſo: ſpinis lateralibus connatis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura parva A. tetracanthae. Corpus ni
immaculatum abdomine tranſverſo late
valde dilatatis: ſpinis utrinque duabu
dis, connatis. Anus valde retuſus ſp
duabus validis, diſtinctis. Color abdo
magis fuſcus margine antico ſtriga m
rum ocellatarum, elevatarum.

parallela. 73—4. A. oculis ⁚ ⁚ fuſca thoracis abdominis
lateribus albis, mandibulis porrectis p
lelis.
Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Rohr.
Parva. Mandibulae valde porrectae, pa
lae, fuſcae unguibus nigris. Thorax rotu
tus, planus, fuſcus: lateribus albis. Abdo
fere conicum, planum, fuſcum lateribu

bis. Pedes pallidi, antici longiores, ſubtus nigri.

PHALANGIUM. *Palpi* duo incurui.
Mandibula chelifera.
Antennae nullae.

7. P. corpore depreſſo ſubrotundo antice uniſpinoſo, poſtice quadridentato, femoribus ſpinoſis. *4dentatum.*

Phalangium 4dentatum Cuvier Magaz. Enc. tab. fig.

Habitat in Gallia Dom. Cuvier.

Minor P. opilio. Corpus planum, ſubrotundum ſpina antica porrecta, acuta poſticeque denticulis quatuor minoribus, obtuſiuſculis. In dorſo tuberculum paruum, eleuatum, ſubſpinoſum uti in P. diadema at multo minus. Pedes octo femoribus ſpinoſis ſecundi paris longiſſimis.

SOLPUGA. *Palpi* quatuor.
Mandibula chelifera, ſeſſilis.
Labium hauſtelliforme.
Antennae nullae.

S. chelis horizontalibus, abdomine depreſſo villoſo. *fatalis.*

Solpuga fatalis Lichtenſt. Catal. Hamb. 1797. 151. 195.

Habitat in Bengalia.

Genus mihi haud rite notum.

araneoides. 2. S. chelis verticalibus, abdomine tereti nu-
culo.
Solpuga arachnoides Lichtenſt. Catal. Hi
1797. 151. 196.
Phalargium araneoides Ent. ſyſt. 2. 431. 9.
Pallas ſpicil. Zool. faſc. IX. tab. 3. fig. 7. 8.
Habitat in Ruſſia auſtrali.

chelicornis. 3. S. chelis verticalibus cirrhiferis, abdomin-
ceolato villoſiſſimo.
Solpuga chelicornis Lichtenſt. Catal. H
1797. 152. 197.
Petiv. Gazoph. tab. 12. fig. 1. tab. 85. fig.
Habitat in Amboina.

SCORPIO. *Palpi* duo porrecti, c
feri.
Labium bifidum.
Antennae nullae.

mucronatus. 5—6. S. pectinibus viginti variegatus cau-
aculeo mucronata.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus totum fuſco flaueſcentique variegatum.
Chelae flauae digitis fuſcis. Cauda l
apice mucronata aculeo incuruo, acumi-
Pedes compreſſi.

Tamulus. 6—7. S. pectinibus - - - - chelis laeuibus:
tis carpo longioribus filiformibus, cau-
neis eleuatis laeuibus.

Habitat in India orientali. Ictu dolores vehementiſſimos, totum corpus peruagantes per viginti quatuor horas, ſextâ ſingula hora exacerbantes excitat. Poſtero die remanet motus membrorum impeditus et tertio die plerumque poſt calorem ſiccum ſudore vehementi venenum evacuatur. Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino S. hottentotta. Corpus fuſcum pedibus teſtaceis.

CLASSIS VIII.

POLYGONATA.

MAXILLAE PLURES INTRA LABIU[M]

ONISCUS.

Os prominulum mandibulis maxillaque dup[...]

Clypeus breuis, transuerſus, integer.

Mandibula breuis, oſſea, apice truncata, tri[...]
tata, in medio palpo breui, obtuſo, u[...]
detur, inarticulato.

Maxilla duplicata.
exterior oſſea, paullo longior, multidentata
interior breuior, apice obtuſa, integra.

Labium membranaceum, bifidum: laciniis ro[...]
datis, aequalibus.

Palpi quatuor inaequales, filiformes.
exteriores baſi exteriori labii inſerti.
poſteriores breuiſſimi adhaerentes labii apic[...]

Antennae duae porrectae, filiformes.

LIGIA.

Os prominulum maxilla duplici.

Clypeus breuis, transuerſus, integer.

Mandibula — — —

Maxilla duplicata.

[Ex]terior longior, membranacea, recta, apice bidentata.
[In]terior breuis, membranacea, integra.
[Lab]ium porrectum, membranaceum, depreſſum, ouatum, apice acutum, integrum.
[Ocu]li nulli?
[Ant]ennae duae ſetaceae: articulis tribus prioribus longioribus, aequalibus, reliquis numeroſis, breuiſſimis.

IDOTEA.

[Ca]palpis maxillaque duplici.
[Cl]ypeus breuis, truncatus, transuerſus, integer.
[Ma]ndibula magna, craſſa, fornicata, apice truncata, externe dente valido exſerto, dorſo palpigero.
[Pa]lpus planus, filiformis, quadriarticulatus: articulo primo breuiſſimo, ſecundo tertioque aequalibus longioribus, quarto breui, ſubulato, villoſo.
[Ma]xilla duplicata.
[Ex]terior oſſea, plana, labio paullo longior, extus rotundata, intus ciliato ſpinoſa.
[In]terior oſſea, medio dilatata, apice ciliata.
[Lab]ium breue, oſſeum, apice rotundatum, ciliato ſpinoſum bifidum: laciniis extus palpigeris.
[Pa]lpus elongatus, labio triplo longior, ſeptem articulatus: articulis ſubaequalibus, fornicatis; quarto inflexo.
[Ant]ennae quatuor inaequales ſetaceae:

ſuperiores breues, multiarticulatae: articuli- bus baſeos maioribus, reliquis breuibus- ſo ſerratis, ſubtus piloſis.

inferiores longiores, multiarticulatae: arti- tribus baſeos maioribus.

CYMOTHOA.

Os maxilla duplici.

Clypeus inflexus, rotundatus, integer.

Mandibula — — —

Maxilla duplicata.

exterior membranacea, integra, obtuſa.

interior membranacea, dorſo palpigera.

Palpus ſetaceus, quinquearticulatus: articuli- qualibus.

Labium laxiſſimum, membranaceum, rotundat- bifidum.

Antennae quatuor breues, aequales, ſetaceae: ar- culis ſubaequalibus.

MONOCULUS.

Os mandibulis maxillaque duplici.

Clypeus magnus, deflexus, membranaceus, ro- tundatus, integer.

Mandibula magna, gibba, arcuata, fornic- apice depreſſa, truncata, multidentata.

Maxilla duplicata.

interior maior, rotundata, membranacea, ſ- unidentata, apice truncata, ciliata, den-

[...]xterior membranacea: dorſo eleuato, rotundato, apice acuta, edentula.

[...]bium membranaceum bifidum: laciniis rotundatis palpigeris.

[...]lpi utrinque quatuor ſetacei, multiarticulati, ſenſim longiores laciniis labii inſerti.

[...]ntennae breuiſſimae, filiformes ſub clypeo inſertae.

ONISCUS. *Palpi* utrinque duo l
inſerti.
Antennae duae filiform

Aſellus. 3. O. ſcaber cauda obtuſa: ſtylis duobus ſi
bus antennarum articulo terminali bi
lato.
Oniſcus Aſellus Ent. ſyſt. 2. 397. 3. Linn.
Nat. 2. 1061. 14. Fn. Su. 2058.
Geoff. Inſ. 2. 760. 2.
Degeer Inſ. 7. 547. 1. tab. 35. fig. 3.
Sulz. Inſ. tab. 24. fig. 154.
Habitat in muribus, ligno putrido.

murarius. 3—4. O. cauda obtuſa: ſtylis duobus ſimp
antennarum articulo terminali triart
Oniſcus murarius Cuvier Journ. d' Hiſt. n
22. 4. tab. 26. fig. 11. 12. 13.
Habitat in Gallia Dom. Cuvier.
Nimis affinis certe O. Aſello et forte me
varietas. Differt tantum corpore l
minus ſcabro, antennarum articulo
triarticulato aut potius antennis arti
bus paruis terminatis. Mucro caud
lo longior quam in praecedente.

hypnorum. 4—5. O. cauda ſetis bifidis: antennarum
articulo ſubſpinoſo.
Oniſcus hypnorum Cuvier Journ. d' Hiſt. n
2. 21. 1. tab. 26. fig. 3. 4. 5.
Habitat in Galliae Muſcis Dom. Cuvier.
Paruus. Antennae multiarticulatae ar
primo apice dimidiato appendiculo cyl

co, truncato, acuminato ſequentibus tribus maioribus cylindricis, ultimis numeroſis, rotundatis. Cauda ſetis duabus bifidis. An potius Ligia?

5. O. ater ſegmentorum marginibus coccineis, cauda obtuſa integra. *annulatus.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Statura omnino O. Armadillo totus ater, glaber ſegmentorum marginibus ſanguineis.

LIGIA. *Palpi* nulli.

Antennae duae ſetaceae.

1. L. cauda abbreuiata bifida: ſtylis bifidis. *oceanica.*
Cymothoa oceanica Ent. ſyſt. 509. 22.
Oniſcus oceanicus Mant. Inſ. 1. 242. 18. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1061. 12.
Stroem. Sundm. 202. tab. 1. fig. 14. 15.
Act. Helvet. 5. 371. tab. 5. fig. 663.
Baſt. ſubſ. 26. 145. tab. 13. fig. 4.
Gronov. Zooph. 994. tab. 17. fig. 2.
Penn. Zool. Britann. 4. tab. 18. fig. 4.
Habitat in Oceano Europaeo frequens.

Ligiae corpus ouatum, ſubmarginatum, agile, ſcabrum ſegmentis quindecim: margine deflexo, acuto, capite magno, tranſuerſo, exſerto, antennis approximatis, medio frontis inſertis, oculis ouatis prominulis, lateralibus margine primi ſegmenti firmatis, cauda breui rotundata ſtylis duobus depreſſis, marginatis, apice bifidis: laciniis rotundatis ſetaceis pedibus utrinque ſeptem, breuibus, incuruis, biunguiculatis, colore obſcuro.

italica. 2. L. cauda elongata bifida: ſtylis bifidis.
Habitat in Italiae aquis Dr. Allioni.
Statura et magnitudo omnino praeced.
diſtincta et alia. Antennae longitudin
poris. Corpus ouatum cauda bifida
elongatis bifidis longitudine corporis.

IDOTEA. *Os* palpis quatuor.
Antennae quatuor ſetac
inferioribus longiori

americana. 1. I. abdomine foliolis duodecim obte
bus poſticis elongatis rufis, cauda rot
Cymothoa americana Ent. ſyſt. 2. 507. 14
Habitat in Oceano americano Dr. Pflug.

pſora. 2. I. abdomine ſubtus nudo, cauda le
acuta.
Cymothoa pſora. Ent. ſyſt. 2. 507. 15.
Oniſcus pſora Mant. Inſ. 1. 241. 13. Linn
Nat. 2. 1060. 3. Fn. Su. 2054.
Stroem. Act. Hafn. 9. 594. tab. 10.
Habitat in Oceano Norwegico.

phyſodes. 3. I. abdomine ſubtus nudo, cauda ouata

Idoteae corpus oblongum, tardum, vix
tum, ſegmentis corporis 9—15 ultimis minor
pite exſerto, transuerſo, oculis rotundatis,
nulis, medio marginis exterioris inſertis, ap
proximatis, incambentibus, capitis, ap
cauda maiore, a corporis ſegmento diſtin
absque ſetis. Pedes utrinque ſeptem breue
ticulati, ungue duplici incuruo, acuto, colo

Cymothoa physodes Ent. ſyſt. 2. 507. 16.
Oniſcus phyſodes Mant. Inſ. 1. 241. 14. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1060. 4.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 30. fig. 11.
Habitat in Oceano Europaeo.

I. oblonga griſea antennis pedibusque pallidioribus, cauda acuminata. *acuminata.*
Cymothoa acuminata Ent. ſyſt. 2. 508. 18.
Habitat in Oceano.

I. oblonga griſeo fuſca, cauda emarginata. *emarginata.*
Cymothoa emarginata Ent. ſyſt. 2. 508. 19.
Habitat in Oceano Dom. Lund.

I. oblonga fuſca cauda pallida nigro punctata. *albicornis.*
Cymothoa albicornis Ent. ſyſt. 2. 509. 20.
Habitat in mari hiſpanico frequens piſces conſumens Dom. Prof. Vahl.

I. cauda rotunda: ſtylis bifurcis. *aquatica.*
Cymothoa aquatica Ent. ſyſt. 2. 505. 8.
Oniſcus aquaticus Mant. Inſ. 1. 241. 7. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1061. 11. Fn. Su. 2061.
Geoff. Inſ. 2. 672. 1.
Degeer Inſ. 7. 496. 1. tab. 31. fig. 1.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 30. fig. 12.
Friſh. Inſ. 10. tab. 5.
Schaeff. Elem. tab. 22.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus.

I. ſemicylindrica cauda ouato oblonga acuminata. *marina.*
Cymothoa marina Ent. ſyſt. 2. 506. 9.
Oniſcus marinus Mant. Inſ. 1. 241. 8. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1060. 7. Fn. Su. 2057.

Pall. ſpicil. Zool. 9. 66. tab. 4. fig. 6.
Degeer Inſ. 7. 523. 3. tab. 32. fig. 11.
Penn. Zool. Brit. 4. tab. 18. fig. 3.
Habitat in Oceano Norwegico.

linearis. 9. I. linearis cauda quadridentata.
Cymothoa linearis Ent. ſyſt. 2. 506. 10.
Oniſcus linearis Mant. Inſ. 1. 241. 9. Linn.
Nat. 2. 1060. 9. Amoen. acad. 6. 415.
Pall. ſpicil. Zool. 9. 62. tab. 4. fig. 11.
Penn. Zool. Britann. 4. tab. 18. fig. 2.
Habitat in Oceano Indico.

ſcopulorum. 10. I. lutea; ſtrigis fuſcis.
Cymothoa ſcopulorum Ent. ſyſt. 2. 507.
Oniſcus ſcopulorum Mant. Inſ. 1. 241.
ſyſt. Nat. 2. 1061. 10. Fn. Su. 2060.
Habitat in Oceano Norwegico.

CYMOTHOA. *Palpi* duo ſetac[…]
Antennae quatuor[…]
quales, ſetac[…]

paradoxa. 1. C. ſegmentorum lateribus falcato ſpinuloſ[…]
ſyſt. 2. 503. 1.
Oniſcus paradoxus Mant. Inſ. 1. 240. 1.
Habitat in Terra del Fuego Muſ. Dom. […]

imbricata. 2. C. antennis compreſſis, pedibus unguic[…]
femoribus poſticis carinatis Ent. ſyſt.
503. 2.
Oniſcus imbricatus Mant. Inſ. 1. 241. 3.
Habitat in noua Zelandia Muſ. Dom. Banks.

C. ſegmentorum lateribus foliato biſpinoſis. *Falcata.*
Ent. ſyſt. 2. 504. 13.
Oniſcus falcatus Mant. Inſ. 1. 240. 2.
Habitat in Oceano chinenſi.

C. abdomine foliolis duobus obtecto, cauda *Aſilus.*
ſemiouali Ent. ſyſt. 2. 504. 4.
Oniſcus Aſilus Mant. Inſ. 1. 241. 4. Linn. ſyſt.
Nat. 2. 1059. 1. Fn. Su 2052.
Pall. ſpic. Zool. 9. 71. tab. 4. fig. 12.
Petiv. Gazoph. tab. 155. fig. 1.
Planc. Conch. min. not. tab. 5. fig. A. B.
Habitat in Oceano Europaeo.

Cymothoas reliquas mihi minus notas ad ulteriorem diſquiſitionem ſepono.

MONOCULUS. *Palpi* utrinque quatuor ſenſim decreſcentes.
Antennae breuiſſimae.

M. teſta oblonga poſtice truncata ſerrata, cauda biſeta. Ent. ſyſt. 2. 488. 1. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1058. 3. Fn. Su. 2046. *Apus.*
Limulus paluſtris Myll. Entomaſt. 127. 61.
Binoculus Geoff. Inſ. 2. 660. 1.
Apus cancriformis Schaeff. Monogr. 1756. tab. 1—6. Friſh. Inſ. 10. tab. 1.
Naturf. 19. 60. tab. 3. fig. 1—12.
Sulz. Inſ. tab. 24. fig. 153.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus.

piſcinus. 2. M. corpore cordato plano. Ent. ſyſt. 2. 489. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1057 2. Fn. Su. 2041. *Binoculus haemiſphaericus* Geoff. Inſ. 2. 660. tab. 21. fig. 3.
Caligus curtus Myller. Ent. 130. 63. tab. 21. 1. 2.
Act. Hafn. 10. 23. tab. 7. fig. 1—7.
Stroem. Sundm. 1. 167. tab. 1. fig. 4. 5. 6.
Baſt. ſubſ. 2. 137. tab. 8. fig. 9. 10.
Act. Societ. Berol. 3. 44. tab. 1. fig. 4. 5. 6.
Friſh. Inſ. 6. tab. 12.
Habitat in Oceano piſcibus moleſtus.

Crangorum. 3. M. ecaudatus corpore plano depreſſo. Habitat in Branchiis Palaemon ſquilla Brogniard.
Statura omnino M. piſcini, ſupra planus, uis, ferrugineus margine pallidiore ouis numeroſis. Pedes breues, incur guiculati utrinque ſeptem.
Monoculi reliqui minores ſiue Entom Mylleri nendum rite noti. Amymon Nauplii Mylleri metamorphoſi in Cy tranſeunt obſervante oculatiſſimo Jurin nevenſi.
Lerneae Linnaei prima ſpecie excepta etiam pertinere videntur.

CLASSIS IX.
KLEISTAGNATHA.
AXILLAE PLURES EXTRA LABIUM OS CLAUDENTES.

C A N C E R.

mandibulis, palpis maxillaque triplici.

axilla exterior cornea totum os obtegens, bifida: lacinia interiore maiore, plana, in medio geniculata, coarctata, margine interiori ciliato, apice truncata, ſubſinuata: angulo extimo palpigero.

lpus compreſſus, ſetaceus, triarticulatus: articulo primo maiore, obconico, incuruo, ſecundo breuiore, conico, tertio longiore, arcuato, ciliato.

inia exteriore multo minore, ſubcornea, flagelliformi: ſtylo lanceolato lineari, apice palpigero.

lpus longitudine dimidii ſtyli, incuruus, ſetaceus multiarticulatus: articulo primo craſſiore longiore inflexo, reliquis decreſcentibus, numeroſis, vix conſpicuis.

pi duo intermaxillares porrecti, bifidi: lacinia interiore breuiore, compreſſa, ciliata, quin-

que articulata: articulo primo breui, te
uerſo, ſecundo longiſſimo, tertio incu
quarto latiore transuerſo, quinto rotun
exteriore flagelliformi ſubmembranacea
ticulo primo compreſſo lacinia interiore
giore, ſecundo ouato, incuruo, reliqu
meroſis, minutis, decreſcentibus, cilia

Maxilla ſecunda ſubcornea, trifida: lacinia
riore breuiſſima, ouata, ciliata, inte
maiore, dilatata, ſubfornicata, ciliata
teriore longiſſima, membranacea: bi
lindrica, medio dilatata, ciliata, api
tuſa.

Palpus membranaceus flagelliformis maxillae
cundae baſin exteriorem adhaerens, e
tus, multiarticulatus: articulo primo
ri, longiſſimo, ſecundo ouato, incuruo
liquis numeroſis, decreſcentibus,
vix conſpicuis.

Maxilla tertia mandibularum baſin tegens, m
branacea, quadrifida: lacinia interior
fornicata, dilatata, fiſſa, parum cilia
cunda unguiformi, cornea, arcuata,
tertia longiore, verſus apicem ciliata,
que truncata, dilatata, exteriore baſi
apice lineari.

Labium breue membranaceum mandibulis
adhaerens.

Mandibula oſſea utrinque ſinuata, apice dil
fornicata, intus palpigera.

Palpus angulo medio mandibulae inſertus, compreſſus, ciliatus, quadriarticulatus: articulo primo maiore, quarto longiore, incuruo.
Antennae quatuor ſubaequales.
exteriores paullo breuiores, ſetaceae, multiarticulatae ſub margine frontis prominente ad oculos inſertae: articulo primo globoſo, ſecundo maiori, ouato, tertio cylindrico, reliquis numeroſis, breuiſſimis.
interiores complicatae in foueola ſub capitis margine abſconditae, approximatae, quadriarticulatae: articulo primo breuiſſimo, globoſo, ſecundo longiori, obconico, tertio longiori compreſſo, interne canaliculato, quarto falcato, corneo in canali articuli tertii recondendo.

CALAPPA.

Os mandibulis, palpis maxillaque quadruplici.
Maxilla exterior oſſea, os inferne obtegens, inſidens articulo oſſeo transuerſo, plano, ſemiorbiculato, ſub chelis inſerto, ſemiobtecto, utrinque ciliato: ciliis inferioribus reflexis, bifida: lacinia interiore multo maiore lanceolato oblonga, ſubfornicata, verſus baſin extrorſum arcuata, ultra medium geniculata, margine interiori crenato, ciliato, verſus apicem palpigero.
Palpus breuis, corneus, in canali laciniae recondendus, biarticulatus; primo latiore, ſecundo longiore, interne canaliculato.

Lacinia exteriore minore, triquetro lineari, lus apicem parum anguſtata, ad baſin ob lete geniculata, apice emarginata, pi gera.

Palpus flagelliſórmis, membranaceus, ſetac longitudine dimidiae laciniae: articulo p mo maiori, ouato, incuruo, reliquis merofis, breuiſſimis, decreſcentibus.

Palpi intermaxillares porrecti, bifidi: lacinia teriore cornea, breuiore, craſſiore, curſiformi, quinquearticulata: articulo mo breui, transuerſo, ſecundo longiſ tertio ouato, incúruo, quarto quadr quinto orbiculáto, ciliató: lacinia exteri multo longiore, tenuiore, membrana flagelliformi, multarticulata: articulo p mo longiſſimo, usque ad oculos porrec ſecundo ouato, incuruo, reliquis breu mis, numeroſis, decreſcentibus, ſupra man dibulas incumbentibus.

Maxilla ſecunda trifida: lacinia interiore breu ma, cornea, rotundata, ciliata, interm dia multo maiore, dilatata, fornicata, m gine interno rectiore, ciliato ſerieque ob qua ſetarum in latere externo, exteriore el gata, ultra mandibulas porrecta, plana, ſea, in medio membranacea, apice ob lanceolata, obtuſa, in foſſula propria ſe culos recondenda, baſi exteriore palpig

Palpus membranaceus, flagelliformis, multiar culatus: articulo primo longiſſimo, usq

ad oculos porrecto, ſecundo ouato, inflexo, reliquis numeroſis, decreſcentibus, vix conſpicuis.

xilla tertia ſubmembranacea, trifida: lacinia interiore tenuiſſima, cylindrica, obtuſa, intermedia maiore, rotundata, fornicata, apice bifida, exteriore breuiore, tenuiore, cornea, unguiformi.

xilla quarta ſubmembranacea, bifida: lacinia interiore apice dilatata, fornicata, truncata, ciliata, exteriore longiore, ad baſin latiore, fornicata, medio ſubgeniculata, apice anguſtiore, elongata, reflexa, ſubulata.

bium mandibulis arcte appreſſum, rotundatum, integerrimum in ſinu mandibulae inferiore inſertum.

ndibula oſſea, utrinque ſinuata: ſinu ſuperiori palpigero, ſinu inferiori labiigero, apice dilatata, fornicata angulo acuto.

alpus breuis, triarticulatus in mandibulae apice fornicato recondendus.

ntennae quatuor ſubaequales: interiores palpiformes, quadriarticulatae: articulo primo maiori, gibbo, ſecundo tertioque tenuioribus, longioribus, cylindricis, ultimo breui, bifido, exteriores ſetaceae: articulo primo maiori, ouato in cantho ſub oculis inſertae.

OCYPODE.

Os mandibulis, palpis maxillaque quatrupli
Maxilla exterior cornea, os obtegens bifid
nia interiore maiore, plana, oblongo
pone medium geniculata, apice palp
Palpus corneus, compreſſus, triarticulatus:
culo primo ſecundoque breuioribus di
cis, tertio unguiformi, arcuato, acu
intús dentato.

Lacinia exteriore triplo breuiore, ſetacea, re
ſana, rigida, acutiſſima.

Palpi intermaxillares porrecti, ſubcornei,
lacinia interiore latiore, quadriarticulat
ticulo primo breuiſſimo, ſecundo lo
mo depreſſo, intus ſubdilatato ciliato,
tio ouato, incuruo, ultimo rotundato,
ato, lacinia exteriore multo longiore,
branacea: articulo primo longiſſimo a
ato, ſubarcuato, bifido; plana ext
ſubulata, acuta, breui, interiore paul
giore, ſetacea, multiarticulata.

Maxilla ſecunda bifida: lacinia interiore br
ma, rotundata, cornea; ciliata, ext
membranacea longiore, incurua, for
apice truncata, ciliata, baſi exterior
pigera.

Palpus maxillae baſin adhaerens, paullo lon
articulo primo longiſſimo, membran
ſecundo bifido: laciniis breuibus, acu

bus; exteriore craſſiore, obtuſiore, interiore multiarticulata, ſubulata.

illa tertia trifida: lacinia interiore membranacea, dilatata, fornicata, bifida; pinna interiore rotundata, exteriore longiore, apice dilatata, truncata, lacinia intermedia breviore, unguiformi, cornea, arcuata, acuta, lacinia exteriore breui, membranacea, rotundata.

illa quarta mandibularum baſin tegens bifida: lacinia interiore fornicata, apice dilatata, oblique truncata, ciliata, exteriore extus rotundata, in medio coarctata, apice late emarginata.

bium breue membranaceum mandibulis arcte adhaerens.

ndibula oſſea, utrinque ſinuata, apice fornicata, rotundata, palpigera.

lpus in ſinu interiore inſertus, compreſſus, triarticulatus: articulis ſubaequalibus, ultimo rotundato.

tennae duae breuiſſimae, ſetaceae, in cantho oculorum interiore inſertae, articulo primo ſecundoque craſſioribus, longioribus, ouatis, reliquis numeroſis, ſetaceis, breuiſſimis.

LEUCOSIA.

mandibulis, palpis maxillisque triplici.

xilla exterior oſſea, bifida: lacinia interiore lanceolata, ultra medium geniculata, apice oblongo triangulari, ante apicem palpigera:

margine interiore canaliculato ad re-
nem palpi.

Palpus tenuis, corneus, ſetaceus, quinq-
culatus in canali marginis recondend-
ticulo primo globoſo, craſſiore, reliq-
uibus, ſubaequalibus.

Lacinia exteriore minore lineari lanceolat-
ſin geniculata, apice obtuſa, ciliata.

Palpi intermaxillares porrecti, bifidi: lac-
teriore cornea, latiore, depreſſi,
fere ſecuriformi, quinquearticulata:
lo primo breuiſſimo, tranſuerſo,
longiſſimo, tertio obouato, incuruo,
to quadrato, quinto rotundato, cili-
teriore membranacea ſubflagelliform-
culo primo longiſſimo, depreſſo, lin-
ceolata, ſecundo ouato, incuruo,
numeroſis, decreſcentibus, vix co-

Maxilla ſecunda trifida: lacinia interiore
ouata, tranſuerſa, parum ciliata,
dia multo maiore, cornea, dilatata,
nicata, ouatotriquetra, ciliata,
duplo longiore, depreſſa, cuneata
rotundata.

Palpus maxillae ſecundae baſi exteriori adh-
ſubflagelliformis: articulo primo min-
cundo longiſſimo, lineari, reliquis nu-
ſis, vix conſpicuis.

Maxilla tertia mandibulis adhaerens, trifid-
ciniis lateralibus aequalibus, longioribus
ſi cylindricis, apice dilatatis, rotund-

ermedia breuiore unguiformi cornea, ar-
uata, acuta.

breue membranaceum, mandibularum ba-
n tegens.

bula oſſea, utrinque ſinuata, apice dilata-
a, fornicata, intus palpigera denteque me-
dio acuto.

compreſſus, breuis, obtuſus, intra man-
dibulam fornicatam recondendus articulis
tribus ſubaequalibus.

nae duae palpiformes in foueolis ſub fronte
prominente recondendae, quadriarticula-
tae: articulis cylindricis, ſubaequalibus, ul-
timo arcuato, acuto, corneo, ſetis op-
poſito.

Leucoſiae chelis ouatis e. g. globoſa os ge-
runt latius, maxillae exterioris laciniam ex-
teriorem interiori multo maiorem, omnes
oris partes internas magis ciliatas, maxil-
lae ſecundae lacinias exteriores longiores,
haud cuneatas, ſed lineari lanceolatas, fle-
xuoſas, membranaceas, ſtriatas, quarum
margini exteriori ſub medio inſidet palpus
lacinia triplo breuior. Forte proprii generis.

PARTHENOPE.

mandibulis, palpis maxillaque quatruplici.

illa exterior os obtegens, oſſea, bifida: laci-
nia interiore maiore, intus fornicata, ante
apicem geniculata, margine externo canali-
culata, baſi rhomboidooblonga, extus ca-

naliculata: margine interiore tenuiore nato, apice latiore ſubquadrata, angu- cis exteriore dilatato, rotundato, angulo apicis interiore emarginato, ro, margine infimo canaliculato ad tionem palpi; canalis margine liato.

Palpus oſſeus, triarticulatus: articulo pri- ui, ſecundo maiore, obconico, giore ſubarcuato, acuto ciliato.

Lacinia exteriore minore, lineari triquetra ad baſin obſolete geniculata dente nente triangulari ante apicem mar- rioris, apice palpigera.

Palpus flagelliformis, membranaceus, inflexus, tenuiſſimus, multiarticu- ticulo primo maiore, reliquis de- bus, vix conſpicuis.

Palpi intermaxillares porrecti, bifidi: la- teriore cornea, ſubcompreſſa, qui- culata: articulo primo breui, ſecundo longiſſimo, tertio obouato, uo, quarto transuerſo, apice ciliato. to rotundato, ciliato, exteriore mi ſubmembranacea: articulo primo ſimo, ſecundo ouato, reliquis nu- decreſcentibus vix conſpicuis.

Maxilla ſecunda trifida: lacinia interiore breui, ouata, ciliata ad baſin inciſa, multo maiore, dilatata, cornea, ciliata ſerieque ſetarum extus ante ma-

interiorem, exteriore membranacea, longiſſima, depreſſa, verſus apicem dilatata, triangulari: margine ſupero et interiori ciliatis, baſi exteriori palpigera.

ur membranaceus, flagelliformis: articulo primo longiſſimo, lineari, ſecundo ouato, incuruo, reliquis numeroſis, decreſcentibus, vix conſpicuis maxillae dorſo adhaerens.

illa tertia quadrifida: lacinia interiore ouata, minuta, ciliata, ſecunda longiori, cornea, unguiformi, arcuata, acuta, tertia multo longiore, plana, extrorſum latiore, apice truncata, ciliata, exteriore minuta, obſoleta, obouata.

illa quarta ſubcornea, trifida: lacinia interiore anguſta, plana, incurua: margine exteriore ciliato, intermedia maiore, ſubfornicata, extrorſum latiore, apice oblique truncata, ciliata, exteriore breuiſſima, ouata, ciliata.

ium breue, membranaceum, mandibulis arcte adhaerens.

dibula oſſea utrinque ſinuata, apice dilatata, fornicata intus palpigera.

pus compreſſus, ciliatus, quadriarticulatus: articulo ultimo longiore, arcuato.

ennae quatuor ſubaequales.

xteriores ſetaceae in cantho ſub oculis inſertae: articulo primo breuiſſimo, rotundata, ſe-

cundo tertioque maioribus obconicis, quis breuiſſimis, numeroſis, ſetaceis, interiores palpiformes, complicatae, roſtri lateris inferioris latentes, quadlatae: articulo primo ouato, breui, do tertioque longioribus, cylindricis, breuiori bifido; lacinia interiore breui, tiarticulata, exteriore bifida: pinnis

INACHUS.

Os mandibulis, palpis maxillaque triplici.

Maxilla exterior oſſea, os obtegens, bifida, nia interiore maiore intus ſubfornicata, ſus apicem geniculata ſutura obliqua, xuoſa, baſeos margine intimo tenuiore, ſulcato intus crenato, extus ciliato, angulo exteriore acuminato, interiore, pigero: margine late canaliculato ad tionem palpi.

Palpus in canali marginali recondendus, ſe- breuis, quadriarticulatus: articulo maiore, tranſuerſo, ſecundo ouato, conico, quarto ſubulato, minimo,

Lacinia exteriore minore, lanceolata, acu- quetra, apice palpigera.

Palpus flagelliformis, ſetaceus, ſubmembr- us, ſtyli parum breuior: articulo primo giore, compreſſo, reliquis decreſcen- vix conſpicuis.

Palpi intermaxillares porrecti, bifidi: lacinia riore cornea, ſubcompreſſa, quinque

lata: articulo primo breui, transuerſo, ſecundo longiſſimo, tertio obouato, incuruo, quarto transuerſo, apice ciliato, quinto rotundato, ciliato; exteriore ſubmembranacea, flagelliformi: articulo primo longiſſimo, compreſſo, intus ciliato, verſus apicem attenuato, ſecundo ouato, incuruo, reliquis numeroſis, decreſcentibus, vix conſpicuis.

xilla ſecunda trifida: lacinia interiore minima, ouata, ciliata, intermedia multo maiore, cornea, apice dilatata, ſubfornicata, ciliata ſerieque ſetarum in latere exteriore ad marginem internum, exteriore multo longiore, membranacea, baſi cylindrica, medio coarctata, apice dilatata, triangulari, ciliata.

pus baſin exteriorem maxillae ſecundae adhaerens membranaceus, flagelliformis: articulo primo longiſſimo, depreſſo, utrinque membrana, ciliata, verſus apicem decreſcente aucto, ſecundo ouato, incuruo, reliquis numeroſis, decreſcentibus, vix conſpicuis.

axilla tertia trifida: lacinia interiore elongata, baſi cylindrica, apice rotundata, fiſſa, intermedia breuiore, cornea, unguiformi, arcuata, acuta, exteriore extrorſum dilatata, oblique truncata, ciliata.

bium breue, membranaceum mandibulis arcte adhaerens.

Mandibula oſſea utrinque ſinuata, apice di-
fornicata, intus palpigera denteque
porrecto acuto.

Palpus compreſſus infra mandibulae denten-
tus, quadriarticulatus: articulis tribus
qualibus, ultimo longiore obtuſo.

Antennae quatuor aequales.

exteriores ſetaceae intra roſtri denticulum
tae: articulo primo longiore, ouato,
do minore, obconico reliquis numer-
uiſſimis, vix conſpicuis.

interiores palpiformes in fouea lateris in-
roſtri recondendae, compreſſae, tri-
tae: articulo primo craſſiore, ouato,
uo, ſecundo breuiore, ultimo chela
lice arcuato, unguiculato, digito
quinquearticulato.

DROMIA.

Os palpis maxillaque quadruplici absque lab-

Maxilla exterior bifida:

Lacinia interiore maiore, fornicata, me-
culata: parte inferiori longiori, an-
interne acute denticulata, ſuperiori
terno emarginato ad inſertionem palpi.

Palpus corneus elongatus, hirtus, triarti-
articulo primo et ſecundo ouatis, ter-
cuato, unguiformi, ciliato, ſubulato.
tiſſimo.

Lacinia exteriore flagelliformi ſtylo ſublineari
ſim obſolete geniculato, apice palpiger-

lpus elongatus, ſetaceus, membranaceus: articulo primo longiore, craſſiore, inflexo, reliquis breuiſſimis, numeroſis, decreſcentibus.

pi intermaxillares duo porrecti, ſubmembranacei, bifidi.

inia interiore quinque articulata: articulo primo breui, transuerſo, ſecundo longiſſimo, depreſſo, intus ciliata, tertio incuruo, quarto et quinto rotundatis: ciliatis.

inia exteriore flagelliformi: articulo primo longiſſimo, ſecundo incuruo, reliquis numeroſis, decreſcentibus.

xilla *ſecunda* ſubmembranacea, trifida: lacinia interiore breui ouata, hirta, intermedia multo longiore, dilatata, fornicata, ciliata, exteriore adhuc longiore, compreſſa apice cylindrica, concaua, palpum vaginante.

lpus baſin exteriorem adhaerens, flagelliformis: articulo primo longiſſimo, ſecundo incuruo, reliquis numeroſis decreſcentibus, ciliatis.

xilla tertia membranacea, trifida: lacinia interiore fornicata, bifida; pinna interiore rotundata, ciliata, exteriore ſubulata, acutiſſima, intermedia dilatato clauata, ciliata, fiſſa, exteriore fornicata apice unguiculata, acutiſſima.

xilla quarta membranacea, trifida: lacinia interiore annulata, fornicata, apice inaequa-

li, rotundata, ciliata, intermedia paulo
iore, apice dilatata, oblique truncata,
ta, exteriore baſi fornicata, in medio
culata, apice tenuiore, compreſſa,
ſa, ciliata.

Labium membranaceum, breue, mandibularum
ſin tegens, ouatum, ciliatum.

Mandibula oſſea, utrinque ſinuata, apice di
fornicata, intus palpigera.

Palpus in ſinu mandibulae inſertus, triarticu
articulo primo breuiſſimo, ſecundo in
tertio compreſſo, ciliato.

Antennae quatuor inaequales.

exteriores longiores, ſetaceae, ſub oculis
tae: articulo primo breuiſſimo, ſecun
tioque longioribus, compreſſis, hir
quis breuiſſimis, numeroſis.

interiores palpiformes quadriarticulatae:
culo primo craſſiore, ouato, hirto,
to, interne canaliculato ad reception
liquorum, ſecundo et tertio cylindric
timo bifido: lacinia interiore recta,
ta, multiarticulata, exteriore bifida:
exteriore craſſiore, incurua, interior
ui, ſubulata.

DORIPPE.

Os palpis, mandibula maxillaque triplici.

Maxilla exterior oſſea, bifida: lacinia ex
minore, anguſta, acuta, mutica, in
maiore, ſubfornicata, in medio geni

intus ultra medium ſubdentata, apice palpigera, canaliculata ad receptionem palpi.

...us triarticulatus: articulo primo incuruo, ſecundo cylindrico, tertio unguiformi, incuruo, acuto, piloſo.

...pi intermaxillares porrecti, membranacei, bifidi: lacinia interiore articulis quinque: primo breui, transuerſo, ſecundo longiſſimo, depreſſo, intus ciliato, tertio incuruo, quarto et quinto rotundatis, ciliatis, exteriore flagelliformi: articulo primo longiſſimo, ſecundo incuruo, reliquis breuibus, numeroſis, decreſcentibus.

...xilla ſecunda cornea, trifida: lacinia interiori breui, rotundata, ciliata, intermedia paullo longiore rotundata, fornicata, ciliata, exteriore elongata, baſi cornea, depreſſa, flexa, extus palpigera, apice oſſea, plana, conica, acuta inter antennas adſcendente.

...pus baſin dorſi adhaerens, flagelliformis, membranaceus: articulo primo longiſſimo, ſecundo incuruo, reliquis breuibus, numeroſis, decreſcentibus.

...xilla tertia trifida: lacinia exteriore fornicata, apice dilatata, ciliata, intermedia breuiore, unguiformi, cornea, arcuata, acuta.

...bium mandibulis arcte adhaerens, membranaceum.

...ndibula oſſea breuis utrinque ſinuata, apice dilatata, fornicata, palpigera.

Palpus in ſinu mandibulae inſertus, breuis, preſſus, triarticulatus: articulis aequ ciliatis.

Antennae quatuor aequales.

exteriores adnatae margini ſuperiori foue antennae interiores inſertae ſunt, ſe piloſae, acutae: articulo primo breu orbiculato, ſecundo tertioque longi craſſioribus, cylindricis, reliquis breu numeroſis.

interiores palpiformes in fouea ſub exteri inſertae: articulis quatuor; primo g ſecundo tertioque cylindricis longior quarto breuiore bifido: lacinia ſuperio curua, ſubulata.

ORITHYIA.

Os mandibulis, palpis maxillaque triplici.

Maxilla exterior oſſea, bifida: lacinia int oblonga, plana, ciliata, extus obſol naliculata, intus ſubexcauata, in med niculata, apice palpigera.

Palpus compreſſus, oſſeus, ſetaceus, pa liatus, triarticulatus: articulo primo b ſecundo longiore, tertio adhuc lon arcuato, acuto.

Lacinia exteriore lanceolata, acuta, mutic.

Inſtrumenta cibaria reliqua haud rite examina

Antennae quatuor inaequales.

exteriores breuiſſimae, ſetaceae in cantho riori oculi inſertae: articulo primo lo

mo, cylindrico, reliquis innumeris, breuiſſimis.

[Pos]teriores duplo fere longiores, palpiformes; quadriarticulatae: articulo breui, ouato, ſecundo tertioque longioribus, cylindricis, quarto breuiſſimo ſubulato, bifido: lacinia interiore breuiore.

PORTUNUS.

[Os] mandibulis, palpis maxillaque triplici.

[Ma]xilla exterior oſſea, os obtegens, bifida: lacinia interiore maiore, plana, pone medium geniculata, margine interno ciliato baſi extus uniſulcata, apice rotundata, ſinuata, palpigera.

[Pal]pus oſſeus laciniae apici interno adnatus, quadriarticulatus: articulo primo latiore, ſecundo breuiſſimo, obſoleto, tertio cylindrico, quarto tenuiore, arcuato, denticulato, acuto.

[La]cinia exteriore flagelliformi: ſtylo oblongo lineari ad baſin obſolete geniculato, margine interno canaliculato, apice obtuſo, palpigero.

[P]alpus membranaceus, incuruus, ſetaceus, multiarticulatus, articulo primo craſſiore longiore, inflexo, reliquis numeroſis, breuibus, vix conſpicuis, decreſcentibus.

[P]alpi intermaxillares duo porrecti, bifidi: lacinia interiore cornea, compreſſa, quinquearticulata: articulo primo breuiſſimo, ſecundo

longiſſimo, tertio incuruo, quarto late
periore dilatato, ciliato, quinto rotun
ciliato, exteriore flagelliformi, ſubme
nacea: articulo primo longiſſimo, ſe
ouato incuruo, reliquis numeroſis,
centibus, ciliatis.

Maxilla ſecunda trifida: lacinia interiori
cornea, ouata, ciliata, ad baſin inciſa,
dia multa maiore, dilatata, cornea,
fornicata, ciliata ſerieque ſetarum ad
ginem interiorem, exteriori longiſſima,
branacea, baſi cylindrica, apice intus
tati, ciliata.

Palpus baſin exteriorem adhaerens longior,
branaceus, flagelliformis: articulo
longiſſimo, lineari, ſecundo incuruo,
to, reliquis numeroſis decreſcentibus,
conſpicuis, ciliatis.

Maxilla tertia mandibularum baſin tegens
branacea quadrifida: lacinia interiore
cata, apice dilatata, rotundata, fiſſ
rum ciliata, lacinia ſecunda breviori
formi, cornea, arcuata, acuta, laci
tia multo longiore fornicata, verſus a
oblique truncata, ciliata, dilatata,
exteriore baſi ouata, apice cylindrica.

Labium mandibulis arcte adhaerens, mem
ceum.

Mandibula oſſea, utrinque ſinuata, apice
to fornicata, intus palpigera.

Palpus compreſſus, ciliatus, quadriarticulatus: articulis breuibus, ouatis; ultimo longiore, incuruo.

Antennae quatuor inaequales: exteriores longiores ſetaceae ſub frontis margine prominente in foueola propria inter oculos et antennas interiores inſertae; articulo primo ſecundoque craſſioribus, ouatis, reliquis numeroſis, breuiſſimis. Interiores breuiores palpiformes, quadriarticulatae: articulo primo rotundato ſecundo tertioque longioribus cylindricis, ultimo breui, bifido: lacinia exteriore longiore, acuta, baſi geniculata.

MATUTA.

Os mandibulis, palpis maxillaque triplici.

Maxilla exterior oſſea arctiſſime os claudens, plana, bifida: lacinia interiore maiore, ouato lanceolata, ultra medium geniculata; ſutura transuerſa, recta, apice margine interno craſſiore canaliculato ad receptionem palpi, ante apicem palpigera.

Palpus interne ſub apice maxillae inſertus et in canali marginis recondendus, compreſſus, ſupra hirtus, triarticulatus: articulo primo longiori, cylindrico, incuruo, reliquis aequalibus, obtuſis, compreſſis.

Lacinia exteriore multo breuiore ſubulata: margine interiore ſubrecto, canaliculato, exteriore arcuato, ſubciliato tenuiore, apice ſetigera.

Palpi intermaxillares porrecti bifidi: lacinia
riore ſecuriformi, latiore, compreſſa,
nea, quinquearticulata: articulo primo
uerſo, breui, interne ciliato, ſecundo
giſſimo, interne ciliato, tertio breuiore
ouato, incuruo, quarto quadrato, un
ciliato, quinto minore rotundato, c
exteriore longiore: articulo primo lon
mo, depreſſo, lineari lanceolato, a ba
medium marginis exterioris oblique co
deinde membranaceo, ſecundo inflexo,
tio tenuiore, flexili, ſetaceo, ſetae bre
oppoſito.

Maxilla ſecunda trifida: lacinia interiore mi
ouata, ciliata, intermedia multo m
cornea, fornicato dilatata, ciliata, ſe
ſetarum ad marginem internum later
terioris, exteriore elongata, plana, ou
cornea, canaliculata, apice membra
foliacea, oblonga, obtuſa, ciliata, in
dio geniculata, ſtriata.

Maxilla tertia mandibularum baſin tegens,
da: lacinia interiore trifida; pinna inte
re rotundato-ouata, breui, intermedia
iore, cylindrica, apice dilatata, rotun
ciliata, exteriore cornea, arcuata,
unguiformi, exteriore quadrifida: pinn
teriori breui, ſubulata, ſecunda long
dilatata, fornicata, apice fiſſa, reliqui
bus ſubaequalibus ſubulatis.

um mandibulis arcte adhaerens, membranaceum.

...dibula oſſea utrinque ſinuata, apice dilatata, fornicata, intus palpigera denteque medio, acuto.

...pus in foſſula media marginis interioris mandibulae inſertus, triarticulatus: articulo primo breuiore, ſecundo cylindrico, tertio ouato, obtuſo.

...ennae duae breues, palpiformes, in cantho oculorum recondendae, quadriarticulatae: articulo primo globoſo, ſecundo cylindrico, incuruo, tertio cylindrico, incuruo, tenuiore, quarto breuiore, incuruo ſubulato, bifido: lacinia exteriore breuiore.

HIPPA.

...mandibulis, palpis maxillaque triplici.

...xilla exterior oſſea os et antennas conuolutas obtegens, ouata lata, fornicata, apice emarginata, palpigera, coſta eleuata in latere concauo interno a baſi ad apicem marginis interioris ducta.

...alpus longitudine labii, triarticulatus: articulo primo breuiore, ſubquadrato, ciliato, ſecundo tertioque aequalibus, ciliatis, obtuſis, linearibus, parum arcuatis, in emarginatura labii inſertus.

...alpi intermaxillares porrecti, bifidi: lacinia interiore flagelliformi, multiarticulata: articulo primo breuiſſimo, obſoleto, ſecundo lon-

giſſimo, lineari, arcuato, utrinq
longioribus ciliato, tertio obouato,
reliquis numeroſis, breuiſſimis, de
tibus, lacinia exteriore plana, me
cea, multo breuiore, triarticulata:
lis fere aequalibus, primo verſus baſ
re, ſecundo lineari, anguſtiore, ter
to ciliato.

Maxilla ſecunda ſubcornea, bifida: laci
riore breuiore fornicata: margine
ſerrato apice acuto, exteriore longiore
xa, plana, dorſo ciliata, medio gen
baſi anguſta, lineari, apice latiore
ta, elongata, ſubulata.

Maxilla tertia ſubcornea trifida: lacinia in
fornicata, lata, breuiore, apice inn
oblique truncata, ciliata, lacinia
dia longiore, anguſtiore, apice rot
integra, exteriore breuiſſima, apice
Labium mandibulis arcte adhaerens, mem
ceum.

Mandibula breuis, cornea, fornicata, obt
ſo palpigera.

Palpus ſetaceus, tenuis, uti videtur mul
latus.

Antennae quatuor pedunculatae, inaequal
interiores ſuperne inter oculorum ped
inſertae, triplo breuiores, bifidae:
aequalibus, compreſſis, ſetaceis,
ticulatis, utrinque ciliatis.

nculus triarticulatus: articulo primo minuto, ſecundo multo maiore cordato; apice externo elongato, ſetigero: ſeta longiore ſubulata, apice altero breuiore, antennifero, tertio minuto in apice interno breuiore articuli ſecundi poſito.

xteriores ſub oculis ad latera frontis inſertae, longiores, craſſae, filiformes, conuolutae ſub maxilla exteriore recondendae, extrorſum bifarie longius ciliatae.

lus quadriarticulatus: articulis inaequalibus; primo reliquis breuiore, craſſiore, ſecundo longiore, apice exteriore dilatato, tridentato: dente intermedio longiore, tertio ouato, articulo ſecundo ſub apice marginis interioris adhaerente, margineque exteriore inciſo, quarto reliquis multo tenuiore, obconico: margine exteriore carinato, ciliato.

SYMETHIS.

mandibulis, palpis maxillaque triplici.

axilla exterior oſſea, os arctiſſime claudens, bifida: lacinia interiore maiore, ſubfornicata, verſus apicem latiore, ſupra medium geniculata, ſutura transuerſa ſubundulata, apice emarginata ad inſertionem palpi.

alpus minutus in emarginatura laciniae inſertus videtur, mihi haud rite obſeruatus.

acinia exteriore breuiore, oblonga margine interiore craſſiore, ciliato.

Palpi intermaxillares, porrecti, bifidi: laci
teriore ſubſecuriformi, craſſiore,
quinquearticulata: articulo primo
transuerſo, ſecundo longiſſimo intus
tis, tertio breui, obouato, incuruo,
to quadrato, ſuperne ciliato, quin
culato, ciliato, lacinia exteriore lon
membranacea, depreſſa, parum arcu
articulata, pennacea ſiue utrinque
ciliata, obtuſa.

Maxilla ſecunda trifida: lacinia interiore
lanceolata, acuta: margine interno,
to, ad baſin ciliato, intermedia corn
giore, unguiformi, acutiſſima, ex
longiſſima, membranacea, compreſſa,
flexa, apice acuta.

Maxilla tertia minore, mandibularum baſi
gens, ſubcornea, trifida: lacinia int
breui ad baſin longius ciliata, tenui,
intermedia longiore, verſus apicem dil
fornicata, apice oblique truncata,
exteriore breui, plana, acuta.

Labium mandibulis arcte adhaerens, membr
ceum, rotundatum.

Mandibula oſſea, flexa, utrinque ciliata,
dente maiori, acuto, apice dilatata,
cata, palpigera denteque medio acuto.

Palpus in ſinu ſuperiori ante apicem mandi
inſertus, breuis, compreſſus: articulis
tuor, ultimo rotundato.

mae duae breuiſſimae ſub roſtro intra valuu-
las duas roſtri longitudine bifidas, arctiſſime
claudendas reconditae, quadriarticulatae: ar-
ticulo primo breuiſſimo, ſecundo craſſiori,
ouato tertio cylindrico piloſo, quarto plano,
quadridentato, reflexo.

LIMULUS.

mandibulis, palpis maxillaque quintuplici.
xilla exterior breuiſſima, oblonga, integra,
intus ciliata; haud palpigera.
xillae quatuor reliquae maiores, ouatae, ſpino-
ſae, integrae dorſo palpigerae.
pi utrinque quatuor.
xteriores tres aequales, quadriarticulati: arti-
culo primo breui, ſecundo ouato, tertio
apice incuruo, quarto chela elongata, fili-
formi, edentula, adhaerentes maxillarum
dorſo.
iterior longitudine fere aequalis, quadriarticu-
latus: articulo primo breui, ſecundo maio-
ri ouato, tertio maris incraſſato, quarto ſu-
bulato adnatus maxillae interioris dorſo.
bium breue, membranaceum, rotundatum, in-
tegrum mandibulis arcte adhaerens.
ndibula magna porrecta, in medio geniculata,
chela elongata, filiformi, edentula.
tennae nullae.
racter hic naturalis adhuc claudicat.

CANCER. *Antennae* quatuor ſu
quales.
interiores complicatae
proximatae in fo
ſub capitis margin
ſconditae.
exteriores ſetaceae
margine frontis p
nente inſertae.

* *Corpore gibbo: lateribus inaequalibus*

Pagurus. 1. C. thorace laeuiuſculo utrinque nouemp
manibus apice atris. Ent. ſyſt. 2. 452. 49.
ſyſt. Nat. 2. 1044. 27. Fn. Su. 2036.
Ad. Fr. 1. 85.
Penn. Zool. Brit. 4. tab. 3. fig. 7.
Bradl. natur. tab. 3. fig. 4.
Rumph. Muſ. tab. 11. fig. 4.
Gronov. Zooph. 967.
Habitat in Oceano Europaeo et Indico.

11dentatus. 2. C. thorace ſublaeui utrinque undecim de
dentibus crenulatis, roſtro tridentato,
tis apice atris. Ent. ſyſt. 2. 453. 51.
Cancer undecimdentatus. Herbſt. Cancr. 181.
tab. 10. fig. 60.
Habitat in America boreali.

Maenas. 3. C. thorace laeuiuſculo utrinque quinqued
to, fronte triloba, carpis unidentatis.

Pedes huius generis omnes unguiculati — curt

yſt. 2. 450. 41. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1043. 22.
Muſ. Lud. Ulr. 436. Fn. Su. 2026.
iv. Amb. tab. 1. fig. 5.
. ſubſ. 2. 19. tab. 2.
mph. Muſ. tab. 6. fig. O.
n. Zool. Brit. 4. tab. 2. fig. 5.
bitat in Oceano Europae, Aſiae.

thorace laeuiuſculo utrinque quinquedentato, fronte fiſſa. *tinctor.*
bitat — — —
tura C. Maenas at paullo minor. Frons transuerſa, in medio fiſſa. Orbita oculorum tridentata. Thorax laeuiuſculus lateribus utrinque quinquedentato. Chelae breues, carpi unidentati, manus breues, apice inferiori nigrae digitis longioribus atris.

C. thorace laeuiuſculo utrinque quadridentato, fronte fiſſa. *pictor.*
Habitat — — —
Affinis praecedenti at paullo minor et diſtinctus. Frons magis rotundata, apice fiſſa. Orbita oculorum eleuata, inermis. Thorax breuiuſculus, utrinque quadridentatus. Chelae breues. Carpi ſubbidentati. Manus breues margine eleuato. Digiti breues, fuſci. Pedes breues, compreſſi margine dorſali carinato.

C. thorace rugoſiſſimo obtuſo utrinque quadrilobo. Ent. Syſt. 2. 455. 56. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1048. 54. Muſ. Lud. Ulr. 451. *aeneus.*
Seb. Muſ. 3. tab. 19. fig. 17.

Rumph. Amboin. tab. 11. fig. 4.

Habitat in India.

Rumphii. 7. C. thorace laeuiuſculo utrinque quinque-
to, fronte tuberculata quadridentata,
laeuibus.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

C. Maenas paullo minor. Frons ſupra
culis aliquot eleuatis, obtuſis adſpera
gine quadridentato: dentibus laterali-
noribus. Orbita oculorum quadri-
Thorax utrinque quinquedentatus. C
breues, craſſae, inermes. Carpi
dentati. Manus breues laeues digitis
bus, atris. Pedes apice piloſi.

ſcaber. 8. C. thorace laeuiuſculo utrinque quinqued-
to, fronte crenata fiſſa, manibus gra-

Habitat in India orientali Dom. Daldorff

Paruus. Frons transuerſa, crenata,
fiſſa. Thorax laeuiuſculus, antice
tus lateribus utrinque quinquedenta-
lorum orbita crenata, ſubtus bid-
Chelae inaequales altera ſemper maior
dextra, mox ſiniſtra absque diſcrimi-
xus, breues carpis manibusque gra-
Digiti breues, nigri.

paruulus. 9. C. thorace riuuloſo utrinque quadriden-
fronte ſubfiſſa. Ent. ſyſt. 2. 451. 43.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis
Pflug.

Minutus. Frons transuerſa fiſſura paru-
ſa. Thorax antice lateribusque riuu-

utrinque quadridentatus. Chelae breues laeues digitis breuibus, atris.

C. thorace inaequali utrinque acute ſexdentato, manibus noduloſis. Ent. ſyſt. 2. 466. 94. *. *Gonagra.*

Habitat in Iamaica Muſ. Dom. Banks.

C. thorace undique noduloſo crenato, pedum digito ſpinoſo Ent. ſyſt. 2. 466. 95. * *noduloſus.*

Habitat — — Muſ. Dom. Banks.

Huius generis videtur.

C. thorace laeui utrinque quadrituberculato, fronte deflexa canaliculata, manibus tuberculatis. Ent. ſyſt. 2. 455. 58. *ochtodes.*

Herbſt. Cancr. 138. 66. tab. 8. fig. 54.

Habitat in India orientali.

Frons deflexa, in medio valde canaliculata, vix fiſſa, utrinque rotundata. Orbita oculorum vix eleuata, integra. Thoracis latera tuberculis quatuor eleuatis, obtuſis. Chelae tuberculatae. Digiti concolores.

In iunioribus thoracis tubercula acutiora et manuum planiora.

C. thorace laeui utrinque biſpinoſo, fronte quadridentata, carpis ſpinoſis. Ent. ſyſt. 2. 446. 27. *2ſpinoſus.*

Herbſt. Cancr. 144. 52. tab. 6. fig. 45.

Habitat in India orientali.

Femora dorſo ſerrata. Manus breues, craſſae digitis breuibus, concoloribus.

C. thorace laeui unidentato, fronte triloba. Ent. ſyſt. 2. 445. 23. *corallinus.*

Herbſt. Cancr. 33. 41. tab. 5. fig. 40.
Seb. Muſ. 3. tab. 19. fig. 2. 3.
Rumph. Muſ. tab. 8. fig. 5.
Habitat in Indiae aquis.

floridus. 15. C. thorace laeui inaequali maculato: margine obtuſe ſerrato; manibus criſtatis. Fabr. ſyſt. 2. 445. 24. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1041. Amoen. acad. 6. 414. 98.
Herbſt. Cancr. 132. 40. tab. 3. fig. 39.
Knorr. Delic. tab. 4. fig. 3.
Seb. Muſ. 3. tab. 19. fig. 18.
Habitat in Indiae aquis.
Huius generis videtur mihi haud rite ne...

maculatus. 16. C. thorace laeui: maculis ſanguineis ... dis, lateribus unidentatis; fronte ... Ent. ſyſt. 2. 447. 29. Linn. ſyſt. Nat. 1042. 18. Muſ. Lud. Ulr. 433.
Petiv. Amb. tab. 1. fig. 8.
Seb. Muſ. 3. tab. 19. fig. 12.
Rumph. Muſ. tab. 10. fig. 1.
Habitat in mari Aſiatico.

veſpertilio. 17. C. thorace antice utrinque tridentato, ... pore hirto Ent. ſyſt. 2. 463. 85. *
Habitat in Indiis Muſ. Dom. Spengler.
Corpus paruum ſupra pilis denſis undique ... ctum, ſubtus laeue, albidum. Thorax ... que dentibus tribus at inter pilos vix con... cuis. Pedes et chelae hirti manuum d... laeuibus.

varioloſus. 18. C. thorace tuberculato utrinque crenato, b... te fiſſa.
Habitat in Oceano Muſ. Dom. Meyer.

Tubercula magnitudine piſi minoris, glabra laeuia, nitida. Margo utrinque crenatus. Chelae intus glabrae, ſubconcauae. Pedes breues, compreſſi margine ſuperiori ciliato dentato, apice piloſo ſpinoſi. Statura C. corallini.

C. thorace utrinque bidentato, tarſis hirtis. *ſetoſus.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Corpus paruum, laeuiuſculum margine utrinque acuto, bidentato. Orbita oculorum haud eleuata. Chelae breues, inermes, piloſae. Pedum tarſi hirti.

C. thorace laeui utrinque quinque dentato: *ſpinifrons.* dente ſecundo tertioque bifidis, fronte manibusque multi ſpinoſis.

Cancer *ſpinifrons* Ent. ſyſt. 2. 455. 55.*

Herbſt. Caner. tab. 9. fig. 58.

Habitat in Oceano Muſ. Dom. Lund.

Obcordati corpore gibbo: lateribus laeuibus antice tantum carinatis.

C. tarſis faſciculato piloſis, digitis bifarie ſer- *ruricola.* ratis. Ent. ſyſt. 2. 440. 7. Linn. ſyſt. Nat. 2. 2040. 11.

Degeer Inſ. 7. 417. 1. tab. 25. fig. 1.

Herbſt. Caner. 2. 119. 37. tab. 3. fig. 36. tab. 4. fig. 37.

Sloan. Iamaic. 1. tab. 2.

Seb. Muſ. 3. tab. 20. fig. 5.

Catesb. Carol. 2. tab. 32.

Habitat in Carolina.

ſenex. 22. C. thorace plica antica, carpis uniſp
digitis ſerratis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Minor. C. ruricola et omnino diſtinctus.
rax laeuis plica unica transuerſa ante o
Chelae breues carpis ſpina ſesquialtera
da, acuta digitis elongatis. Pedes lae
gitis ſerratis.

Variat corpore unicolore et variegato at
ſtincti.

tridens. 23. C. thorace laeui antice utrinque trid
fronte transuerſa integra.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum, glabrum ante oculos u
que dentibus tribus acutis. Frons in
rima. Carpi unidentati manibus lae
Pedes laeues digitis ſerratis.

vocans. 24. C. thorace laeui utrinque unidentato,
approximatis unidentatis. Ent. ſyſt. 2.
25. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1041. 14. Am
acad. 6. 414. 96.

Degeer Inſ. 7. 430. 4. tab. 26. fig. 12.

Rumph. Muſ. tab. 10. fig. 1.

Herbſt. Cancr. 1. 81. 4. tab. 1. fig. 10.

Piſ. Braſ. 77. tab. 78.

Seb. Muſ. 3. tab. 18. fig. 8.

Petiv. Gazoph. tab. 78. fig. 5.

Habitat in Iamaica.

Chelae maris diſſimiles, altera ſemper co
maiore, mox dextra, mox ſiniſtra,
minuta, faeminae aequales, minutae.

C. thorace laeui utrinque bidentato, manibus longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 449. 38. *angulatus.*
Herbſt. Cancr. 1. 85. 6. tab. 1. fig. 13.
Penn. Zool. britann. 4. tab. 5. fig. 10.
Habitat in Oceano Anglico prope Weymouth.

*** *Quadrati corpore gibbo, ſupra plano: margine undique carinato.*

C. thorace antice faſciculato utrinque bidentato. *tetragonus.*
Habitat in India orientali.
Medius. Frons retuſa, inaequalis. Oculi craſſi, cylindrici. Thorax quadratus antico pilis nigris faſciculatis utrinque dentibus duobus acutis, validis. Chelae breues, craſſae brachiis utrinque crenatis; carpis ſcabris, manibus ſublaeuibus. Pedes tibiis compreſſis ante apicem unidentatis.

C. thorace laeui antice utrinque unidentato postice plicato. *quadratus.*
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Praecedente duplo minor. Frons retuſa, inaequalis. Thorax quadratus, laeuiuſculus, glaber utrinque dente acuto et pone dentem margo plicatus. Chelae breues, craſſae, ſublaeues. Pedes tibiis compreſſis, plicatis, ante apicem unidentatis.

C. thorace laeui: lateribus antice uniſpinoſis, fronte truncata. Ent. ſyſt. 2. 446. 28. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1042. 14. *rhomboides.*
Herbſt. Cancr. 1. 84. 5. tab. 1. fig. 12.

Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 31. fig. 2.
Barrel. Icon. rar. tab. 1287. fig. 1.
— — — tab. 1286. fig. 1. 2.
Habitat in mari mediterraneo.

**** *Depreſſi corpore depreſſo plano.*

grapſus. 29. C. thorace utrinque plicato antice bidenta
fronte deflexa, ante apicem quadridenta
corpore variegato. Ent. ſyſt. 438. 2. * Li
ſyſt. Nat. 2. 1048. 53. Am. acad. 4. tab
fig. 10.
Herbſt. Cancr. 125. 33.
— — 124. 32. tab. 3. fig. 33. 34.
Catesb. Carol. 2. tab. 36. fig. 1.
Seb. Muſ. 3. tab. 18. fig. 5. 6.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis.

variegatus. 30. C. thorace laeui utrinque tridentato, fron
ante apicem quadridentata. Ent. ſyſt.
450. 40.
Habitat in Indiis.
Statura et affinitas C. grapſus. Corpus pau
minus, vix plicatum, magis obſcurum utr
que pone oculos tridentatum. Frons mar
gine acuto prominens dentibus quatuor
te apicem latis obtuſiſſimis. Pedes varii
tibiis ante apicem unidentatis. Chelae
ues brachiis apice dentatis manibus laeu

litteratus. 31. C. thorace laeui littera H. impreſſo utrin
tridentato, unguibus compreſſis ciliatis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus magnitudine C. grapſus, depreſſ
laeue, in medio H. diſtincto impreſſ

utrinque crenatum dentibus tribus pone oculos acutis. Frons tranſuerſa margine acuto abſque dentibus. Chelae breues, paruae carpis dente uno alteroue manibus laeuibus. Pedes compreſſi, apice ciliati.

C. thorace ſcabro utrinque quadridentato, antennis frontalibus. Ent. ſyſt. 2. 455. 57. *depreſſus.*
Herbſt. Cancr. 2. 117. 36. tab. 3. fig. 35.
Petiv. Gazoph. tab. 75. fig. 11.
Habitat in mari mediterraneo, americano.
Statura omnino C. grapſi. Corpus planum, ſcabrum, variegatum, in medio utrinque impreſſum, pone oculos utrinque quadridentatum. Frons deflexa margine prominulo, dentato. Antennae oculique ſupra hunc marginem inſertae, anteriores in canali recondendis. Inter antennas dentes duo parui, eleuati, acuti. Pedes pro femore eleuato, femoribus dente ante apicem valido, acuto, tarſis ciliatis: articulo ultimo ſubtus ſerrato.

C. thorace orbiculato laeui integerrimo obtuſo, cauda corporis amplitudine. Ent. ſyſt. 2. 441. 8. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1039. 6. *Piſum.*
Herbſt. Cancr. 295. 15. tab. 2. fig. 21.
Penn. Zool. Brit. 4. tab. 1. fig. 1.
Habitat in mari Britannico, mediterraneo.

C. thorace laeui integerrimo ſubquadrato: margine acutiuſculo, pedibus compreſſis. Ent. ſyſt. 2. 443. 15. Linn. ſyſt. Nat. 2. 2040. 8. Muſ. Ad. Frid. 1. 8. Linn. It. Wgoth. 137. tab. 3. fig. 1. *minutus.*

Herbſt. Cancr. 2. 110. tab. 2. fig. 32.
Scópol. carn. 1133.
Sloan. Iamaic. 2. tab. 245. fig. 1.
Penn. Zool. Brit. 4. tab. 1. fig. 2.
Baſt. ſubſc. 2. 26. tab. 4. fig. 12.
Habitat in Pelago frequens.

puſillus. 35. C. thorace laeui quadrato integerrimo, u unidentatis, Ent. ſyſt. 2. 443. 16.
Herbſt. Cancr. 2. 112. 31.
Habitat in Oceano boreali.
Praecedente quadruplo minor.

plicatus. 36. C. thorace laeui utrinque plicato antice dridentato, fronte carinata.
Habitat in China Dom. Lund.
Paruus. Thorax laeuis, in medio arcu de ci compreſſus. Frons transuerſe carinata gine acuto integro. Margo lateralis antice dridentatus, poſtice plicatus. Carpi dentati.

***** *Obuerſi thorace integro poſtice latiore.*

ſexpes. 37. C. thorace laeui integerrimo, fronte em nata, pedibus ſenis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Paruus thorax laeuis in medio lineolis do impreſſis. Frons deflexa, emarginata. des omnino ſex inermes. Chelae breues, ues altera maiore.

ſemicylindrus. 38. C. thorace laeui integerrimo, fronte defl bifida.

Habitat in Oceano indico Dom. Daldorff.

Corpus paruum, gibbum, laeue, in medio lineola duplici impreſſum. Frons deflexa, bifida laciniis rotundatis, ciliatis. Chelae breues, inermes manibus ouatis, laeuiſſimis.

C. thorace antice uniſpinoſo, dorſo canaliculato molliuſculo. Ent. ſyſt. 2. 467. 102. * *auritus.*

Habitat in Islandia Dr. Koenig.

CALAPPA. *Antennae* quatuor ſubaequales.
exteriores ſetaceae in cantho oculi inſertae.
interiores quadriarticulatae, palpiformes: articulo ultimo bifido.

C. thorace laeui crenulato: angulis poſticis dilatato integerrimis, manibus criſtatis. *fornicata.*

Cancer *Calappa* Ent. ſyſt. 2. 454. 54. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1048. 52. Muſ. Lud. Ulr. 449.

Petiv. Gaz. tab. 75. fig. 11.

Seb. Muſ. 3. tab. 20. fig. 7. 8.

Rumph. Muſ. tab. 11. fig. 2. 3.

Habitat in Oceano americano.

C. thorace nodoſo multidentato: angulis poſticis dilatatis crenato dentatis, manibus dentatis. *tuberculata.*

Cancer *tuberculatus* Ent. ſyſt. 2. 454. 53. *

Habitat in Oceano pacifico Muſ. Dom. Banks.

Pedes Calappae omnes unguiculati, curſorii.

granulata. 3. C. thorace ſublaeui crenato: margine dilatato quinquedentato, manibus
Cancer granulatus Ent. ſyſt. 2. 454. 52. ſyſt. Nat. 2. 1043. 26.
Catesb. 2. tab. 36.
Seb. Muſ. 3. tab. 19. fig. 13.
Habitat in Mari mediterraneo.
Aliam vidi in Muſaeo Dom. Herbſt. poſtico ſexdentata, at vix diſtincta.
Cancer Lophos Herbſt. Cancr. fig. 7.

marmorata. 4. C. thorace ſubplicato utrinque tridentato te crenata emarginata, brachiis apice tis dentatis.
Cancer marmoratus Ent. ſyſt. 2. 450. 39.
Herbſt. Cancr. App.
Habitat in Oceano Dom. Herbſt.

criſtata. 5. C. thorace ſubplicato utrinque crenato ne poſtice ſeptemdentato anguloque co dilatato dentato.
Habitat in China Muſ. Dom. Lund.
Statura praecedentium et certe affinis cta dentibus ſeptem validis acutis tis marginis poſtici. Angulus poſticus rius dilatatus tridentatus. Manus dentatae.

Lophos. 6. C. thorace ſubplicato utrinque crenato gine poſtico crenato ſexdentato angulo poſtico dilatato quadridentato.
Cancer Lophos Herbſt. Cancr. fig. 7.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. L.

ſimis praecedentibus. Margo anticus utrinque crenatus angulo poſtico dilatato quadridentato. Margo poſticus crenatus dentibus ſex minoribus, acutis, diſtantibus.

C. thorace laeui utrinque crenato dentato poſtice anguſtato laeui. *anguſtata.*

Habitat in Americae Oceano Muſ. D. Lund.

Statura a reliquis aberrat. Teſta magna laeuis margine utrinque dentato, crenato poſtice anguſtato laeui. Manus parum criſtatae dentatae. Pedes albidi faſciis violaceis.

OCYPODE. *Antennae* duae breuiſſimae, ſetaceae in cantho interiori oculorum inſertae.

O. thorace quadrato crenato, oculis porrectis ſpina terminatis. *ceratophtalma.*

Cancer ceratophtalmus Ent. ſyſt. 2. 439. 6.

Cancer curſor Linn. ſyſt. Nat. 2. 1039. 1.

Herbſt, Cancr. 174. 1. tab. 1. fig. 8. 9.

Pall. ſpic. Zool. 9. tab. 5. fig. 7.

Cancer Uca Linn. ſyſt. Nat. 2. 1041. 13.

Habitat in mari Indico.

In varietate rubra Indorum tarſi antici ſubtus barbati.

O. thorace quadrato laeui: lateribus crenatis, manibus ſcabris. *quadrata.*

Pedes huius generis omnes unguiculati, curſorii.

Cancer quadratus Ent. ſyſt. 2. 439. 5.
Habitat in Iamaica Muſ. Dom. Banks.

rhombea. 3. O. thorace laeuiuſculo utrinque unident

Habitat — — —

Corpus paruum, laeuiuſculum utrinque in . gine acuto ad canthum oculorum in acutum excurrente. Oculi magni, ces. Frons deflexa, integra. Chel chiis crenatis carpis utrinque unide manibus ſublaeuibus.

laeuis. 4. O. thorace laeui utrinque unidentato, laeuiſſimis: dextra maiore.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorf

Corpus paruum, laeue, fuſcum thorace utrinque unidentato. Frons deflexa gra. Oculi ad dentem marginis p cylindrici, ſimplices. Chelae et ped uiſſimae ferrugineae. Chela dextra multo maiore.

minuta. 5. O. thorace laeui utrinque unidentato, laeuiſſimis aequalibus.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorf.

Affinis certe praecedenti at minutus. Oc recti apice craſſiores; ouati. Chelae des flaueſcentes, aequales.

LEUCOSIA. *Antennae* duae palpiformes in foueola ſub fronte prominente recondendae, quadriarticulatae.

* *Chelis ouatis.*

L. thorace depreſſo ſcabro, fronte emarginata. *ſcabriuſcula.*
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus paruum, depreſſum, cinereum punctis paruis, eleuatis, albidis ſcabrum. Frons vix porrecta, emarginata. Chelae elongatae brachiis cylindricis, ſcabris, carpis breuiſſimis manibusque ouatis laeuibus. Pedes reliqui filiformes, laeues.

L. thorace globoſo: dente medio eleuato margineque crenato dentato. *pila.*
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.
Corpus paruum, globoſum, laeue dente unico in medio eleuato, obtuſo. Margo crenatus dentibusque pluribus, maioribus cinctus. Frons obtuſa vel potius truncata, integra. Chelae breues, laeues.

L. thorace laeui ſubcrenato, cauda baſi binodi, brachiis ſcabris. *globoſa.*
Cancer globoſus Ent. ſyſt. 2. 441. 9. *
Herbſt. Cancr. 2. 9. 10.
Habitat ad littora malabarica Dr. Koenig.

Pedes Leucoſiae omnes unguiculati, curſorii.

craniolaris. 4. L. thorace laeui integerrimo ouato glabe-
antice porrecto tridentato, manibus
ubus.
Cancer craniolaris Ent. ſyſt. 2. 441. 10.* Ulr.
ſyſt. Nat. 2. 1041. 15. Muſ. Lud. Ulr.
Petiv. Gazoph. tab. 9. fig. 3.
Seb. Muſ. 3. tab. 19. fig. 4. 10.
Rumph. Muſ. tab. 10. fig. A. B.
Herbſt Cancr. 2. 90. 11. tab. 2. fig. 17.
Habitat ad littora malabarica ubi et fre-
petrificatus inuenitur.

porcellana. 5. L. thorace laeui glaberrimo ouato antice de-
ſo, brachiis granulatis.
Cancer porcellanus Ent. ſyſt. 2. 441. 11.*
Herbſt Cancr. 92. 12. tab. 2. fig. 18.
Seb. Muſ. 3. tab. 19. fig. 11. 12.
Habitat in Oceano Indico.
Aliam miſit Dom. Daldorff ex India fe-
mam at roſtro porrecto, ante apicem
preſſo, inermi. An varietas ſexus?

planata. 6. L. thorace orbiculato plano: lateribus
tatis, fronte tridentata.
Cancer planatus Ent. ſyſt. 2. 446. 26.*
Habitat in Terre del Fuego Muſ. Dom. B
Minuta.

** *Chelis filiformibus.*

punctata. 7. L. thorace ouato poſtice crenato tridenta-
digitis inermibus.
Cancer punctatus Ent. ſyſt. 2. 461. 78.
Brown. Iam. tab. 42. fig. 3.

Habitat in Americae Inſulis.

Corpus magnum, ouatum punctis paruis elevatis ſcabrum. Margo crenulatus poſtice dentibus tribus validis: intermedio ante marginem margine ipſo ſub dente crenatus. Chelae elongatae, filiformes brachiis granulatis. Manus elongatae digitis inermibus.

thorace oblongo poſtice tridentato: dente medio longiore recuruo, digitis dentatis. *fugax.*

Cancer *punctatus.* Herbſt. Canc. 2. 89. 8. tab. 2. fig. 14. 15.

Rumph. Amboin. tab. 10. fig. C.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Varietatem praecedentis olim credidi, at diſtincta omnino videtur. Corpus magis oblongum, vix ſcabrum linea laterali carinata. Dentes tres poſtici: intermedio longiore, recuruo. Chelae elongatae brachiis ſcabris. Manus filiformes digitis intus multidentatis. … ante apicem caudae unidentatus.

L. thorace orbiculato poſtice biſpinoſo, brachiis granulatis. *nucleus.*

Cancer *nucleus* Ent. ſyſt. 2. 461. 79. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1042. 20.

Herbſt. Canc. 2. 87. tab. 2. fig. 14.

Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 31. fig. 3.

Habitat in mari mediterraneo.

L. thorace utrinque ſpina elongata acutiſſima poſtice quinqueſpinoſo. *ſeptemſpinoſa.*

Cancer *ſeptemſpinoſus* Ent. ſyſt. 2. 462. 81. *

Cancer hyſtrix Ent. ſyſt. 467. 98. *
Habitat in Oceano Indico.

Erinaceus. 11. L. thorace ouato ſpinoſiſſimo: ſpinis ... brachi... nalibus longioribus dentatis, ... leatis.
Cancer Erinaceus Ent. ſyſtem. 2. 460. ...
Habitat in Oceano Indico Dom. Spengler.

cylindrus. 12. L. thorace biſulcato: lateribus dilatato ... dricis apice ſpinoſis.
Cancer cylindrus Ent. ſyſt. 2. 456. 60.
Herbſt. Cancr. 808. 29. fig. 29—31.
Habitat in Oceano Indico.

PARTHENOPE. *Antennae* quatuor ... aequales.
exteriores ſetaceae ... cantho ſub oculis ... ſertae.
interiores palpiformes ... complicatae, ... uea roſtri lateris ... ferioris latentes.

fornicata. 1. P. thorace inaequali: angulo poſtico ... fornicato.
Cancer fornicatus Ent. ſyſt. 2. 453. 50. *
Habitat in India orientali.

giraffa. 2. P. thorace ſpinoſo: ſpinis ramoſis, chelis ... giſſimis ſubtus tuberculatis.

Pedes omnes unguiculati, curſorii.

bitat in India orientali Dom. Daldorff.
tura omnino P. longimanae. Thorax valde inaequalis ſpinis numeroſiſſimis marginalibus imprimis ramoſis. Roſtrum prominens, planum, acutum, inerme. Chelae longiſſimae ſupra ſpinis ramoſis, ſubtus tuberculis numeroſis, obtuſis. Carpi breuiſſimi. Manus elongatae pollice curuato. Pedes omnes ſpinoſiſſimi.

thorace ſpinoſo: ſpinis ſimplicibus, chelis *longimana.*
longiſſimis, ſubtus laeuibus.
ncer *longimanus* Ent. ſyſt. 466. 96. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1046. 42.
mph. Muſ. tab. 8. fig. 2.
v. Amb. tab. 2. fig. 15.
Muſ. 3. tab. 20. fig. 12.
itat in Oceano Aſiatico.

thorace inaequali: margine ſpinoſo, chelis *regina.*
ongiſſimis: angulis ſpinoſis.
bitat in India orientali Dom. Daldorff.
ura praecedentium. Thorax ouatus foueis abus dorſalibus impreſſis margine antice dentato, poſtice ſpinis nouem elongatis vaiis cincto. Frons in medio impreſſa roſtro porrecto acuto, inermi. Chelae elongatae, triquetrae angulis ſpinoſis. Pedes compreſſi, ſubſerrati.

thorace aculeato nodoſo, manibus ouatis *horrida.*
uda carioſa.
ncer *horridus* Ent. ſyſt. 2. 465. 92. * Linn. ſyſt. Nat. 2. 1047. 43. Muſ. Lud. Ulr. 442.

Petiv. Amb. tab. 1. fig. 7.
Rumph. Muſ. tab. 9. fig. 1.
Habitat in Oceano aſiatico.

Lar. 6. P. thorace inaequali quadridentato: mi-
ſpinoſo, chelis laeuibus.
Habitat in India Dom. Daldorff.
Corpus paruum obouatum. Roſtrum
tum, vix exſertum. Thorax inaequali
tibus duobus in medio duobusque
dorſali poſtice eleuatis, acutis. Spin
ginalis utrinque tris planae, acutae:
media longiore. Chelae longiſſimae
nino laeues.

Maja. 7. P. thorace aculeato manibus ventricoſi
ſis, digitis penicillato hirſutis. Ent.
465. 90. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1046. 4.
2031.
Seb. Muſ. tab. 18. fig. 10. tab. 22. fig.
Habitat in Oceano Norwegico.

dubia. 8. P. thorace laeui, manibus compreſſis,
pedibus poſticis breuiſſimis dorſalibus
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.
Minuta. Thorax rotundatus, planus,
margine utrinque pone oculos dent
bus acutis. Frons margine tridenta
que roſtro. Chelae elongatae carp
nis triangularibus, manibus adhuc
bus compreſſis extus ciliatis. Pedes
breuiſſimi, dorſales.

INACHUS. *Antennae* quatuor aequales.

exteriores ſetaceae intra roſtri denticulum inſertae.

interiores palpiformes, compreſſae, chelatae in fouea lateris inferioris roſtri recondendae.

* *Pedibus cylindricis mediocribus.*

1. I. thorace hirto inaequali: linea dorſali ſpinisque dorſalibus utrinque duabus, marginalibus quatuor, pedibus hirtis. *muricatus.*
Cancer muricatus Ent. ſyſt. 2. 459. 71. *
Herbſt. Cancr. fig. 75.
Habitat in India orientali.

2. I. thorace hirto: linea dorſali ſpinisque utrinque duabus dorſalibus, marginalibus quatuor, pedibus apice nudis. *hybridus.*
Habitat in India Dom. Daldorff.
Vix diſtinctus videtur. Differt tamen corpore maiore, ſpinis dorſalibus minoribus, manibus maris maioribus, pedibus apice manibusque laeuibus.

3. I. thorace ouato hirto utrinque quadriſpinoſo. *Ovis.*
Cancer ovis Ent. ſyſt. 2. 459. 70.
Cancer hircus Herbſt. Cancr. fig. 74.

Pedes omnes unguiculati, curſorii.

Habitat in India orientali.

hircus. 4. I. thorace lanato tuberculato, brachiis m
catis, manibus laeuibus.
Cancer hircus Ent. ſyſt. 2. 458. 66. *
Habitat in Iamaica Muſ. Dom. Banks.

urſus. 5. I. thorace ouato faſciculato hirſutiſſimo, ch
laeuibus.
Cancer Vrſus. Ent. ſyſt. 2. 458. 65. *
Habitat in Oceano auſtrali Muſ. Dom. Ba
An potius Dromia?

cornutus. 6. I. thorace aculeato, roſtro ſpinis cornifo
bus barbatis, manibus rotundatis.
Cancer cornutus Ent. ſyſt. 2. 462. 80. * L
ſyſt. Nat. 2. 1047. 46. Muſ. Lud. Ulr.
Habitat in mari mediterraneo, Oceano.

Araneus. 7. I. thorace inaequali: margine utrinque cr
to, antice dilatato acuto.
Cancer Araneus Ent. ſyſt. 2. 458. 67. Lin
Nat. 2. 1044. 30. Fn. Su. 2031. Muſ. L
Ulr. 439.
Ionſt. Exſangu. tab. 5. fig. 13.
Penn. Zool. Brit. 4. tab. 9. fig. 16.
Habitat in Oceano Europaeo.

Opilio. 8. I. thorace aculeato: margine poſtico trid
to, manibus ſublaeuibus.
Cancer Opilio Ent. ſyſt. 2. 458. 68. *
Habitat in mari mediterraneo Prof. Vahl.

condyliatus. 9. I. thorace ouato aculeato: ſupra caudam
nis tribus erectis, chelis muricatis.
Cancer condyliatus Ent. ſyſt. 2. 459. 69. †

Herbſt Cancr. fig. 92.
Habitat in mari mediterraneo.

I. thorace undique aculeato, roſtro elonga- *aculeatus.* to bifido: ſupra dentibus quinque, ſubtus unico.
Cancer aculeatus Ent. ſyſt. 2. 464. 89. *
Habitat in Oceano Norwegico Prof. Vahl.

I. thorace nodoſo inaequali, roſtro plano re- *chiragra.* tuſo, pedibus noduloſis.
Cancer chiragra Ent. ſyſt. 2. 465. 93. *
Habitat in mari mediterraneo.

I. thorace ſublaeui ouato mutico, roſtro bi- *maſcaronius.* fido: lobis bidentatis.
Cancer maſcaronius Ent. ſyſt. 2. 457. 63. *
Cancer maſcaroni Herbſt Cancr. fig. 62.
Cancer planatus Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 31. fig. 1.
Habitat in mari mediterraneo.

I. thorace undique aculeato, roſtro bifido: *naſutus.* ſubtus dente unico ſupra duobus.
Cancer naſutus Ent. ſyſt. 2. 457. 64. *
Habitat in Oceano Norwegico.
Minutus.

I. thorace antice attenuato laeuiuſculo, ro- *anguſtatus.* ſtro porrecto barbato emarginato.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus minutum, valde oblongum, ſiue antice attenuatum roſtro porrecto, cylindrico, barbato, apice emarginato. Thorax laeuiuſculus margine integro. Pedes ſpinoſi. Che-

lae breues brachiis tarſisque ſpinoſis, tri-
bus laeuibus.

Maja. 15. I. thorace aculeato, manibus ventricoſis
noſis, digitis penicillato hirſutis. Ent.
2. 465. 90. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1646. 4.
Su. 2031.
Seb. Muſ. 4. tab, 18. fig. 10. tab. 22. fig. 1.
Habitat in Oceano Norwegico.

** *Pedibus elongatis, filiformibus.*

ſcorpio. 16. I. thorace pubeſcente: ſpinis quatuor ere-
pedibus anticis longiſſimis.
Cancer ſcorpio Ent. ſyſt. 2. 462. 83. *
Cancer Dorſettenſis Penn. Zool. Brit. 4. tab.
fig. 18.
Habitat in Oceano Norwegico.

phalangium. 17. I. thorace pubeſcente antice ſpinis tribus
ctis acutis poſtice tuberculis obtuſis, ro-
bifido.
Cancer phalangium Ent. ſyſt. 2. 463. 84. *
Cancer phalangium Penn. Zool. Brit. 4. tab.
fig. 17.
Habitat in Oceano boreali.

longiroſtris. 18. I. thorace aculeato porrecto adſcendente
ſtro acuto bifido.
Cancer longiroſtris Ent. ſyſt. 2. 462. 82.
Cancer dodecos Linn. ſyſt. Nat. 2. 1046. 38.
Habitat in mari mediterraneo.

longipes, 19. I. thorace aculeato, manibus ouatis ſcab-
pedibus poſterioribus longiſſimis.

ncer *longipes* Ent. ſyſt. 2. 466. 97. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1047. 47. Muſ. Lud. Ulr. 447.
umph. Muſ. tab. 8. fig. 4.
abitat in Oceano Indico.

I. thorace poſtice uniaculeato inaequali, pedibus ſecundi paris longiſſimis. *ſpinifer.*
ancer *ſpinifer* Ent. ſyſt. 2. 467. 99. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1047. 48. Muſ. Lud. Ulr. 447.
abitat in Oceano aſiatico.

I. thorace hirto: linea dorſali ſpinoſa ſpinaque utrinque laterali. *Lar.*
Cancer *Lar* Ent. ſyſt. 2. 467. 100.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
I. longipes affinis videtur.

I. thorace ouato laeui, roſtro longiſſimo utrinque ſerrato. *ſagittarius.*
Cancer *ſagittarius* Ent. ſyſt. 2. 442. 13. *
Habitat in Inſula Guadeloupe.

DROMIA. *Maxillae* exterioris lacinia exterior flagelliformis.
Antennae quatuor: intermediis palpiformibus; articulo primo angulato canaliculato reliquos recipiente.

D. thorace hirto utrinque quinquedentato, pedibus quatuor poſticis aequalibus. *Rumphii.*

Pedes huius generis octo unguiculati; poſtici quatuor prehenſiles inter dorſum et ventrem inſerti.

Cancer Dromia Ent. ſyſt. 2. 451. 45. Lin
Nat. 2. 1043. 24. Amoen. acad. 6. 41
Cancer lanoſus Rumph. Muſ. tab. 11. fig. 1
Seb. Muſ. 3. tab. 18. fig. 1—3.
Habitat in Indiae orientalis profundo.
Sub arena latens valuula conchae pedibu
ſticis ſupra corpus tenente piſciculis
atur.

aegagropila. 2. D. thorace globoſo mutico hirſutiſſimo,
tis nudis dentatis.
Cancer aegagropila Ent. ſyſt. 2. 456. 59.
Cancer caput mortuum Linn. ſyſt. Nat. 2. 1
61?
Habitat in Oceano auſtrali.

artificioſa. 3. D. thorace tomentoſo utrinque tridentato,
dibus poſticis maioribus.
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.
Corpus praecedente minus, magis depreſſ
tomentoſum. Frons ſpinis tribus
unicaque oculari. Thorax planiuſculus,
que tridentatus: dente anteriori infe
Chelae breues, inaequales, nodoſae.
des quatuor poſtici dorſales: anticis
ribus ungue magno arcuato valido p
breui obtuſo.

DORIPPE. *Maxillae* ſecundae lacinia exterior apice oſſea inter antennas porrecta.

Antennae quatuor.

exteriores ſetaceae ſupra foueam interiorum palpiformium inſertae.

D. thorace cordato inaequali depreſſo hirto cauda baſi ſexdentata. *quadridens.*

Cancer quadridens Ent. ſyſt. 2. 464. 88. *

Cancer lanatus Ent. ſyſt. 2. 457. 62. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1044. 29.

Planc. Conch. 36. tab. 5. fig. 1.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Cauda parua ſegmentis duobus anticis dentibus tribus cylindricis: intermedio validiori, obtuſiori. Praeterea in ſegmento ſecundo utrinque dentes tres minores.

D. thorace cordato depreſſo hirto antice quadridentato, cauda laeui. *aſtuta.*

Cancer Pinnophylax Ent. ſyſt. 2. 444. 18. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1039. 5. Amoen. acad. 6. 415. 93?

Herbſt. Cancr. 2. 104. 27. tab. 2. fig. 27?

Habitat in mari Indico Dom. Daldorff.

Chelae maris inaequales: altera mox dextra, mox ſiniſtra ſemper maiore, faeminae breues, aequales. Pedes octo unguiculati: poſtici quatuor prehenſiles, dorſales.

Statura praecedentis at paullo minor. T
depreſſus, vix inaequalis, antice tru
quadridentatus lateribus inermibus.
lae inermes. Pedes quatuor poſtici d
ungue arcuato.

callida. 3. D. thorace cordato depreſſo nudo anti
dridentato, cauda carinata.

Cancer Pinnotheres Ent. ſyſt. 2. 443. 17.
ſyſt. Nat. 2. 1040. 92?

Habitat in mari Aſiatico Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentis at minor
Thorax depreſſus, nudus, antice qua
tatus lateribus inermibus. Pedes qu
poſtici dorſales; magis porrecti,
quam in praecedente. Cauda in medi
berculis paruis carinata.

Dorippe et Dromiae ſpecies omnes inſidia
id eſt valuula conchae pedibus dorſalib
henſa, ſupra dorſum eleuata, aut dorſ
preſſa ſub arena latentes piſciculis inſi
tur et hinc forſan fabula de Pinnother
charum cuſtode orta.

[O]RITHYIA. *Maxilla* exterior lacinia laterali lanceolata, acuta, breui, mutica.

Antennae quatuor inaequales: interioribus longioribus, palpiformibus.

[O]. mammillaris. *mammillaris.*
[C]ancer *mammillaris* Ent. ſyſt. 2. 465. 91 *
[H]abitat in Oceano Indico Muſ. D. Spengler.
[P]edes poſtici natatorii, pinnati.

[P]ORTUNUS. *Maxillae* exterioris lacinia lateralis flagelliformis.

Antennae quatuor inaequales.

exteriores longiores ſetaceae.

interiores palpiformes.

* *Thorace utrinque bidentato.*

[P]. thorace laeui utrinque bidentato, brachiis *vigil.*
ſpinoſis.
[H]abitat in Oceano Indico Dom. Daldorff. *
[M]edius. Oculi approximati pedunculo longiſſimo. Thorax transuerſus, bidentatus: den-

* Pedes huius generis poſtici natatorii, pinnati.

te anteriore multo longiore. Pedes
natatorii.

** *Thorace utrinque ſexdentato.*

crucifer. 2. P. thorace ſublaeui utrinque ſexdentato
te ultimo emarginato; fronte octod
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorf.
Magnus. Dentes frontales octo obtuſi.
lor rufus cruce media vittisque late
albis.

lucifer. 3. P. thorace ſublaeui utrinque ſexdentato
te octodentata, digitis rufis apice
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorf.
Color teſtae rufus maculis quatuor ma
bis, in uiuo phoſphoreſcentibus.
ſpinoſa.

annulatus. 4. P. thorace laeui utrinque ſexdentato,
octodentata, pedibus violaceo annula
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorf.
Praecedentibus minor, laeuior, obſcurus.
lae ſpinoſae digitis rubris: faſcia media
apice nigris albo terminatis. Pedes
albo violaceoque variegati.

variegatus. 5. P. thorace cordato pubeſcente utrinque
dentato: dente poſtico maiori, fron
dentata, manibus ſpinoſis.
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorf.
Affinis certe P. holoſericeo. Differt tamen
nitudine minore, thoracis rugis, ſpina
ſtica longiore, digitisque albis.

thorace cordato pubeſcente utrinque ſexden- *holoſericeus.*
tato, fronte octodentata, manibus ſpinoſis.
Cancer *holoſericeus* Ent. ſyſt. 2. 464. 87. *
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

thorace cordato pubeſcente utrinque ſex- *truncatus.*
dentato, fronte truncata octodentata.
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.
Similis praecedentibus. Differt tamen thorace
latiore, antice truncato dentibusque omni-
bus minoribus obtuſioribus. Brachia mar-
gine interiori ſpinis duabus arcuatis, manibus
granulatis ſpinoſisque, digitis ſulcatis albis
apice incuruis.

Thorace utrinque quinquedentato.

thorace cordato hirto utrinque quinqueden- *puber.*
tato, manibus unidentatis apice nigris.
Cancer *puber* Ent. ſyſt. 2. 463. 86. * Linn. ſyſt.
Nat. 2. 1046. 40.
Habitat in mari mediterraneo.

thorace laeui utrinque quinquedentato, ma- *depurator.*
nibus apice compreſſis.
Cancer *depurator* Ent. ſyſt. 2. 451. 44. Linn.
ſyſt. Nat. 2. 1043. 23. Rumph. Muſ. tab. 6.
fig. P.
Cancer *ramipes* Barrel. Icon. 1287. 2.
Planc. Conchyl. 34. tab. 3. fig. 7.
Seb. Muſ. 3. tab. 18. fig. 9.
Penn. Zool. Brit. 4. tab. 2. fig. 6.
Gronov. Act. Helv. 5. 360. tab. 5. fig. 443.
Habitat in Oceano Europaeo.

Frons tridentata: dente intermedio
Palma triquetra angulo ſuperiore cil
lor flaueſcens annulis paruis rufeſc
Chelae rufomaculatae.

feriatus. 10. P. thorace laeui utrinque quinque
manibus multangulis ouatis: carpis
tatis.

Cancer feriatus Ent. ſyſt. 2. 452. 47. Lin
Nat. 2. 1043. 25. Muſ. Lud. Ulr. 4
Habitat in mari Indico.

lancifer. 11. P. thorace ſubtuberculato utrinque
ſo antice quadridentato, pedibus
neatis.

Cancer lancifer Ent. ſyſt. 452. 48. *
Habitat in Oceano pacifico. Muſ. Dom.

holſatus. 12. P. thorace laeuiuſculo fronteque quinque
tatis.

Habitat in Oceano Europaeo Dom. D
Statura et magnitudo omnino P. depur
Thorax laeuis, glaber dorſo impreſſ
plici dentibusque utrinque quinque
bus. Frons inter oculos quinque
dentibus ſubaequalibus.

**** *Thorace utrinque nouemdentato*

tranquebaricus. 13. P. thorace laeui utrinque nouem
dentibus aequalibus.

Habitat in Oceano Indico eſculentus D.
dorff.

Magnitudine maxime differt. Thorax
laeuis utrinque nouem dentatus dentibus

qualibus. Frons quadridentata. Brachia dentata.

P. thorace laeui utrinque nouemdentato: dente poſtico maiore, manibus multangulato prismaticis. *pelagicus.*

Cancer *pelagicus.* Ent. ſyſt. 2. 447. 31. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1049. 29. Muſ. Lud. Ulr. 434. Degeer Inſ. 7. 427. 3. tab. 26. fig. 8. Rumph. Muſ. tab. 7. fig. R.

Habitat in Pelagi fuco natante.

Brachia ſpinoſa.

5. P. thorace laeui utrinque nouemdentato: dente poſtico maiore teſtaceo: maculis tribus ſanguineis. *ſanguinolentus.*

Cancer *ſanguinolentus.* Herbſt. Canc. 161. 68. tab. 8. fig. 56. 57.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Nimis certe affinis P. pelagico. Differt tantum maculis tribus dorſalibus ſanguineis una alteraque in manibus. Manus breuiores, craſſiores.

6. P. thorace laeui utrinque nouemdentato: dente poſtico breuiore fronte quadridentata: dentibus intermediis breuiſſimis. *defenſor.*

Cancer *defenſor.* Ent. ſyſt. 2. 448. 32. *

Habitat in Oceano auſtrali Muſ. Dom. Banks.

7. P. thorace rugoſo utrinque nouemdentato: dente poſtico maiore, fronte quadridentata: dentibus aequalibus. *haſtatus.*

Cancer *haſtatus.* Ent. ſyſt. 2. 448. 33. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1046. 39.

Habitat in Americae Inſulis Dr. Pflug.

armiger. 18. P. thorace ſublaeui utrinque nouemden-
dente poſtico maiore, fronte quinqu-
brachiis utrinque dentatis.

Cancer armiger. Ent. ſyſt. 2. 448. 34. *
Habitat in Oceano auſtrali Muſ. Dom. Ba-
Affinis videtur P. tranquebarico.

gladiator. 19. P. thorace tomentoſo utrinque nouem-
to: dente poſtico maiore, manibus ſan-
neo maculatis.

Habitat in Oceano Aſiatico Dom. Daldorff.
Praecedentibus affinis at minor. Thorax
ſericeus, parum inaequalis, hinc inde
ber. Chelae ſanguineo maculatae di-
apice dentibusque albis.

haſtatoides. 20. P. thorace tomentoſo inaequali utrinque
uemdentato: dente poſtico maiore, po-
utrinque unidentato.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.
Praecedentibus multo minor thorace integr-
et diſtinctus dente poſtico utrinque mi-
acuto. Manus albae, immaculatae.

forceps. 21. P. thorace laeui utrinque nouemden-
dente poſtico maiore, digitis longiſſimis
formibus.

Cancer forceps Ent. ſyſt. 2. 449. 36. *
Habitat in Oceano.

ponticus. 22. P. thorace rugoſo utrinque nouemdentato
dente poſtico maiore, manibus filiformibus
digitis breuibus.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Paruus. Thorax rugoſus, brunneus. Manus filiformes digitis breuibus apice ſubreflexis.

MATUTA. *Antennae* duae breues, palpiformes, in cantho oculorum recondendae, quadriarticulatae: articulo quarto breuiore, incuruo, ſubulato, bifido.

M. thorace undique punctato. *victor.*
Cancer victor. Ent. ſyſt. 2. 449. 37. *
Cancer lunaris. Herbſt. Cancr. 140. 49. tab. 6. fig. 45.
Seb. Muſ. 3. tab. 20. fig. 10. 11.
Rumph. Muſ. tab. 7. fig. ſ.
Brown. Iamaic. 422. 6. 7.
Habitat ad littora malabarica Dom. Daldorff.

M. thorace poſtice ſtriato. *planipes.*
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.
Vix a praecedente diſtincta. Differt tempore, et ſtriis poſticis loco punctorum.

Pedes omnes Matutae pinnati, natatorii.

HIPPA. *Antennae* quatuor pedun[illegible]
tae, inaequales.

interiores breuiores, bifi[illegible]
laciniis ſetaceis utrinque [illegible]
atis inter oculorum pe[illegible]
culos inſertae.

exteriores craſſae, filiform[illegible]
conuolutae, utrinque [illegible]
tae ſub maxilla exterio[illegible]
tentes.

adactyla. 1. H. cauda inflexa: articulo ultimo elongato [illegible]
bulato.
Hippa adactyla. Ent. ſyſtem. 2. 474. 1. [illegible]
Habitat in Oceano auſtrali Muſ. Dom. B[illegible]

emeritus. 2. H. cauda inflexa: articulo ultimo ouato.
Aſtacus emeritus. Ent. ſyſt. 2. 484. 21.
Cancer emeritus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1055. [illegible]
Emerita. Gronov. Zooph. 1000. tab. 1[illegible]
8. 9.
Petiv. pterig. tab. 20. fig. 9.
Habitat in mari Indico.

Oculi approximati, pedunculati: pedunculo [illegible]
to triarticulato; articulo primo connato, ante[illegible]
teriores ambiente.

SYMETHIS. *Antennae* duae breuiſſimae, quadriarticulatae, intra roſtrum binulae reconditae.

Symethis.

Hippa varioloſa. Ent. ſyſtem. 2. 476. 7.* *varioloſa.*
Habitat in Oceano Indico Dom. Spengler.

LIMULUS. *Palpi* utrinque quatuor: poſticis tribus chelatis.
Mandibula chelata.
Antennae nullae.

1. L. teſta plana conuexa: ſutura lunata poſtice dentata, cauda ſubulata longiſſima. Ent. ſyſt. 2. 487. 1. *Polyphemus.*
Monoculus Polyphemus. Mant. Inſ. 1. 240. 1. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1057. 1. Muſ. Lud. Ulr. 460.
Limulus gigas Myll. Entomaſt. 125. 60.
Rumph. Muſ. tab. 12. fig. A. B.
Seb. Muſ. 3. tab. 17. fig. 1.
Kaempf. Iapan. tab. 13. fig. 8.
Olear. Muſ. tab. 28. fig. 1. 2.
Schaeff. Monogr. 1756. tab. 7.
Habitat in Indiae aquis.

2. L. teſta plana conuexa: lineis tribus ſpinarum eleuatarum, cauda longiſſima inermi. Ent. ſyſt. 2. 488. 2. *Cyclops.*
Habitat in Indiae aquis.

CLASSIS X.

EXOCHNATA.

MAXILLAE PLURES EXTRA LABIU[M] TECTAE PALPIS.

ALBUNEA.

Os palpis, inferne tectum mandibulis maxi[llis]que triplici.

Palpi exteriores os obtegentes, maiores, q[uin]quearticulati, compreſſi, extus ciliati: ar[ti]culo primo breuiſſimo, transuerſo, tr[ape]ziformi: angulo interiori obſolete geni[cula]to, porrecto, ſecundo reliquis longiore, fornicato, ſeta rigida longitudine fere [arti]culi, ad baſin obſolete geniculata, ex[tus] ſuffulto tertio minore compreſſo, obco[nico] inflexo, apice oblique truncato, ſinu[ato] quarto minore, ouato interne ſub apic[e] tii inſerto, quinto minuto, ouato.

Palpi ſecundi porrecti, bifidi: lacinia interior [fal]curiformi, latiore, compreſſa, cornea, q[uin]quearticulata: articulo primo breui ſu[lcis] aliquot obſoletis diuiſo, ſecundo longi[ore] tertio obouato, incuruo, quarto quinto minoribus, rotundatis, lacinia exteriore [crus]tacea, flagelliformi, longiore, multiart[iculata]

lata: articulo primo compreſſo, corneo, ad baſin latiore, ſecundo ouato, reliquis numeroſis, breuiſſimis, decreſcentibus.

Maxilla porrecta, biſida: lacinia interiore multo breuiore, cornea, fornicata, intus ciliata, baſi ſubgeniculata, exteriore multo longiore, porrecta ſupra mandibulas adſcendente, baſi membranacea, depreſſa, apice cornea, dilatata, rhombea, extrorſum pilis longioribus ciliata.

Maxilla ſecunda minor triſida: lacinia interiore lineari, minore, fornicata, membranacea, intermedia longiore, fornicata, cornea, verſus apicem dilatata, ciliata, apice ipſo oblique truncato, exteriore tenuiore, cornea, arcuata, acuta, unguiformi.

Maxilla tertia ſubcornea, triſida: lacinia interiore breuiore, fornicata, apice rotundata, intermedia longiore, apice dilatata, fornicata, truncata, ciliata, exteriori breui, fornicata, rotundata.

Labium mandibulis arcte adhaerens, membranaceum, rotundatum.

Mandibula oſſea, cylindrica dente uno alteroue obſoleto apice fornicata, ſubdilatata, truncata, dentata, palpigera.

Palpus in ſinu dorſi mandibulae inſertus, breuis, incuruus, quadriarticulatus: articulo primo breui, ſecundo longiore: medio exteriori dilatato ſetigero, tertio apice exteriori dilatato, acuto, quarto minuto, rotundato.

Antennae quatuor pedunculatae, inaequales.
interiores longiſſimae, porrectae, ſetaceae, co
preſſae, interne bifarie ciliatae, multiar
latae.
Pedunculus compreſſus, fornicatus, foveam
oculis formans, quadriarticulatus: arti
quarto tenuiore; margine interiore cari
ciliato.
exteriores breuiores, craſſiores, compreſ
utrinque ciliatae ſeptem articulatae: ar
lo primo minuto, ſecundo obouato, m
mo, reliquis quadratis, decreſcentibus.
Pedunculus fiſſus articulo communi, maiori,
lari impoſitus: lacinia inferiore maiore, c
preſſa, pilis longioribus ciliata, triart
ta: articulo primo ſecundoque multo l
ribus, ouatis, tertio anguſtiore, obco
antennifera, ſuperiore minore, comp
pilis longioribus ciliata, biarticulata: ar
lo primo maiore, irregulari, ſecundo lo
ri, longiore, mutico.

SCYLLARUS.

Os palpis inferne tectum mandibula maxill
duplici.
Palpi exteriores oſſei, angulati, ſexarticulati
ticulo primo breuiſſimo, transuerſo,
canaliculato, ſecundo longiore, extern
mina oſſea, plana, lanceolata, acuta
ſuffulto, tertio longiore, attenuato, ſ
cato, intus canaliculato, extus cari

quarto breui, obconico, incuruo, cum ſequentibus in canali praecedentis recondendo, quinto longiore, triquetro, tenuiore, ſexto breui, triquetro, conico.

pi ſecundi minores, bifidi: lacinia interiore ſecuriformi, cornea, compreſſa, latiore, quinquearticulata: articulo primo breuiſſimo, ſecundo latiore, longiſſimo, interne ciliato, tertio breui, incuruo, quarto latiore, quadrato, quinto minore, ouato, lacinia exteriore lineari, membranacea, inarticulata, plana, rotundata, ciliata.

xilla bifida: lacinia interiore minore, cornea, bifida; pinna interiore unguiformi, bifida: pinnulis diſtantibus, arcuatis, corneis, acutis: interiore ſetigera, pinna exteriore multo maiore, apice dilatata, rotundata, fornicata, ciliata, lacinia exteriore maiore, membranacea, bifida; pinna interiore breuiore, tenuiore, filiformi, exteriore multo maiore, dilatata, membranacea, apice rotundata, ciliata.

xilla ſecunda bifida: laciniis ſubaequalibus rotundatis.

bium mandibulis arcte adhaerens rotundatum, integerrimum.

ndibula oſſea, concaua, utrinque ſinuata, apice dilatata, inaequaliter dentata, palpigera.

lpur breuis, planus, obtuſus, triarticulatus: articulis ſubaequalibus in ſinu mandibulae inſertus.

Antennae quatuor inaequales.

interiores paullo longiores, filiformes, qua-
articulatae: articulo primo craſſiore, p-
culum referente, ſecundo tertioque ſu-
qualibus, longioribus, tenuioribus, ul-
breuiore bifido.

exteriores breuiores, depreſſae, planae, dil-
tae, ſpinoſo ciliatae, quadriarticulatae
ticulo primo tertioque minoribus, ſim-
bus, transuerſis, ſecundo et ultimo m-
ribus, dilatatis, planis, ſpinoſo ciliatis.
cundo ſuperne carinato, acuto, quarti ma-
gine interno incumbente, quarto ſubtus ca-
rinato, conuexo.

PALINURUS.

Os palpis inferne tectum, mandibulis maxill-
duplici.

Palpi exteriores maiores, elongati, os obte-
tes, ſex articulati: articulo primo breu-
tiore, ſecundo et tertio longioribus, co-
preſſo, triangularibus interne concauis, m-
gine interiori oſſeo ciliato, dentato, qu-
et quinto minoribus cylindricis, intus c-
tis, ſexto tenuiore, longiore, faſcic-
piloſo.

Palpi ſecundi minores, porrecti, bifidi: la-
ſubaequalibus, corneis; interiore ſecun-
mi, craſſiore, depreſſa, fornicata: ar-
lis quinque, primo diſtincto, breui, la-
re, ſecundo longiſſimo, intus ciliato, te-

incuruo, minuto, quarto tranſuerſo, dilatato, perpendiculari utrinque et apice ciliato, quinto tenuiori, breui, rotundato, exteriore multiarticulata: articulo primo breuiſſimo, ſecundo longiſſimo, compreſſo, reliquis breuiſſimis, tranſuerſis, ciliatis.

[Ma]xilla prima cornea bifida: lacinia interiore multo maiore dilatata, fornicata: margine interno recto, denſiſſime ciliato, exteriore minuta, ouata, ciliata baſi exteriori palpigera.

[Pal]pus maxillae lacinia duplo longior, ouatus multiarticulatus: articulo primo longiſſimo, triquetro, ſubtus carinato, ſuperne late canaliculato, reliquis breuiſſimis, tranſuerſis, numeroſis ciliatis.

[Ma]xilla ſecunda cornea, trifida: lacinia interiore breui, incurua, apice rotundata, ciliata, intermedia maiore apice dilatata, rhombea: margine altero ciliato, exteriore breuiſſima, oblonga, ciliata.

[Labi]um mandibulis arcte adhaerens membranaceum, trifidum: laciniis lateralibus maioribus, diſtantibus, rotundatis, integerrimis, intermedia rotundata, minuta, integra.

[Man]dibulae magnae, craſſae, concauae, obtuſae ſuperne dente magno acuto, ſubulato, diſſimiles: dextra in medio ſinuata, rotundata, obtuſa, ſiniſtra, truncata.

[Pal]pus in dorſo mandibularum ad baſin dentis ſuperioris inſertus, breuis triarticulatus, com-

preſſus linearis: articulo primo breuiſ-
cundo longiore, tertio rotundato cilia-
Antennae quatuor inaequales, pedunculatae,
dunculo longo, articulato, ſimplici.
interiores breuiores, porrectae longitudine
corporis ſetaceae, bifidae: articulis nu-
ſis, breuiſſimis, transuerſis, decreſcen-
Pedunculus muticus longior quam exteriorum
driarticulatus: articulis cylindricis de-
centibus; primo duplo longiore, ſupra
baſin bifarie ciliato.
exteriores corpore duplo longiores, ſeta-
aculeatae, ad baſin compreſſae, utrin-
ſubcanaliculatae: articulis numeroſiſ-
breuiſſimis, transuerſis, decreſcentibus
Pedunculus triarticulatus, angulato depreſſus
noſus: articulo primo maiore, ultimo
giore.

PALAEMON.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxi-
duplici.
Palpi exteriores maiores, oſſei, porrecti os
gentes quadriarticulati: articulo prim-
ri, breui, irregulari, ſecundo long-
compreſſo, fornicato margine interio-
to, tertio paullo breuiore, recto,
hirto, quarto breuiore, cylindrico,
Palpi ſecundi latiores, ſubcornei, compreſſi,
nicati, bifidi: lacinia interiore maiore
curiformi, ſexarticulata; articulis tribus

ferioribus breuibus, transuerſis, quarto minore transuerſo, incuruo, quinto et ſexto dilatatis perpendiculariter transuerſis, exteriore minore membranacea, compreſſa.

illa cornea, bifida: lacinia interiore maiore fornicata, rotundata, intus ciliata, exteriore minore rotundata.

illa ſecunda minor, trifida: laciniis exterioribus minoribus, membranaceis, oblongis, ciliatis; intermedia maiore, fornicata, extrorſum dilatata apice truncata, ciliata.

ium mandibulis arcte adhaerens, membranaceum, trifidum: laciniis lateralibus maioribus, rotundatis integris.

ndibula magna, craſſa, cylindrica, concaua apice bifida, palpigera: lacinia interiore dentem molarem referente, quadrata, truncata, dentata, exteriore dentes inciſores referente, compreſſa, ſubfornicata, apice tridentata.

lpus compreſſus, hirtus, triarticulatus, inter lacinias mandibulae inſertus.

tennae quatuor pedunculatae, inaequales ſe inuicem ſuper impoſitae.

periores breuiores, ſetaceae: articulis numeroſiſſimis, vix conſpicuis, trifidae: laciniis inaequalibus, exterioribus longitudine corporis, intermedia minore longitudine thoracis.

dunculus craſſus, triarticulatus: articulo primo maiore, depreſſo, ſuperne ad receptionem

oculorum excauato, margine exteriore antice producto, bifido: pinna intern ta, externa acuta, articulo ſecundo ſubcylindrico, apice interiore porrecto liato, tertio longiore, tenuiore, ob apice inaequali antennifero.

inferiores ſetaceae, ſimplices, corpore longiores: articulis numeroſiſſimis, uerſis, breuiſſimis.

Pedunculus craſſus, triarticulatus: articulo craſſiore, irregulari, apice externo ta, ſquamifera: ſquama oblonga, pedunculo duplo longiore, extus a apicem oblique oſſea, craſſiore, ant ſpinoſa, intus tenuiore, cornea, ſecundo tertioque inaequaliter cylin breuibus, inermibus.

ALPHEUS.

Os palpis inferne tectum mandibulis duplici.

Palpi exteriores longiſſimi, os obtegentes, quadriarticulati: articulo primo breuiſſ latiori, ſecundo longiſſimo baſi ſubſ to, apice carinato: margine interiori to, exteriori lacinia tenui, membran ſetacea longitudine fere articuli aucto, breui, obouato, depreſſo, quarto ri, duplo longiori, depreſſo, oblongo ri, utrinque pilis longioribus ciliato.

ſecundi multo minores, bifidi: lacinia interiore cornea, ſecuriformi, quinquearticulata: articulo primo breuiſſimo, ſecundo longiſſimo, fornicato, tertio minuto, incuruo, quarto perpendiculariter transuerſo: capitulo paruo ciliato in apice exteriore, quinto transuerſo, ciliato, lacinia exteriore nobis deficiente.

lla bifida: laciniis inaequalibus, interiore breuiore, ouata, fornicata, exteriore ſtriis vel ſuturis variis exarata; margine interiore rectiore, ciliato, lacinia exteriore duplo longiore, tenui, membranacea, ſetacea.

illa ſecunda ſubcornea, bifida: lacinia interiore breui incurua, tenuiore, ſubpellucida, intermedia longiore, opaca, cornea, apice latiore, fornicata, oblique truncata, ciliata, exteriore minore anguſtiore, parum torta.

um mandibulis arcte adhaerens, ſubmembranaceum, bifidum: laciniis aequalibus, ouatis.

dibula magna, craſſa, cylindrica, apice bifida, inter lacinias palpigera: lacinia interiore craſſiori, quadrata, apice truncata, inaequali, exteriore longiore, compreſſa, fornicata margine multidentato: dentibus minutis inaequalibus.

pus breuis, hirtus: articulis tribus ſubaequalibus.

ennae quatuor inaequales, pedunculatae, ſetaceae.

interiores paullo altius inſertae, breuiore multi-
fidae: laciniis ſubaequalibus,
latis.

Pedunculus cylindricus externe ſubcarinatus
culis tribus inaequalibus, primo bre
quentibus paullo craſſiore, ſuperne
lamina ouata, ſubulata, acuta, artic
ſo breuiore acuto, ſecundo reliquis
longiore tertio minuto annulo ante ap
impreſſo.

exteriores longitudine corporis, ſimplices
ticulis numeroſiſſimis, transuerſis,
vix conſpicuis.

Pedunculus cylindricus: articulis tribus inae
libus, primo latiore, breui, irregulari,
ce exteriori ſquamifero: ſquama long
totius pedunculi, lanceolata; margine
riori corneo, acuto, interiori membr
ceo, ſubpellucido, ciliato, ſecundo lon
mo inermi, tertio breui, tenuiore,
nico.

ASTACUS.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxill
triplici.

Palpi exteriores elongati, os obtegentes, ſexartic
fidi: lacinia interiore maiore, communi, tran
articulo primo latiore, longiori, trig
ſo, irregulari, ſecundo longiori, altero
angulo altero multidentato,
tertio mutico, articulo tertio breuiori,

preſſo, triquetro, flexo: angulo interiori acuto, ultimis tribus breuioribus, ſubaequalibus, ciliatis: lacinia exteriore multo minore, anguſta, ſetacea, verſus apicem membranacea, multiarticulata; articulo primo longiſſimo, triquetro, reliquis breuiſſimis, numeroſis, vix conſpicuis.

ſecundi minores, cornei, bifidi: lacinia interiore maiore, ſecuriformi, plana, ſubfornicata, quinquearticulata: articulo primo breuiſſimo, transuerſo, ſecundo longiſſimo verſus apicem anguſtiore, margine interiori ciliato, tertio minuto, incuruo, quarto multo maiore perpendiculariter transuerſo, ciliato, quinto breui, rotundato, ciliato, lacinia exteriore tenuiori, flagelliformi: articulo primo breui, ſecundo longiſſimo, ſubarcuato, reliquis numeroſis, decreſcentibus.

illa maiore, cornea, trifida: lacinia interiore breuiſſima, craſſa, ciliata, intermedia multo maiore dilatata, fornicata: margine interno ciliato, ſerieque ſetarum ad marginem exteriorem, exteriore longiore, lanceolata, plana, in medio geniculata, baſi exteriore palpigera.

illa ſecunda minor, cornea, trifida: laciniis duabus interioribus fornicatis, apice dilatatis, ciliatis, bifidis: pinnis introrſum ſenſim decreſcentibus, exteriore longiore, plana, ſubulata, externe ciliata.

Maxilla tertia cornea bifida: lacinia interi[ore] ba[s]i ...ui, incurua, rotundata, ciliata, bai... na breui, ouata aucta, exteriore lon... recta, fornicata, apice dilatata, obliqu... cata, ciliata basi exteriore palpigera.

Palpus flagelliformis: articulo primo breui, ... uerſo, ſecundo longiſſimo, depreſſo, ... anguſtiore, tertio ouato, incuruo, r... numeroſis, minutis, decreſcentibus.

Labium mandibulis arcte adhaerens bifidum ... ciniis ſimplicibus, recuruis, intus dila... ciliatis.

Mandibula craſſa, cornea apice bifida, palp... lacinia ſuperiore compreſſa, inermi, ... ore intus dilatata, acuta.

Palpus inter mandibulae lacinias inſertus, ... preſſus, triarticulatus: articulo ultimo ... re, ciliato.

Antennae quatuor pedunculatae, inaequales, ... ceae, multiarticulatae.

interiores breuiores, bifidae: laciniis ſubae... libus.

Pedunculus quadriarticulatus: articulo primo ... iore, depreſſo, rotundato, ſuperne ... macula rotundata, ſubpellucida, api... nis obſoletis, rarioribus coronata, re... tribus ſubaequalibus, cylindricis decre... tibus, apice ſetis rarioribus coronatis.

exteriores longiores, ſimplices: articulis nu... roſiſſimis, transuerſis, decreſcentibus.

nculus elongatus, quadriarticulatus: articulo primo maiori, irregulari; apice exteriori longiore, ſpinoſo, ſecundo ſub apice inſerto, breui parum depreſſo, tertio longiore, interne carinato, ciliato, quarto minore, externe carinato, ciliato.

PENAEUS.

alpis inferne tectum mandibulis maxillaque triplici.

pi exteriores longiſſimi, recti, rigidi, bifidi: laciniis inaequalibus, interiore maiore, longiore, craſſiore: articulis ſex; primo breui, ſecundo longiſſimo, reliquis breuioribus, ſubaequalibus, ſexto breuiore ouato, exteriore dimidio breuiore, multiarticulata, compreſſa, utrinque ciliata, pennacea: articulo primo longiore, anguſtiore, cylindrico, diſtincto, reliquis numeroſiſſimis, transuerſis, vix conſpicuis.

pi ſecundi breuiores, bifidi: lacinia interiore breuiore, ſecuriformi, lata, depreſſa: quinquearticulata, articulo primo breui, transuerſo, ſecundo longiſſimo, latiore: margine interiori ciliato, tertio breui, tenuiori, incuruo, quarto maiore, perpendiculariter transuerſo, ſubquadrato, quinto minore, oblongo, dependente ſub apice inſerto externe ciliato: lacinia exteriore duplo longiore, compreſſa, attenuata, pennacea, vel utrin-

que ciliata: articulis numeroſiſſimis; pr
anguſtiore, diſtincto, oblongo, reliqu
uiſſimis, transuerſis.

Maxilla reliquis maior, cornea, ouata, ba
lacinia interiore minuta, ouata, exte
margine interno ciliato ſerieque ſetarum
gini parallela.

Maxilla ſecunda ſubcornea, bifida: lacinia
riore breuiore, tenuiore, acuta, exte
maiore, apice dilatata, ſubfornicata, ob
que truncata, ciliata, fiſſa.

Maxilla tertia ſimplex apice dilatata, ouata,
ciliata.

Labium membranaceum, bifidum: laciniis baſi
lindricis, apice ouatis, integerrimis.

Mandibula craſſa, cornea, obtuſiſſima, utri
unidentata dente ſuperiore maiore.

Palpus foliaceus, latiſſimus, membranaceus, u
que ciliatus, triarticulatus: articulo p
breuiſſimo, ſecundo breui transuerſo,
tio maximo, plano, foliaceo, magnitu
totius mandibulae.

Antennae quatuor inaequales, pedunculatae
uicem ſuper impoſitae.

ſuperiores, breuiores, porrectae, ſetaceae.
fidae: laciniis aequalibus: inferiore baſi
tus barbata.

Pedunculus craſſus conicus longitudine di
antennarum, triarticulatus: articulo p
maximo ad receptionem oculorum exca

ſecundo tertioque breuibus ſubcompreſſis muticis.

Inferiores ſimplices ſetaceae, corpore multo longiores: articulis numeroſiſſimis, breuiſſimis, decreſcentibus.

Pedunculus triarticulatus ſuperiorum pedunculo breuior, tenuior, triarticulatus: articulo primo craſſiore, irregulari; apice exteriori elongato, ſquamifero; ſquama oblonga, elongata, pedunculo longiore, a medio ad marginem interiorem oblique ſtriata, cornea, tenuiore, ſubpellucida a medio ad marginem exteriorem craſſiore, opaca; margine exteriori ipſo lamina lineari, oſſea ante apicem in ſpinam elongata, ſuffulto, articulo ſecundo cylindrico, inaequali, inermi tertio minore ſubgloboſo.

CRANGON.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxillaque duplici.

Palpi exteriores elongati, os obtegentes, bifidi: lacinia interiore multo maiore, oſſea, compreſſa, ciliata, ſexarticulata: articulo primo transuerſo, breui, communi, ſecundo longiſſimo, reliquis ſubaequalibus, exteriore multo breuiore, anguſtiore, membranacea, multiarticulata: articulo primo plano, longiſſimo, reliquis breuiſſimis, cylindricis, decreſcentibus innumeris.

Palpi ſecundi breuiores, cornei, bifidi: la
inaequalibus, interiore latiore, plana
ua quadriarticulata, articulo primo br
transuerſo, ſecundo longiſſimo, tertio
uo, quarto fornicato, paullo latiore
exteriore flagelliformi multiarticulata
culo primo breui, ſecundo longiſſimo,
quis breuiſſimis, innumeris, decreſcent

Maxilla membranacea, plana, trifida: lacini
teriore minore, ſubulata, media maior
tundata, exteriori ſubulata longiſſima.

Maxilla ſecunda nobis deeſt.

Labium breue, membranaceum, rotundatum
dibulis arcte adhaerens.

Mandibula incurua cylindrica, apice trid
palpigera.

Palpus inter dentes mandibulae inſertus, bre
planus, filiformis, triarticulatus: articul
aequalibus.

Antennae quatuor pedunculatae, exteriores lo
ſimae, ſetaceae pedunculo ſquama
ouata ci·ata ſuffulto, poſteriores bre
bifidae: lacinia exteriore paullo longior
ata pedunculo baſi dente acuto, val
mato.

PAGURUS.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxill
triplici.

Palpi exteriores longiſſimi, cornei, os obt
tes, bifidi: laciniis inaequalibus; inte

longiore, craſſiore, ſexarticulata: articulis ſubaequalibus, primo latiore, breui, irregulari, ſecundo, angulato: angulo altero crenato, altero ciliato tertio et quinto longioribus, compreſſis: margine interiori pilis longioribus ciliatis, quarto obconico, incuruo, ultimo anguſtiore apice obtuſo faſciculato, exteriore minore tenui, quadriarticulata: articulo primo breui, craſſiore, ſecundo longiſſimo, compreſſo, tertio breui, ultimo breui truncato, faſciculato.

Palpi ſecundi minores bifidi: laciniis ſubaequalibus, interiore latiore, compreſſa, ſubſecuriformi, quinquearticulata: articulo primo breui, transuerſo, intus ciliato, ſecundo longiſſimo, intus ciliato, tertio breui, obouato, incuruo, quarto quadrato: angulo ſuperiori interne porrecto pilis longioribus ciliato, quinto acuto, ciliato, exteriore tenuiore, membranacea, flagelliformi: articulo primo breuiſſimo, ſecundo longiſſimo, compreſſo, reliquis numeroſis, minutis, decreſcentibus.

Maxilla cornea bifida: lacinia interiore rotundata, fornicata latiore, intus ciliata, exteriore plana, baſi dilatata, intus ſeta acuta armata, in medio coarctata, apice bifida: pinna interiore ſubulata, acuta, exteriore longiore, cylindrica.

Maxilla ſecunda cornea, trifida: lacinia interiore fiſſa; pinna interiore ciliata breuiore, exte-

riore ſubulata, acuta, intermedia longi-
bifida; pinna interiore latiore, apice for-
cata, ciliata, fiſſa, exteriore minore, a-
ca ſubulata, lacinia exteriore — —

Maxilla tertia ſubcornea bifida: lacinia inter-
breuiſſima, rotundata, ciliata, exteriore lo-
giore, bifida; pinna interiore apice dila-
ta, ciliata, exteriore breui, acuta.

Labium membranaceum, mandibulis arcte adhae-
rens, rotundatum, integrum.

Mandibula oſſea utrinque ſinuata apice fornic-
dilatata, intus palpigera.

Palpus triarticulatus, paruus, in mandibulae ap-
cem excauatum recondendus: articulo u-
mo latiore, compreſſo.

Antennae quatuor inaequales, pedunculatae, tra-
uerſaliter diſpoſitae.

interiores breues, palpiformes, oculorum p-
dunculos vix ſuperantes: articulis tri-
primo compreſſo, ſecundo longiori cylindri-
co ultimo breui bifido.

Pedunculus uniarticulatus, gibbus, ſpinoſus.

exteriores corporis longitudine, ſetaceae, m-
tiarticulatae.

Pedunculus extra oculos ad latera frontis ſup-
inſertus: articulo primo multo latiore,
gulari ſpinoſo ſpinaque rigida, baſi artic-
ta longitudine fere totius pedunculi ext-
aucto, ſecundo minore, ouato, mutico,
flexo, tertio lineari, longiſſimo compreſ-

GALATHEA.

alpis inferne tectum mandibulis maxillaque triplici.

pi exteriores porrecti, os obtegentes, bifidi: lacinia interiore paullo longiore, craſſiore, oſſea, ſexarticulata: articulo primo breui, latiore, irregulari, ſecundo longiore apice interiore ſpina una alteraue armato, tertio longiore intus ſpinoſo quarto breui, incuruo, obconico, apice interiori ſetoſa, quinto longiori, lineari, ultimo minori, arcuato, ciliato, lacinia exteriore tenuiore, flagelliformi: articulo primo breuiſſimo, ſecundo longiſſimo, compreſſo, parum arcuato, tertio ouato, incuruo, reliquis numeroſis, breuiſſimis, vix decreſcentibus.

pi ſecundi minores, compreſſi, porrecti, bifidi: lacinia interiore breuiore, craſſiore ſubſecuriformi, quinquearticulata: articulo primo breui, transuerſo, intus ciliato, ſecundo longiſſimo itidem ciliato, tertio breui, obouato, inclinato, quarto quadrato, quinto lanceolato, ciliato, exteriore duplo longiore ad oculos porrecta, flagelliformi, ſubmembranacea: articulo primo breui, ſecundo longiſſimo, oculos attingente, compreſſo a baſi usque ad medium interne barbato, tertio ouato, introrſum reclinato, reliquis numeroſis, minutis, decreſcentibus.

illa ſubcornea, trifida: lacinia interiore latiore, fornicata, intus ciliata, ad baſin inci-

ſa, intermedia longiore, anguſtiore
elongata, ſubulata, tertia multo breui
oblonga.

Maxilla ſecunda ſubcornea, bifida: laciniis
libus fornicatis, extrorſum latioribus,
truncatis, ciliatis; exteriore ſeta ſubula
tus armata.

Maxilla tertia ſubcornea, trifida: laciniis inae
libus: interiore breuiſſima, latiore,
data, apice oblique truncata, ciliata
media longiſſima, apice latiore, forn
oblique truncata, ciliata, exteriore ungu
mi, tenui, arcuata, acuta.

Labium mandibulis arcte adhaerens, bifidum
ciniis aequalibus, membranaceis, rotu
tis, integris.

Mandibula oſſea, utrinque ſinuata, apice
ta, fornicata, in ſinu ſuperiore palpigera
Palpus intra mandibulae cavitatem recondi
compreſſus, quadriarticulatus: articulo
timo maiore, latiore, ouato.

Antennae quatuor pedunculatae, inaequales,
interiores palpiformes, breues, triarticula
articulo primo et ſecundo cylindricis
aequalibus, ultimo breui, bifido:
feriore breuiore ſetacea, multiarticulata
periore maiore falcata.

Pedunculus breuis, craſſus, ſpinoſus, triarticu
exteriores ſimplices, ſetaceae, corpore lon
res, extra oculos inſertae: articulis nu
ſis, minutis.

Unculus ſimplex, conicus, triarticulatus: articulis ſpinoſis, decreſcentibus.

SQUILLA.

Palpis inferne tectum mandibulis maxillaque duplici.

Palpi exteriores longiſſimi, compreſſi, ſexarticulati: articulo primo breui, craſſiore, apice inaequali, externe porrecto, ſecundo longiſſimo lineari, arcuato, tertio parum breuiore, apice incraſſato, interne piloſo, quarto breui, latiore margine interiore pilis longioribus ciliato, quinto dilatato, orbiculato: latere exteriore piloſo, margine ſuperiori canaliculato ad receptionem ultimi articuli; ſexto breui, arcuato, acuto, unguiformi, in canalem marginis articuli quinti recondendus.

Palpi ſecundi breues, lati, os obtegentes: articulis quinque ſubaequalibus, transuerſis, medio canaliculatis, ultimo longiori, acutiuſculo, ciliato.

Maxilla bifida: lacinia interiore latiore, fornicata, apice oblique truncata, ciliata, ad baſin ſquama tenui aucta, exteriore vix longiore, cylindrica ſubulata.

Maxilla ſecunda nobis deeſt.

Labium breue, membranaceum, mandibulis arcte adhaerens, bifidum laciniis ſimplicibus, quadratis, obtuſis, diſtantibus.

Mandibula oſſea, craſſa, concaua, apice bi-
palpigera: lacinia altera porrecta, compr-
incurua, margine dentato, altera bre-
triquetra, recta, acuta, intus bifariam
tata.

Palpus dorſo mandibulae ante baſin laciniarum
ſertus, filiformis, compreſſus, ſetis te-
natus articulis tribus ſubaequalibus.

Clypeus concauus, membranaceus mandibu-
tegens.

Antennae quatuor inaequales, ſetaceae, pedun-
latae, multiarticulatae.

interiores longiores longiusque pedunculatae
fidae laciniis ſubaequalibus multiarticula-
ſetaceis.

Pedunculus elongatus, muticus, triarticulatus: ar-
ticulis cylindricis, ſubaequalibus, de-
centibus.

exteriores breuiores, ſimplices: pedunculo bi-
fido.

Pedunculus craſſus, irregularis; articulo primo de-
preſſo, lato, orbiculato, ſecundo depr-
lato tranſuerſo, bifido: lacinia exteriore u-
articulata, ſquamifera, articulo minuto, g-
boſo, ſquamae baſin efficiente, ſquama o-
longo lanceolata, plana, ciliata longitudin-
totius antennae, lacinia interiore biarticula-
ta, antennifera; articulis cylindricis, primo
breuiore et latiore.

POSYDON.

lpis tectum.

xteriores magni compreſſi, ſemimembranacei, ſecundum totam longitudinem foliacei, apice unguiculati. Reliqua inſtrumenta cibaria mihi ob ſpecimina nimis intus putreſcentia, deſunt.

nae quatuor ſetaceae pedunculatae: pedunculis ſimplicibus muticis.

teriores breuiores, bifidae, ſubpiloſae.

GAMMARUS.

lpis inferne tectum, mandibulis maxillaque triplici.

pi anteriores longiores, compreſſi bifidi: lacinia interiore quadriarticulata; articulo ultimo incuruo, exteriore breuiore: articulo ſecundo longiſſimo, reliquis breuiſſimis.

pi ſecundi paullo breuiores, bifidi: laciniis ſubaequalibus; interiore triarticulata, exteriore ſubulata, acuta.

xilla membranacea, bifida: laciniis ſubaequalibus, linearibus.

xilla ſecunda membranacea, bifida: laciniis rotundatis, aequalibus.

xilla tertia membranacea bifida: laciniis aequalibus rotundatis extrorſum craſſioribus.

um breue membranaceum, mandibulis arcte adhaerens, rotundatum, integrum.

Mandibula breuis, cornea, craſſa, fornica-
tuſa, vix dentata, dorſo palpigera.

Palpus hic breuis, filiformis, triarticulatus,
preſſus.

Antennae quatuor inaequales, ſimpliciſſimae:
anteriores breuiores, ſubulatae: peduncu-
articulato.
poſteriores longiores, ſetaceae: pedunculo
articulato.

ALBUNEA. *Antennae* quatuor inaequales, pedunculatae. *interiores* longiſſimae, ſetaceae interne biſariam ciliatae: pedunculo fornicato.
exteriores breuiores, craſſiores, compreſſae, utrinque ciliatae: pedunculo bifido.

A. thorace antice truncato ciliato ſerrato, manibus chelatis. *ſymniſta.*
Hippa ſymniſta Ent. ſyſt. 2. 474. 2.
Cancer ſymniſta Linn. ſyſt. Nat. 2. 1013. 70.
Muſ. Lud. Ulr. 453.
Habitat in Oceano Indico Muſ. Dom. Banks.

A. thorace ſub integro ciliato, manibus chelatis. *ſcutellata.*
Hippa ſcutellata Ent. ſyſt. 2. 474. 3*
Habitat — — Muſ. britann.

A. thorace glabro antice truncato ſeptem dentato, manibus compreſſis: pollice falcato. *dorſipes.*
Hippa dorſipes Ent. ſyſt. 2. 475. 5.*
Cancer dorſipes Linn. ſyſt. Nat. 2. 1053. 71.
Muſ. Lud. Ulr. 452.

Oculi minuti, orbiculati, pedunculi apice immerſi, approximati, pedunculis planis, ſemiorbiculatis, foveam, quam antennae interiores formant ſuperne claudentes.

Rumph. Muſ. tab. 10. fig. 3.
Petiv. Amboin. tab. 6. fig. 2.
Habitat in Oceano Indico, auſtrali M
Banks.

ſcabra. 4. A. thorace ouato antice truncato mu
to, manibus compreſſis utrinque dent
Hippa ſcabra Ent. ſyſt. 2. 476. 6. *
Habitat in Oceano auſtrali Muſ. Dom. B

dentata. 5. A. thorace laeui utrinque quinquedentato,
ſis ſpinoſis. *
Hippa dentata Ent. ſyſt. 2. 475. 4.
Cancer Caſſilaunus Penn. Zool. Brit. 4. tab
fig. 13.
Cancer perſonatus Herbſt. Cancr. tab.
fig. 21.
Habitat in Oceano Europaeo et Indico.
Proprii generis videtur haud rite examina

SCYLLARUS. *Antennae* quatuor in
quales.
interiores ſublongior
filiformes: articulo
timo bifido.
exteriores depreſſae
nae, dilatatae, ſpi
ſo ciliatae.

Arctus. 1. S. thorace antice quinquefarie aculeato, an
narum ſquamis ciliato aculeatis.
Scyllarus Arctus Ent. ſyſt. 2. 477. 1.

ncer *Arctus* Linn. ſyſt. Nat. 2. 1053. 75. Fn.
Su. 2040. Lund. Act. Hafn. S. N. 2. 2. 21. 1.
h. Hiſt. Inſ. tab. 32. fig. 3.
rel. Icon. tab. 1288. fig. e.
nſt. Exſangu. tab. 4. fig. 4. 8. 12.
bitat in Oceano Europaeo.

ſcaber thorace antennarumque ſquamis cre- *aequinoctialis.*
natis.

nd. Act. Hafn. N. S. 2. 2. 21. 2.
own. Iamaic. tab. 41. fig. 1.
bitat in Americae Inſulis.

piloſus thorace antennarumque ſquamis ſer- *antarcticus.*
rato ciliatis.

nd. Act. Hafn. S. N. 2. 2. 22. 3.
h. Muſ. 3. tab. 20. fig. 1.
mph. Muſ. tab. 2. fig. 6.
nſt. Exſ. tab. 9. fig. 14.
bitat in India orientali.

ſcaber thoracis margine antico ſpinoſo ocu- *orientalis.*
lifero.

nd. Act. Hafn. S. N. 2. 2. 22. 4.
mph. Muſ. tab. 2. fig. D.
bitat in India orientali Dom. Daldorff.
ſtinctus ab omnibus reliquis oculis in ipſo
margine ſpinoſo thoracis. Squamae anten-
narum ciliato ſpinoſae. Frons ſpinis dua-
bus validis. Thorax ſcaber linea dorſali ele-
vata dentibus tribus. Margo antice ſpinis
quinque et inter anteriores tres oculi promi-
nent.

auſtralis. 5. S. antennarum ſquamis rotundatis laeuib
Ent. ſyſt. 2. 477. 2. *
Habitat in Oceano auſtrali Muſ. D. Banks
Species haud rite nota.

PALINURUS. *Antennae* quatuor i
quales peduncul
pedunculo artic
ſimplici.
interiores breuiores, b
taceae bifidae, mu
cae.
exteriores longiſſim
ſetaceae, aculeatae

* *Spinis ocularibus ſimplicibus.*

Homarus. 1. P. viridis albo punctatus abdominis ſegmen
ſulco medio impreſſo.
Aſtacus Homarus Ent. ſyſt. 2. 479. 3.
Cancer Homarus Linn. ſyſt. Nat. 2. 1053.
M. L. V. 457.
Rumph. Muſ. tab. 1. fig. A.
Margr. Braſ. 245. tab. 246.
Petiv. Amboi. tab. 6. fig. 1.
Seb. Muſ. 3. tab. 21. fig. 5.
Penn. Zool. Brit. 4. tab. 11. fig. 22.
Habitat in Oceano Aſiatico.
Antennae interiores variegatae. Pedes ru
albo maculatae: articulo ultimo piloſo.

ornatus. 2. P. viridis lateribus albo maculatis, abdom
ſegmentis laeuibus.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.
Statura omnino praecedentis et vix diſtinctus. Antennae poſticae et pedes omnes coeruleae, albofaſciatae. Sulcus in abdominis ſegmentis omnino deeſt.

P. vireſcens abdominis ſegmentis faſcia poſtica alba. *faſciatus.*
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.
Praecedentibus valde affinis at diſtinctus videtur. Abdomen vireſcens ſegmento ſingulo faſcia poſtica diſtincta, integra alba.

** *Spinis ocularibus ſubtus dentatis.*

Spinis ocularibus ſubtus dentatis rufus maculis abdominalibus albis. *quadricornis.*
Aſtacus elephas Ent. ſyſt. 2. 479. 4.
Cancer elephas Herbſt. Cancr. fig. 138.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis.
A reliquis omnino diſtinctus, minor. Antennae rufae petiolo anticarum valde aculeato. Spinae oculares quatuor: intermediis maioribus ſubtus dentatis, lateralibus multo inferioribus, breuioribus, inermibus. Thorax valde aculeatus. Abdomen rufum, albo maculatum, ſegmentorum lateribus deflexis, elongatis, baſi dilatatis, dentatis.

PALAEMON. *Antennae* quatuor inae-
quales, pedunculatae.
ſuperiores breuiores,
trifidae, ſetaceae, la-
cinia intermedia bre-
uiore.
inferiores longiſſimae,
ſetaceae, ſimplices.

carcinus. 1. P. chelis aequalibus porrectis muricatis, roſtro adſcendente antennarum ſquamis longiore.
Aſtacus carcinus. Ent. ſyſt. 2. 479. 6.
Cancer carcinus Linn. ſyſt. Nat. 2. 1051. 64.
Rumph. Muſ. tab. 1. fig. B.
Sloan. Iam. 2. 271. tab. 245. fig. 2.
Seb. Muſ. 3. tab. 21. fig. 4.
Habitat in Americae fluuiis.
Corpus amoene coeruleo variegatum. Pedes lacues.

Lar. 2. P. chelis porrectis aequalibus muricatis, roſtro recto antennarum ſquamis aequante.
Habitat in India Dom. Daldorff.
Statura praecedentis at paullo minor. Thorax laeuis antice utrinque dentibus duobus acu-tis. Roſtrum compreſſum, rectum, ſerra-tum. Pedes muricati.

longimanus. 3. P. chelis porrectis inaequalibus laeuibus, ro-ſtro recto antennarum ſquamis aequante.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Praecedentibus minor. Thorax laeuis antice dentibus utrinque duobus. Chelae filiformes

porrectae, laeues ſiniſtra ſemper longiore. Pedes laeues.

P. chelis mediocribus: digitis manu breuioribus, roſtro adſcendente antennarum ſquamis longiore. *breuimanus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Praecedentibus minor. Roſtrum compreſſum, utrinque ſerratum, adſcendens, antennarum ſquamis longius. Thorax laeuis, glaber, antice utrinque bidentatus. Chelae filiformes pedibus paullo longiores, laeues digitis manu breuioribus.

P. chelis mediocribus: digitis manu breuioribus, roſtro antennarum ſquama aequante. *coromandelianus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et ſumma affinitas praecedentis, cuius forte mera varietas. Differt tantum roſtro breuiore, chelarumque digitis breuioribus.

P. chelis longioribus filiformibus: manibus ouatis. *tranquebaricus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus magnitudine P. ſquilla. Roſtrum adſcendens antennarum ſquamis paullo longius, dorſo ſerratum. Thorax laeuis vix dente antico notatus. Chelae longitudine corporis, filiformes, tenuiſſimae, laeues manibus craſſioribus digitis eiusdem longitudinis. Pedes filiformes, laeues.

P. thorace laeui, roſtro ſupra ſerrato ſubtus tridentato, thoracis margine quinquedentato. *ſquilla.*

Aſtacus ſquilla Ent. ſyſt. 2. 485. 23.
Cancer ſquilla Linn. ſyſt. Nat. 2. 1051. 66. Fn. Su. 2037. Seb. Muſ. 3. tab. 21. fig 9. 10.
Habitat in Oceano Europaeo.

locuſta. 8. P. thorace laeui, roſtro porrecto ſupra ſerrato ſubtus laeui, digitis elongatis filiformibus.
Aſtacus locuſta Ent. ſyſt. 2. 486. 24.
Cancer locuſta Linn. ſyſt. Nat. 2. 1051. 65.
Habitat in Oceano Muſ. Dom. Banks.

ſerratus. 9. P. thorace laeui ſubcarinato, roſtro utrinque ſerrato. Ent. ſyſt. 2. 486. 25. *
Habitat in Oceano Norwegico D. Prof. Vahl.

fucorum. 10. P. thorace laeui, roſtro adſcendente apice quinquedentato.
Habitat in Oceani Fuco natante Dom. Daldorff.
Corpus P. ſquilla duplo minus. Thorax laeuis. Roſtrum laeue, apice quinquedentatum.

ALPHEUS. *Antennae* quatuor pedunculatae, inaequales, ſetaceae.
interiores breuiores, bifidae,
exteriores longiores, ſimplices: pedunculi primo articulo baſi ſquamifero.

avarus. 1. A. chelis inaequalibus difformibus, roſtro breui ſubulato.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura et magnitudo P. ſquilla. Thorax laeuis. Antennae interiores coeruleſcentes.

tice roſtro breui, acutiſſimo. Chelae quatuor: anteriores maiores, inaequales, dextra carpo breuiſſimo, rotundato, manu maxima, compreſſa, dorſo biſinuata digitis breuibus, craſſis, ſiniſtra paullo longiore, tenuiore digitis longioribus, poſteriores tenuiſſimae, filiformes.

A. chelis inaequalibus difformibus: manu ſiniſtra minore filiformi. *tamulus.*

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Nimis praecedenti affinis et forte mera eius varietas. Differt tantum manu ſiniſtra filiformi digitis aequalibus.

A. chelis inaequalibus difformibus, thorace antice carinato, roſtro ſubulato. *rapax.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura praecedentium at diſtinctus. Thorax laeuis, glaber, antice carinatus, quae carina in roſtrum breue, ſubulatum tranſit. Chelae quatuor altera mox dextra, mox ſiniſtra manu maiore, compreſſa, laeui digitis breuibus, compreſſis, altera manu paullo minore, compreſſa digitis longioribus, intus piloſis, hiantibus, chelae poſticae tenuiſſimae, filiformes.

A. chelis inaequalibus difformibus: altera palma breui digitis longiſſimis filiformibus. *malabaricus.*

Aſtacus malabaricus Ent. ſyſt. 2. 483. 16.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Corpus praecedentibus minus thorace laeui roſtro breuiſſimo, acuto, chela altera manu

magna, compreſſa pollice incuruo, acu[...]
altera palma minuta digitis longiſſimis, [...]
formibus, parallelis, intus piloſis, apice [...]
tigeris.

ASTACUS. *Antennae* quatuor pedunc[...]
latae, inaequales, ſe[...]
ceae.
interiores breuiores, b[...]
fidae.
exteriores ſimplices: pe[...]
dunculi primo articulo
apice ſpinoſo.

* *Chelis ſex.*

marinus. 1. A. thorace laeui, roſtro lateribus dentato: b[...]
ſi ſupra dente duplici Ent. ſyſt. 2. 478. 1.
Cancer gammarus Linn. ſyſt. Nat. 2. 1051. 6[...]
Fn. Su. 2033.
Baſt. ſubſc. 2. 6. tab. 1.
Penn. Zool. Britann. 4. tab. 10. fig. 21.
Habitat in Oceano frequens.

fluuiatilis. 2. A. thorace laeui, roſtro lateribus dentato, baſ[...]
dente utrinque unico. Ent. ſyſt. 2. 478. 2.
Cancer Aſtacus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1051. 6[...]
Fn. Su. 2034.
Degeer Inſ. 7. 365. 1. tab. 20. fig. 1.
Roeſſ. Inſ. 3. tab. 54. 55.
Sulz. Inſ. tab. 23. fig. 151.
Penn. Zool. Britann. tab. 15. fig. 27.

Habitat in Europae lacubus, fluuiis.

A. thorace laeui, roſtro breui, acuminato, carpis dentatis. *Bartonii.*

Habitat in America boreali Prof. Smith Barton.

Fluuiatili minor. Thorax laeuis, punctatus lateribus antice parum ſcabris. Roſtrum breue, planum, apice acuminatum. Chelae ſex anticis maioribus, brachiis ſerratis. Carpis dentatis, manibus ouatis, laeuibus, punctatis, reliquis quatuor filiformibus.

** *Chelis quatuor.*

A. thorace antrorſum aculeato, manibus priſmaticis: angulis ſpinoſis. Ent. ſyſt. 2. 485. 22. *norwegicus.*

Cancer norwegicus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 1053. 73.

Fn. Su. 2039. Muſ. Lud. Ulr. 456.

Degeer Inſ. 7. 398. 3. tab. 24. fig. 1.

Seb. Muſ. 3. tab. 21. fig. 3.

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 12. fig. 24.

Habitat in mari Norwegico.

A. thorace antice ſcabro, roſtro breui ſubulato, chelis anticis oblongis piloſis. *ſcaber.*

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Praecedente minor. Roſtrum breue, ſubulatum, acutum. Thorax ſcaber dorſo antico ſpinoſo ſpinis utrinque duabus, maioribus, validioribus. Chelae quatuor, anticae maiores brachiis utrinque dentatis, carpis breuibus, ſubtus dentatis, manibus oblongis, ſcabris, hirtis, poſticae breuiores, filiformes.

fuluus. 6. A. thorace laeui, roſtro breui utrinque ſerra-to, manibus compreſſis utrinque crenatis. Ent. ſyſt. 2. 480. 7. *

Habitat in Oceano.

coeruleſcens. 7. A? thorace laeui, roſtro porrecto ſubulato bi-dentato, corpore coeruleſcente. Ent. ſyſt. 2. 480. 8 *.

Habitat in Pelago inter Tropicos Dom. Banks.

fulgens. 8. A? roſtro breuiſſimo ſubulato, inermi, cor-pore albido ſubdiaphano. Ent. ſyſt. 2. 480. 9. *

Habitat in Oceano Braſiliam alluente noctu ful-gens. Muſ. Dom. Banks.

PENAEUS. *Antennae* quatuor inaequa-les, ſetaceae, peduncu-latae ſe inuicem ſuper impoſitae.

ſuperiores breuiores, bi-fidae.

inferiores longiſſimae, ſim-plices, pedunculi articu-lo primo apice ſquama bifida: lacinia exteriore ſpinoſa.

monodon. 1. P. roſtro porrecto adſcendente ſupra ſerrato ſubtus tridentato.

Habitat in Oceano Indico edulis Dom. Daldorf. Corpus maiuſculum, variegatum. Thorax lae-uis dentibus anticis utrinque duobus. Ro-

ſtrum porrectum, adſcendens, ſupra ſerratum, ſubtus tridentatum. Chelae ſex filiformes poſticis longioribus.

P. roſtro recto porrecto ſupra ſerrato ſubtus ciliato. *monoceros.*

Habitat in Oceano Indico eſculentus Dom. Daldorff.

Praecedenti affinis at triplo minor et differt roſtro omnino recto ſubtus inermi.

P. roſtro breui ſerrato, antennis ſuperioribus compreſſis. *planicornis.*

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Diſtinctus a reliquis antennis ſuperioribus bifidis breuibus, compreſſis. Inferiores mihi deſunt. Roſtrum breue, compreſſum, ſupra ſerratum. Thorax laeuis utrinque dente antico eleuato. Pedes omnes filiformes.

CRANGON. *Palpi* exteriores porrecti, ciliati, bifidi: lacinia exteriore breuiore, flabelliformi.

Antennae quatuor pedunculatae, inaequales.

interiores breuiores, bifidae.

exteriores longiſſimae, ſetaceae pedunculo ſquama ciliata ſuffulto.

C. thorace aculeato, pedibus ſecundi tertiique paris filiformibus. *boreas.*

Aſtacus boreas. Ent. ſyſt. 2 483. 18.*
Cancer boreas Phipps It. boreal. 190. tab. 1?
fig. 1.
Habitat in Oceano boreali Muſ. D. Banks.

vulgaris. 2. C. thorace laeui, roſtro breui integerrimo.
Aſtacus Crangon Ent. ſyſt. 2. 486. 26.
Cancer Crangon Linn. ſyſt. Nat. 2. 1052. 6?
Fn. Su. 2038.
Baſt. ſubſ. 2. 27. tab. 3. fig. 1—4.
Seb. Muſ. 3. tab. 21. fig. 8.
Roeſ. Inſ. 3. tab. 63. fig. 1. 2.
Penn. Zool. Britann. 4. tab. 15. fig. 30.
Herbſt. Cancr. tab. 29. fig. 4.
Habitat in mari balthico.

marginatus. 3. C. roſtro breui compreſſo ſubulato, abdominis margine baſi argenteo.
Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.
Statura et magnitudo omnino Crangon vulgaris at diſtinctus margine abdominis ultra dimidium argenteo.

Pedes octo filiformes. Chelae manu ouata unguis arcuata, acutiſſima, mobili.

URUS. *Antennae* quatuor pedunculatae.

interiores filiformes: articulo ultimo bifido, pedunculo uniarticulato, ſpinoſo.

exteriores ſetaceae.

thorace ſuturis quadrifido, cauda ſimplici ſubtus ventricoſo Ent. ſyſt. 2. 468. 1. *Latro.*
ncer *Latro* Linn. ſyſt. Nat. 2. 1049. 56.
mph. Muſ. tab. 4. fig. H. I.
Muſ. 3. tab. 21. fig. 1, 2.
bitat in Indiae orientalis cryptis rupium, terreſtris, nocturnus.

paraſiticus thorace ouato: lateribus ciliatis, pedibus rugoſis hirtis. Ent. ſyſt. 2. 468. 2.* *aniculus.*
bitat in Oceano auſtrali Muſ. Dom. Banks.

Paraſiticus chelis muricatis: dextra maiore. Ent. ſyſt. 2. 469. 3. *Bernhardus.*
ncer *Bernhardus* Linn. ſyſt. Nat. 2. 1049. 57.
Muſ. Lud. Ulr. 454. Fn. Su. 2032.
geer Inſ. 7. 405. 4. tab. 23. fig. 5. 6.
nn. Zool. Brit. 4. tab. 17. fig. 38.
ſt. exſangu. tab. 7. fig. 6. 12.
amm. Bibl. Nat. tab. 11. fig. 1. 2.
ſt. ſubſc. 1. 74. tab. 10. fig. 3. 4.
bitat in Oceano Europaeo intra teſtas Cochlearum, quas vacuas intrat trahitque, mutatas, prout adoleſcit.

hungarus. 4. P. paraſiticus chelis hirtis apice atris: d
maiore, corpore rubro faſciato. Ent. ſyſt.
469. 4.*
Cancer hungarus Herbſt. Cancr. fig. 122.
Habitat in India orientali.

Diogenes. 5. P. paraſiticus chelis muricatis pubeſcent
ſiniſtra maiore. Ent. ſyſt. 2. 469. 5.
Cancer Diogenes Linn. ſyſt. Nat. 2. 1049.
Rumph. Muſ. tab. 5. fig. K. L.
Catesb. Carol. 2. tab. 33. fig. 1. 2.
Kaempf. Iap. tab. 13. fig. 7.
Habitat in Oceano americano, aſiatico
Cochlearum teſtas.

miles. 6. P. paraſiticus chela ſiniſtra maiore utri
muricata, pedum unguibus longiſſimis
ratis. Ent. ſyſt. 2. 470. 6.
Cancer miles Herbſt. Cancr. fig. 114.
Habitat in India orientali.

cuſtos. 7. P. paraſiticus chela ſiniſtra maiore: manu
uiuſcula, pedum unguibus longiſſimis
uibus.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Nimis affinis praecedenti, differt tamen co
re minus hirto, manibus laeuiuſculis
modo ſpinoſis unguibusque vix ferratis.

diaphanus. 8. P. paraſiticus depreſſus chela ſiniſtra m
laeuiuſcula, carpis dorſo dilatatis.
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.
Statura praecedentis at duplo minor et de
ſus. Chela ſiniſtra maior manu compr

margine inferiori ſerrato, carpisque ſubmuricatis margine dorſali dilatato, angulato. Pedes glabri unguis laeuiſſimis.

Paraſiticus thorace laeui integerrimo compreſſo, chela ſiniſtra maiore pedibusque punctatis. Ent. ſyſt. 2. 470. 7.* *clypeatus.*

Cancer clypeatus Herbſt. Canc. fig. 116. 117.

Habitat in India orientali.

P. paraſiticus chelis ſcabris ſubaequalibus, pedibus ſex anterioribus pollicatis. Ent. ſyſt. 2. 470. 8. *eremita.*

Cancer eremita Linn. ſyſt. Nat. 2. 1049. 59.

Habitat in mari Italico intra tophum ſuberoſum, ſubrotundum, apertura transuerſali.

P. paraſiticus ſubcylindricus teſta punctis excauatis. Ent. ſyſt. 2. 470. 9. *tubularis.*

Cancer tubularis Linn. ſyſt. Nat. 2. 1050. 60.

Habitat in Serpulae glomeratae teſta maris mediterranei.

P. paraſiticus chelis muricatis aequalibus oculorum pedunculis thoracis longitudine. Ent. ſyſt. 2. 471. 10.* *oculatus.*

Habitat in Murice Brandaris Oceani.

Chelae muricatae.

P. paraſiticus manibus laeuibus trialatis: dextra maiore. Ent. ſyſt. 2. 471. 11.* *alatus.*

Habitat in Islandiae Bullis Dr. Koenig.

P. paraſiticus chelis aequalibus muricatis, pedibus faſciculato piloſis, oculis clauatis. *ophthalmicus.*

Habitat in Oceano Indico D. Daldorff.

Corpus magnitudine et ſtatura P. oculati
li magni pedunculo breuiore, tenuiore
ſquamula parua acuta. Chelae breues
quales, rufo hirtae valdeque muricatae
des faſciculato piloſi.

araneiformis. 15. P. paraſiticus chelis ſcabris, cauda apice
loſa, unguiculata. Ent. ſyſt. 2. 471. 12.
Habitat in fiſſuris rupium maris Edimburg
intrans helices et turbines.

GALATHEA. *Antennae* quatuor inae-
quales, pedunculatae:
interiores breues, filifor-
mes, triarticulatae:
articulo ultimo bi-
lacinia inferiore ſeta-
cea, multiarticulata,
ſuperiore falcata.
exteriores ſetaceae: pe-
dunculo ſimplici.

ſtrigoſa. 1. G. thorace antrorſum rugoſo ſpinis ciliato, ro-
ſtro acuto ſeptem dentato. Ent. ſyſt. 2. 471.
Cancer ſtrigoſus Linn. ſyſt. Nat. 2. 1052. 69.
Degeer Inſ. 7. 393. 2. tab. 23. fig. 1.
Columu. Aquatic. 8. tab. 6.
Ionſt. Exſangu. tab. 2. fig. 7.
Barr. rar. tab. 1288. fig. 1.
Seb. Muſ. 2. tab. 19. fig. 19. 20.
Act. Helv. 4. 23. tab. 2. fig. 1. 2.
Penn. Zool. Brit. 4. tab. 14. fig. 26.

h. Hiſt. Inſ. tab. 32. fig. 1.
ſitat in Oceano Europaeo.
thorace rugoſo antice ciliato ſpinoſo, roſtro *rugoſa.*
tridente, manibus filiformibus. Ent. ſyſt. 2.
472. 2.
ncer *Bamffius* Penn. Zool. Brit. 4. tab. 14.
fig. 27.
ſitat in mari mediterraneo.

thorace rugoſo ciliato, roſtro tridentato, *gregaria.*
palpis anticis elongatis. Ent. ſyſt. 2. 473. 3.*
ſitat in Oceano Americano Patagoniam al-
luente unde ſaepe mare cruentum videtur.
Praecedentibus multo minor.

thorace laeui, roſtro breuiſſimo emargina- *amplectens.*
to, pedibus inter mediis longiſſimis. Ent.
ſyſt. 2. 473. 4. *
ſitat in Oceano Braſiliam alluente, noctu ful-
gens Muſ. Dom. Banks.

ILLA. *Antennae* quatuor ſubaequales, pedunculatae.
interiores longiores, trifidae.
exteriores ſimplices: pedunculo bifido.

pollice falcato 10dentato, corpore laeuiſſi *maculata.*
mo, cauda utrinque quadridentata. Ent. ſyſt.
2. 511. 1.*
Amph. Muſ. tab. 3. fig. 2.
ſitat in India orientali.

mantis. 2. S. pollice falcato ſexdentato corpore ſub...
lato, cauda ſerrato ſpinoſa. Ent. ſyſt. 2.
511. 2.
Cancer Mantis Linn. ſyſt. Nat. 2. 1084...
Su. 2035.
Degeer Inſ. 7. 533. 5. tab. 34. fig. 1.
Margr. Braſ. 186. tab. 187.
Seb. Muſ. 3. tab. 20. fig. 2. 3.
Habitat in mari aſiatico, mediterraneo.

raphidea. 3. S. pollice falcato octodentato; palmis inter...
rato ſpinoſis.
Habitat in Oceano Indico D. Daldorff.
Statura et magnitudo omnino praecede...
Differt tamen palmis ſerratis ſpiniſque lo...
gioribus armatis polliceque octodentato. C...
pus utrinque ſtriis duabus eleuatis. Cau...
ſerrato ſpinoſa.

phalangium. 4. S. pollice falcato quinquedentato: dente ...
quintoque longioribus, corpore laeu...
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus S. Mantis paullo minor, laeue, glab...
ultime ſegmento ſpinoſo ſerratum.

ichneumon. 5. S. pollice falcato quadridentato cauda ma...
nodoſo ſpinoſo.
Habitat in India orientali D. Daldorff.
Praecedente adhuc minor. Corpus utri...
lineis tribus eleuatis. Cauda rotundata...
nis craſſis nodoſis ciliata.

ſcyllarus. 6. S. manibus rectis ventricoſis, angulatis: p...
lice tridentato. Ent. ſyſt. 2. 512. 3.

ancer *ſcyllarus* Linn. ſyſt. Nat. 2. 1054. 77.
b. Muſ. 3. tab. 20. fig. 6.
abitat in mari aſiatico.

pollice falcato tridentato abdominis ſegmentis duobus ultimis ſpinoſo ciliatis. Ent. ſyſt. 2. 512. 4. * — *ciliata.*
abitat in Oceano Indico D. Spengler.

pollice ſubulato baſi nodoſa rufa. Ent. ſyſt. 2. 513. 5. * — *chiragra.*
illa *arenaria* Rumph. Muſ. tab. 3. fig. F.
tat in Oceano auſtrali Muſ. D. Banks pollice acutiſſimo vulnerans.

thorace laeui carinato: angulis ſubulatis, pollice falcato ſubulato inermi. Ent. ſyſt. 2. 513. 6. * — *vitrea.*
abitat in Oceano atlandico Muſ. D. Banks.

YDON. *Palpi* exteriores foliacei apice unguiculati.
Antennae quatuor ſetaceae pedunculo ſimplici.
interiores breuiores, bifidae.

caudaheptaphylla: foliolo intermedio tranſuerſo truncato. — *depreſſus.*
abitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Corpus cruſta tenuiore ſubpellucida.
Oculi orbiculati pedunculis in medio marginis exterioris immerſi. Pedunculi depreſſi, ſquamaeformes,

cylindrus. 2. P. cauda pentaphylla: foliolo medio tri[...]
lari.
Aſtacus cylindrus Ent. ſyſt. 2. 483. 15.
Habitat in Oceano Indico.

GAMMARUS. *Antennae* quatuor ſim[...]
ciſſimae, pedun[...]
tae:
anticae breues, ſub[...]
tae.
poſticae ſetaceae.

Homari. 15. G. corporis ſegmentis dorſo ſubſpinoſis, c[...]
da faſciculata: ſtylis ſerratis.
Aſtacus Homari Ent. ſyſt. 2. 481. 10.
Stroem. Act. Hafn. 10. 5. tab. 2.
Myli. Zool. Dom. 197. 2358.
Habitat in Oceano Norwegico.
Antennae ſimplices haud bifidae.

---

uniarticulati, approximati ſuper antennarum [...] rum baſin porrecti, triangulares: margine pollic[...] giore exteriore arcuato.

Chelae quatuor, compreſſae absque pollice m[...] anterioribus maioribus, inaequalibus, diſſimilibus, [...] iore mox dextra, mox ſiniſtra. Pedes compreſſ[...] quales, intermedii longiores.

CLASSIS XI.

GLOSSATA.

S LINGVA SPIRALI INTER PALPOS REFLEXOS.

LITHOSIA.

palpis linguaque ſpirali.
us breuis, rotundatus.
i duo breues, in cantho oculorum reflexi, bi-
articulati: articulo primo compreſſo, piloſo,
ſecundo paullo tenuiori, falcato, obtuſiuſ-
culo.
a ſpiralis tenuis, membranacea, thorace
paullo longior.
ae multiarticulatae, ſetaceae.

GALLERIA.

lpis linguaeque ſpiralis rudimento.
r faſciculo pilorum longitudine palporum.
duo breues, reflexi, uniarticulati, baſi cy-
lindrici, nudi, apice incraſſati, piloſi, ob-
liqueque truncati.
e rudimentum inter palpos bifidum.
ae ſetaceae, multiarticulatae: articulo pri-
mo craſſiori, cylindrico.

PHYCIS.

Os palpis quatuor linguaque ſpirali.
Clypeus breuis, piloſus, integer.
Palpi inaequales.
anteriores breuiores, incurui, triarticulati:
ticulo primo craſſiori, ſecundo longiori,
curuo, tertio breuiori ſubulato:
poſteriores elongati, recurui, biarticulati: a
culis aequalibus, primo craſſiori, comp
ſo, piloſo, ſecundo cylindrico obtuſiuſ
Lingua ſpiralis breuis, membranacea.
Antennae ſetaceae, multiarticulatae.

CRAMBUS.

Os palpis linguaque ſpirali.
Clypeus breuis, piloſus, integer.
Palpi quatuor inaequales.
anteriores multo breuiores, uniarticulati baſi
lindrici, apice incraſſati, oblique truncat
poſteriores porrecti, conniuentes, roſtriformi
triarticulati: articulo ſecundo longiſſimo,
timo breui, ſubulato.
Lingua ſpiralis breuis, membranacea.
Antennae ſetaceae, multiarticulatae.

TINEA.

Os palpis linguaque ſpirali.
Clypeus breuis, piloſus, integer.
Palpi quatuor inaequales.
anteriores breues, cylindrici, uniarticulati,

[po]ſteriores porrecti, arcuati, corniformes, bi-articulati: articulis aequalibus: primo craſſiori, compreſſo, villoſo, obtuſo, ſecundo tenuiori, ſetaceo, acuto.
[Lingu]a ſpiralis breuis, membranacea.
[Ante]nnae ſetaceae.

ALUCITA.

[Pa]lpis linguaque ſpirali.
[Cly]peus breuis, piloſiſſimus, integer.
[Palp]i duo elongati, recurui, extus hirſutiſſimi, cylindrici, triarticulati: articulo ſecundo longiori, ultimo apice ſetaceo.
[Lin]gua ſpiralis breuis, membranacea.
[Ante]nnae elongatae, ſetaceae.

YPSOLOPHUS.

[Pa]lpis linguaque ſpirali.
[Palp]i duo valde porrecti, baſi cylindrici, medio dilatati, compreſſi, verſus apicem attenuati, canaliculati, acuti. In medio inſertus unguis elongatus, arcuatus, tenuis, acutus, in canale palpi recondendus.
[Lin]gua breuis, membranacea.
[Ante]nnae filiformes.

PAPILIO. *Palpi* duo reflexi.
Lingua ſpiralis exſerta.
Antennae capitatae.

Manlius. 30—1. P. E. T. alis dentatis caudatis atris v… maculatis: poſticis ſubtus ſtriga macul… albarum.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Affinis videtur P. Phorbanta. Alae antic… pra atrae macula magna media transuer… una alteraue apicis viridibus, ſubtus nigr… immaculatae. Poſticae ſupra macula ma… media, neruis diuiſa ſtrigaque poſticae p… ctis viridibus. Subtus ſtriga e macul… uis approximatis punctoque ad angulum… albis.

Grachus. 30—1. P. E. T. alis dentato caudatis atris v… maculatis: poſticis ſubtus faſcia ſesquial… glauca.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. C… put nigrum punctis quatuor albis. Alae… ticae ſupra atrae macula magna, viridi, ne… uis diuiſa in medio, et quinque minorib… ſenſim decreſcentibus, transuerſim po… pone medium, ſubtus nigrae faſcia obſole… glauca. Poſticae ſupra macula magna… panda in medio maculisque flexuoſis veri… apicem viridibus, ſubtus nigrae faſcia me… abbreuiata poſticaque repanda glaucis.

1. P. F. alis integerrimis concoloribus ni- *Eryx.*
gris baſi albo ſtriatis apice punctatis.
Habitat Cajennae.
Affinis certe P. ſimilis at diſtinctus videtur duplo minor. Caput et thorax nigra, albo punctata. Alae omnino integrae, concolores, baſi ſtriatae, apice punctatae.

3. P. F. alis integerrimis nigris: anticis albo punctatis, poſticis ante apicem albis. *Euphon.*
Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.
Medius. Caput et thorax nigra, albo punctata. Alae anticae concolores, nigrae, verſus apicem albo punctatae. Poſticae ſupra nigrae faſcia lata ante apicem ſtrigaque e punctis apicis albis. Subtus fuſcae, concolores at baſi albo punctatae et in medio puncta quinque minuta alba annulo paruo nigro cincta.

5. P. F. alis repandis atris: anticis flauo punctatis, poſticis faſcia ſtrigisque duabus punctatis flauis. *Phoedon.*
Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.
Statura praecedentis at minor et alius. Antennae nigrae. Caput et thorax atra, albo punctata. Alae anticae concolores, atrae, apice flauo punctatae. Poſticae ſupra atrae maculis duabus marginalibus, faſcia lata medii et punctis apicis flauis in duplici ſerie, ſubtus concolores at pallidiores, baſi atrae albo punctatae et margo interior totus flauus.

interrogationis. 243—4. P. N. alis caudatis fuluis nigro maculatis, ſubtus glaucis: ſtriga punctorum nigrorum, poſticis c aureo notatis.

Habitat in America boreali.

Nimis affinis P. C. aureo at paullo maior et alae ſubtus glaucae ſtriga punctorum nigrorum.

Hierta. 281—2. P. N. alis denticulatis luteis margine nigris: omnibus ocellis duobus, poſticis baſi fuſcis.

Habitat in India orientali.

Statura et ſumma affinitas P. Oenone, cuius varietatem olim credidi at diſtinctus videtur. Corpus fuſcum. Alae omnes flauae margine craſſiori ſinuato, fuſco, poſtico fuſco ſtri- ſo. Oculi duo in ſingula ala: poſtico an- carum maiori. Poſticae baſi fuſcae. Subtus anticae concolores, poſticae cinereae fuſco ſtrigoſae punctis quatuor ocellaribus.

Larinia. 284—5. P. N. alis angulato dentatis variegatis omnibus ſupra ocellis duobus, anticis ſubtus unico, poſticis griſeis coecis.

Papilio Larinia Cram. Pap. 2. tab. 21. fig. C. D.

Habitat in India.

Statura et magnitudo omnino P. Orythia, cuius varietatem olim credidi. Alae anticae ſupra fuſcae maculis fuluis faſciisque duabus pallidis: ocellis duobus, ſubtus variegatae ocello unico. Poſticae ſupra baſi atrae, apice coeruleae ocellis duobus magnis margineque ſtrigoſo, ſubtus obſcure griſeae.

—5. P. N. alis dentatis fuſcis rufo flauoque *Eſra.* variis: omnibus ſupra ocello ſesquialtero: anticis ſubtus unico, poſticis obſcuris coecis. Habitat Cajennae Dom. Richard.

Differre a praecedente videtur. Alae vix angulatae haud atrae, ſed fuſcae. Ocellus alter in pagina ſuperiore minutus. Alae poſticae haud coeruleae, ſubtus obſcurae.

—5. P. N. alis rotundatis fuſco hyalinis: po- *Rhea.* ſticis punctis quinque ocellaribus albis. Papilio *Lena* Ent. ſyſt. 3. 108. 334. β Habitat in America meridionali.

—1. P. N. alis repandis fuſcis: faſcia commu- *Frobenia.* ni fulua anticarum interrupta. Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Magnitudo et ſtatura P. Heliodore. Corpus nigrum, immaculatum. Alae fuſcae faſcia poſtica, communi, fulua anticarum e maculis tribus, ſubtus concolores at pallidiores.

—5. P. N. alis dentatis fuluis atro maculatis, *Hegeſia.* poſticis ſubtus flauis: ſtriga punctorum fuluorum ocellatorum. Habitat in America.

Statura et ſumma affinitas P. Phalanta. Alae ſupra fuluae maculis ſtrigisque atris. Subtus anticae flauae, nigro maculatae, poſticae ſulphureae lunulis fuluo nigris poſticeque ſtriga e punctis ocellatis fuluis, quibusdam coecis.

Blaſius. 488—9. P. N. alis integerrimis fuſcis ſupra
maculatis, ſubtus anticis ocellis tribus,
ſticis ſeptem.

Habitat in India orientali.

Corpus paruum, fuſcum. Alae omnes in
gerrimae, ſupra fuſcae, immaculatae. S
tus vix pallidiores ſtriga media obliqua, al
Anticae pone ſtrigam ocellis tribus atris
de flaueſcente pupillaque alba, interm
minuto. Ocelli annulo communi renifo
includuntur. Margo ſtrigoſus. Poſtic
ocellis ſeptem inaequalibus ſtrigis duabus
datis utrinque coeuntibus cinereis inclu
Margo ſtrigoſus.

Fabia. 587—8. P. D. alis integerrimis albis: anticis pun
cto apiceque nigris, poſticis cinereis imm
culatis.

Habitat in Americae Inſulis.

Corpus medium, cinereum. Alae anticae al
bae puncto paruo medio margineque apic
albis. Poſticae cinereae, immaculatae. Sub
tus omnes cinereae.

Ilea. 587—8. P. D. alis integerrimis albis: anticis pun
cto apiceque nigris, ſubtus omnibus ciner
is: puncto minuto ferrugineo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Omnino diſtinctus a P. Fabia duplo minor. Al
omnes ſupra albae anticis puncto apiceque
nigris, poſticis immaculatis. Subtus omn
cinereae puncto medio minuto, ferrugineo.

6. P. D. alis integerrimis albis: anticis margine exteriori nigro venoſo, poſtico nigro flauo punctato. *Caſſida.*

Habitat in India orientali.

Magnitudo P. Sinapis. Alae anticae albae margine exteriori ſtrigis duabus nigris, quae in medio coeunt et poſtice iterum ad marginem exteriorem nigrum extenduntur. Margo poſticus niger punctis tribus flaueſcentibus. Subtus albae ſtria atra, quae ante apicem puncto atro terminatur. Apex alae flaueſcens. Poſticae ſupra albae margine fuſceſcente, ſubtus flaueſcentes fuſco obſolete venoſae.

9. P. D. alis rotundatis integerrimis flauis extimo nigris, ſubtus immaculatis. *Libythea.*

Papilio *Niſe* Cram. Pap. 2. tab. 20. fig. K. L.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et ſumma aſſinitas P. Hecabe, at alae ſubtus omnes immaculatae.

18. P. D. alis rotundatis albis: anticis apice poſticis maculis ſex margineque nigris. *Callirrhoe.*

Mant. Inſ. 2. 20. 215.

Habitat in India.

Varietatem ſexus P. Leucippe credidit a Linné at vix rite. Corpus magnum, cinereum. Alae anticae ſordide albae apice nigrae macula magna, fulua, ſubtus albidae apice marmoratae. Poſticae albidae margine maculisque ſex ante marginem nigris. Subtus totae marmoratae.

Larra. 653—4. P. D. alis rotundatis integerrimis fu
margine nigro, ſubtus pallidioribus: p
ctis duobus argenteis.
Habitat in America.
Corpus magnum, nigrum, cinereo villo
Alae ſupra fuluae, nitidae margine ten
me nigro, ſubtus magis flaueſcentes ſt
aliquot undatis brunneis punctoque me
gemino in anticis ferrugineo, in poſticis a
genteo.

Titania. 655—6. P. D. alis integerrimis rotundatis
flauis apice albis, ſubtus griſeis: poſt
puncto gemino argenteo.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura et magnitudo P. Eubule. Corpus
tum, cinereum antennis fuluis. Alae
baſi flauae, tunc albae anticis apice p
nigris, poſticis immaculatis. Subtus
griſeae anticis puncto medio ferrugineo, p
ſticis punctis duobus argenteis annulo ferru
gineo cinctis: altero minore.

Narciſſus. 672—3. P. S. alis integerrimis fuſcis: area ru
anticis utrinque ocello poſticis duobus
nutis.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldorff.
Statura et magnitudo P. Hyperbii. Antennae
nigrae, albo annulatae. Alae anticae fuſ
area rufa et in hac ocellus niger papilla alb
ſubtus concolores at pallidiores. Poſticae
ſupra fuſcae area rufa ocellis duobus mino

tis pupilla alba, ſubtus baſi obſcurae apice pallidiores ocellis duobus minutis pupilla alba.

4. P. S. alis integerrimis fuſcis: poſticis ſupra ocellis duobus minutis, ſubtus ſex; exteriori remoto. *Miris.*

Habitat in Germania.

Affinis certe P. Leander at diſtinctus videtur. Alae anticae ſupra fuſcae, immaculatae; ſubtus flaueſcentes ocellis tribus ſtrigaque terminali, argentea, poſticae ſupra fuſcae ocellis duobus aut tribus minutis pupilla alba, ſubtus flaueſcentes ocellis ſex exteriori remoto. Ante ocellos ſtriga abbreuiata alba, pone ſtriga argentea fere terminalis.

HESPERIA. *Palpi* duo compreſſi, hirti, apice cylindrici, nudi.
Antennae claua oblonga, ſaepius uncinata.

4. H. R. alis bicaudatis coeruleis: limbo fuſco, ſubtus cinereis, poſticis punctis duobus apicis atris. *Cippus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura H. ſphinx. Antennae nigrae. Alae ſupra cyaneae, nitidae limbo inprimis in anticis fuſco. Subtus cinereae, nitidae, anticae immaculatae, poſticae ſtriga poſtica obſcuriore punctisque duobus magnis, atris. Caudae duae ſetaceae, nigrae, apice albae.

Longinus. 77—8. H. R. alis caudatis cyaneis: limbo atro ſubtus cinereis: poſticis ſtriga lunulari ... ctisque duobus atris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino et magnitudo H. Cippi, at ... da tantum unica. Alae ſupra cyaneae, ni... tidae limbo inprimis anticarum nigro. Sub... tus omnes cinereae, anticae immaculatae, ... poſticae ſtriga poſtica e lunulis nigris. An... gulus ani punctis duobus atris. Cauda elon... gata, atra apice alba.

Cnejus. 100—101. H. R. alis caudatis coeruleſcentibus: limbo fuſco, ſubtus cinereis albo undat... poſticis punctis plurimis baſeos duobusque apicis ocellaribus atris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis certe H. Strabo. Antennae nigrae clava acuminata. Alae omnes ſupra coeruleo niti... dae limbo fuſco, poſticae interdum faſciola nr... ſa punctis atris, interdum immaculatae. Sub... tus cinereae albo undatae, poſticae baſi pun... ctis quatuor ſuboccllaribus atris. Angulus ani macula rufa et in hac puncta duo atra: iride aurea. Cauda apice albida.

Eleus. 180—1. H. R. alis emarginatis fuſcis: anticis utrinque diſco fuluo nigro punctato, poſti... cis faſciola fulua, ſubtus cinereis nigro pun... ctatis.

Habitat in Germania.

Affinis certe H. Helle at omnino diſtincta. An... tennae fuſcae, albo annulatae, claua oblon...

ga nigra, apice ferruginea. Alae anticae fuſcae diſco fuluo, nitido punctis maioribus nigris, ſubtus cinereae diſco fuluo punctis ſubocellaribus atris. Poſticae valde emarginatae et fere bicaudatae, fuſcae, nitidae faſcia abbreuiata, dentata, fulua, ſubtus cinereae punctis minutis nigris ſtrigaque poſtica obſoleta, fulua.

1—2. H. R. alis integerrimis fuluis nigro maculatis: poſticis ſubtus fuſco alboque variis. *Zachaeus.*
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Minutus. Alae omnes ſupra fuluae, nigro maculatae. Subtus anticae fuſcae macula baſeos fulua faſcia in medio flexuoſa lunulisque apicis albis. Poſticae albo fuſcoque variae.

1—3. H. U. alis diuaricatis fuſcis: anticis macula ſtrigaque maculari fuluis, poſticis immaculatis. *Phocion.*
Habitat in America meridionali Dom. v. Rohr.
Statura omnino H. Comma. Antennae obſcurae claua nigra. Alae anticae fuſcae macula magna oblonga, ſubmarginali ſtrigaque pone medium fuluis. Subtus concolores at pallidiores. Poſticae immaculatae, ſupra fuſcae, ſubtus griſeae.

6—7. H. U. alis integerrimis diuaricatis ſupra fuſcis ſubtus brunneis: margine poſtico tenuiſſime fuluo. *Naſo.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldorff.
Statura omnino H. Linea. Corpus ſupra nigrum ſubtus fuluum. Alae omnes ſupra fuſ-

cae, ſubtus brunneae, immaculatae m
ne poſtico tantum utrinque tenuiſſime l

Bion. 240—1. H. U. alis diuaricatis fuſcis: anti
cula marginali, poſticis diſco fuluis.
Habitat in America meridionali Dom. v. R
Statura parua praecedentium. Corpus fu
ore albo. Alae anticae ſupra fuſcae m
fere marginali fulua, ſubtus fuſcae m
exteriori late fuluo. Poſticae ſupra fuſcae
cula magna diſci fulua, ſubtus cinereae
gine interiori parum fuluo.

Maro. 242—3. H. U. alis integerrimis diuaricatis fl
apice fuſcis flauo maculatis, poſticis ſubt
fuſco punctatis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura praecedentium. Corpus nigrum. A
tennae ſupra fuſcae, ſubtus flauae. Al
ticae ſupra baſi flauae margine tenuiori
co lineola flaua, apice fuſcae maculis m
flauis. Subtus concolores. Poſticae fu
puncto baſeos diſcoque flauis. Subtus
uae, fuſco punctatae.

Ericus. 267—8. H. U. alis ſubcaudatis fuſcis: pun
anticis feneſtratis minutis, poſticis ſubt
macula poſtica flaueſcente.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura omnino H. Phocas. Caput grande
pis craſſis, hirtis, apice cylindricis, nud
Antennae uncinatae. Alae anticae fuſcae
punctis tribus feneſtratis, minutiſſimis. Sub

tus concolores at pallidiores. Poſticae ſubcaudatae, ſupra immaculatae, ſubtus pallidiores macula ante marginem flaueſcente.

3. H. U. alis ecaudatis fuſcis: anticis hyalino maculatis maculaque flaua, poſticis ſubtus cinereis atro punctatis. *Gremius.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo H. Thrax. Antennae uncinatae, nigrae. Corpus ſupra fuſcum, ſubtus cinereum. Alae anticae concolores maculis hyalinis et verſus marginem tenuiorem macula flaua. Poſticae ſupra fuſcae, immaculatae, ſubtus cinereae punctis diſci ocellatibus atris.

90. H. U. alis ecaudatis fuſcis: anticis hyalino maculatis, poſticis ſubtus ſtriga interrupta alba. *Nero.*

Habitat in Americae Inſulis.

Statura et magnitudo. H. Lucas. Alae anticae concolores, fuſcae, hyalino maculatae, poſticae ſupra immaculatae, ſubtus obſcuriores ſtriga media maculari alba.

90. H. U. alis ecaudatis fuſcis: anticis utrinque hyalino maculatis, poſticis ſubtus punctis albis. *Mathias.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Minor H. Lucas. Corpus fuſcnm, immaculatum. Alae anticae concolores, fuſcae, hyalino maculatae, poſticae fuſcae, ſupra immaculatae, ſubtus punctis quinque albis.

Flaccus. 347—8. H. U. alis integerrimis reverſis ſu[...]
anticis hyalino punctatis, poſticis punc[...]
ciaque albis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus paruum, ſupra fuſcum, ſubtus al[...]
Alae anticae fuſcae punctis aliquot fene[...]
tis, ſubtus concolores, at pallidiores.
ſticae reuerſae, fuſcae puncto faſciaque [...]
dia, quae tamen margines haud atting[...]
bis. Subtus pallidiores.

Remus. 348—9. H. U. alis integerrimis ſubreuerſi[...]
gris: poſticis ſubtus faſcia repanda [...]
puncto fuſco.
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Corpus paruum, nigrum. Antennae [...]
tae. Alae omnes ſupra uti anticae ſubtus [...]
grae, immaculatae, poſticae ſubtus [...]
repanda alba et in hac punctum par[...]
fuſcum.

SPHINX. *Palpi* duo reflexi, pilo[...]
Lingua ſpiralis cornea, [...]
ſerta.
Antennae ſquamatae.

Lachesis. 26—7. S. alis integris: poſticis nigris luteo[...]
ciatis, abdomine nigro flauo faſciato.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Nimis S. Atropos affinis at magis obſcura. [...]
ſubtus flauae puncto baſeos ocellari fa[...]
que plurimis nigris.

7. S. alis integris cinereis: anticis nigro ſtriatis, poſticis faſciatis, abdomine maculis lateralibus atris. *Abadonna.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino S. Conuoluuli at duplo minor. Antennae albae ſquamis fuſcis. Caput album. Thorax albo nigroque varius. Abdomen cinereum maculis lateralibus atris. Alae cinereae maculis ſtriisque variis fuſcis. Poſticae cinereae faſciis nigris. Subtus anticae obſcurae, poſticae cinereae ſtrigis undatis, fuſcis.

BOMBYX. *Palpi* duo compreſſi, reflexi.
Lingua breuis, membranacea.
Antennae filiformes.

16. B. alis patulis: anticis obſcuris, ſubtus ocello atro, poſticis ſupra teſtaceis: ocello magno atro. *Eryx.*

Habitat in India Dom. Redouté.

Magna. Caput et thorax fuſca. Alae anticae ſupra obſcurae ſtrigis duabus maculaque media obſcurioribus, ſubtus magis ferrugineae ocello medio atro pupilla niuea ſtrigaque poſtica obſcuriore. Poſticae ſupra ferrugineae ſtriga e lunulis nigris margineque poſtico obſcuro. In medio ocellus maximus iride magna atra in medio obſcurus maculis tribus magnis, atris: pupilla parua alba. Subtus ſubferrugineae puncto medio niueo.

brunnea. 45—6. B. alis ſubreuerſis brunneis: ſtrigis ſcurioribus ſupra tribus, ſubtus duabus.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus magnum, totum brunneum, im[illegible] latum. Alae integrae, brunneae ſupra [illegible] gis tribus anteriore obſoleta fuſcis, [illegible] pallidiores ſtrigis duabus.

lobolina. 83—4. B. alis ſubreuerſis griſeis: faſciis und[illegible] atris lunulaque centrali niuea.
Bombyx lobolina Wien. Verz. 57. 6.
Klemann. 2. 79. 28. tab. 12.
Hybn. Beytr. 2. 1. tab. 2. fig. L. ♀
— — — tab. 3. fig. L. ♂
Eſp. Pap. 3. 114. 27. tab. 22. fig. 5. 6.
— — — — tab. 82. fig. 3. 4.
Habitat in Europae Pino.
Larua flaueſcens: inciſuris violaceis lineol[illegible] lateralibus transuerſis atris.
Puppa folliculata, glabra, brunnea.
Quies 24dierum.

criſtata. 94—5. B. alis deflexis cinereo fuſcis albo [illegible] ſis, thorace niueo: criſta nigricante.
Habitat in noua Hollandia Dom. Weber.
Magna. Caput et thorax hirta, niuea, [illegible] dio dorſi criſta parum eleuata, oblong[illegible] gricante. Abdomen cinereum. Alae flexae, obſcure cinereae ſtrigis albis, [illegible] bus baſeos, duabus approximatis, [illegible] pone medium unicaque verſus apicem [illegible] ta. Poſticae cinereae margine albo.

5. B. alis deflexis brunneis: macula media fuſca ſtrigaque poſtica punctorum ferruginëorum. *hepatica.*

Habitat in Germania auſtraliori.

Media. Caput et thorax hirta, brunnea. Antennae vix pectinatae. Abdomen ſupra pallidum, ſubtus brunneum. Alae anticae brunneae macula media obſcuriore. Verſus marginem poſticum ſtriga e punctis ferrugineis, diſtinctis ſubtus diſco fuſco. Poſticae ſupra fuſcae, ſubtus brunneae puncto medio ſtrigaque poſtica fuſcis.

1. B. alis deflexis niueis: poſticis ſupra puncto anali, ſubtus puncto medio atris. *virginica.*

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura et ſumma affinitas B. Menthaſtri. Caput et thorax niuea ore tantum fuluo. Abdomen niueum lineis tribus punctorum nigrorum lateribusque parum fuluis. Alae anticae niueae, immaculatae, poſticae ſupra puncto ad angulum ani, ſubtus in medio atris. Pedes albi femoribus anticis ſupra fuluis puncto baſeos atro.

2. B. alis deflexis teſtaceis fuſco ſtrigoſis: macula media transuerſa alba. *transuerſa.*

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Media. Antennae pectinatae. Caput et thorax obſcure teſtacea, immaculata. Alae anticae ſupra teſtaceae ſtrigis quatuor margineque poſtico fuſcis. In medio macula trans-

uerſa niuea. Poſticae fuſcae. Subtus con- nes cinereae puncto medio ſtrigaque poſtica fuſcis.

diſcors. 153—4. B. alis deflexis cinereis: poſticis albis: antennis apice ſetaceis.

Habitat in Hungaria Muſ. Dom. Boſc.

Antennae pectinatae, apice ſetaceae. Caput et thorax hirta, nigricantia. Abdomen ſcum. Alae anticae cinereae, maris fere maculatae, faeminae obſcuriores, fuſco datae et pone medium ſtriga e punctis tis nigro albis. Poſticae albae. Pedes an- nulati.

Venutia. 158—9. B. alis deflexis fuſcis: vitta flexuoſa alba: punctis tribus ferrugineo nigris.

Phalaena Venutia Cram. Pap. tab. 165. fig.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Forte cum B. grata proprii generis at ſpecimen noſtrum mutilatum. Caput villoſum, album. Thorax villoſus, albus lineis quatuor Abdomen flauum punctis dorſalibus Alae anticae ſupra nigrae vitta in medio xuoſa alba, quae tamen marginem haud tingit. In hac vitta puncta tria: ante- bus duobus minoribus, altero fuſco al- faluo, poſteriori in medio maiori, transuer- ſo ſubtus flaueſcentes: punctis tribus neque poſtico fuſcis. Poſticae concolores puncto medio margineque poſtico fuſcis.

ſtricta. 179—80. B. alis deflexis flauis: lineola margineque poſtico ferrugineis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo B. Ruſſula. Antennae pectinatae apice fere ſetaceae, fuſcae. Corpus flauum. Alae flauae lineola media atomisque paucis ferrugineis. Margo poſticus tenuiſſime ferrugineus. Alae poſticae uti omnes ſubtus albidae.

Flauia. 7. B. alis atris; maculis albis, poſticis flauis nigro maculatis.

Fueſl. Magaz. 2. 1. tab. 1. fig. 11.

Habitat in Heluetiae montibus Dom. de Clairville.

Statura B. Caja. Thorax niger faſcia antica alba. Abdomen rufum linea dorſali anoque atris. Alae atrae linea baſeos ſtrigae anticae iuncta, pone medium cruce flexuoſa albis. Poſticae flauae maculis aliquot atris. Larua atra pilis cinereis hirſuta.

obſcurata. 5. B. alis deflexis fuſco hyalinis immaculatis.

Habitat in Ruſſia meridionali Dom. Boeber.

Minor B. hyalinae. Antennae valde pectinatae. Alae omnes obſcurae, fere hyalinae, immaculatae.

teſtacea. 16. B. alis incumbentibus teſtaceis immaculatis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Ruſtica media. Alae teſtaceae, ſupra immaculatae, ſubtus macula media fuſca.

perſpicua. 16. B. alis incumbentibus cinereo ſubhyalinis: lineola media tranſuerſa nigra.

Habitat in India orientali.

Statura praecedentis. Antennae pectina[...] Alae obſcure cinereae, fere hyalinae line[...] media transuerſa, fuſca. Poſticae ut o[...] nes ſubtus parum pallidiores.

2ſtrigata. 219—20. B. alis incumbentibus griſeis: ſtri[...] duabus undatis nigris.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Ruſtica parua, griſea. Antennae valde p[...] natae. Alae omnes griſeae, anticae ſu[...] ſtrigis duabus undatis nigris, altera in [...] dio, altera poſteriori.

elata. 222—3. B. alis conuolutis atris coccineo alboque variegatis: poſticis albis apice atris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino B. bella. Antennae nigrae [...] put et thorax nigro alboque varia thor[...] margine coccineo. Abdomen niueum [...] tus utrinque ſtriga punctorum nigrorum [...] que barbato fuſco. Alae concolores, [...] cae atrae, coccineo maculatae, basi co[...] neae punctis atris iride alba, in medio [...] culae duae niueae, altera quadrata, alt[...] lunata. Poſticae niueae, apice atrae.

COSSUS. *Palpi* duo breuiſſimi, cylindrici, reflexi.
Lingua ſpiralis nulla.
Antennae breues, filiformes.

C. niueus alis punctis numeroſis transuerſis cyaneis parique ferrugineo, thoracis dorſo cruce cyanea. *Verbaſci.*

Habitat Monſpeliae in Verbaſco. Dom. Brouſſonet.

Praecedentibus minor. Caput villoſum, album ore nigro. Antennae valde pectinatae, albidae. Thorax valde villoſus albus cruce magna dorſali cyanea. Abdomen villoſum, niueum ſtria laterali duabusque dorſalibus e punctis nigris. Alae niueae punctis paruis coſtalibus, duobus in medio maioribus transuerſis marginis tenuioris, magna transuerſa verſus apicem cyaneis. Praeterea par punctorum ferrugineorum, altero ad coſtam ante maculam transuerſam maiorem, altero ad angulum ani. Poſticae niueae ſupra immaculatae, ſubtus puncto medio nigro. Pedes villoſi, niuei, apice nudi, nigri.

NOCTUA. *Palpi* compreſſi, piloſi, apice cylindrici, nudi.
Lingua porrecta, cornea.
Antennae ſetaceae.

15. N. alis patulis eroſo dentatis obſcuro variis: anticis macula media flaueſcente. *eroſa.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Corpus paruum, obſcurum. Alae omnes ... ſo dentatae, baſi cinereae ſtriga undata, ... in medio macula flaueſcens annulo albo ... ēta, apice obſcuro variegatae. Subtus ... nes variegatae, poſticae apice glauceſcen...

Nyctea. 16—17. N. alis patulis fuſco alboque variis: ... ticis linea ſpirali conuoluta, ſubtus ferrugi... neis fuſcoſtrigoſis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura et magnitudo omnino N. ſpiralis. Cor... pus variegatum abdomine fuſco cingulis ... bis umbraque rufa. Alae anticae variegatae ... linea media ſpirali. Margo poſticus cine... us ſtrigis undatis fuſcis, ſubtus ferrugin... ſtrigis duabus fuſcis. Margo poſticus fuſc... ferrugineo maculatus. Poſticae fuſcae ... cia media alba: ſtriga dentata alba. Ma... poſticus cinereus, nigro undatus. Subtus ... ferrugineae puncto ſtrigis tribus ſtrigaque ... punctis fuſcis.

nictitans. 100—1. N. laeuis alis deflexis fuſcis: puncto me... dio ocellari coeruleo.

Habitat in India orientali.
Media. Corpus cinereo fuſcum. Alae cine... reo fuſcae vix ſtriga una alteraue obſcuriore. In medio punctum ocellare diſtinctum, coe... ruleſcens. Poſticae ſubtus albae ſtriga und... ta, fuſca.

turcica. 100—1. N. laeuis alis deflexis cinereis: lunula media atra.

Habitat in India orientali.

Statura praecedentis. Alae cinereae, vix ſtrigoſae lunula magna media atra. Subtus griſeae.

5—6. N. laeuis alis deflexis nigris: anticis margine tenuiore et poſtico cinereis, poſticis albo maculatis. *panthorina.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura N. tigrinae at paullo minor. Corpus fuſcum abdomine cineraſcente. Alae anticae nigrae margine tenuiori et poſtico late cineraſcente. Poſticae nigrae maculis tribus duabusque marginalibus albis. Subtus pallidae, anticae faſciis duabus fuſcis, poſticis puncto medio ſtriga faſciaque repanda nigris.

7—8. N. laeuis alis deflexis nigris: faſciis duabus albis; poſteriore angulata punctoque ocellari atro anguli ani. *angulata.*

Habitat in Friendly Islands Muſ. Dom. Banks.

Statura et magnitudo N. geometricae. Corpus obſcurum antennis palpisque albis. Alae nigrae faſcia ante medium obliqua et altera pone medium angulata albis. Ad angulum ani punctum ocellare atrum. Poſticae nigrae faſcia alba. Subtus omnes fuſcae faſcia alba.

9—10. N. laeuis alis deflexis atris nitidulis immaculatis. *madida.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino N. niueae. Antennae ſubtus albidae, ſupra nigrae. Corpus atrum, ni- tidum. Femora poſtica valde ciliata.

gemina. 132—3. N. laeuis alis deflexis cinereis: faſcia duabus brunneis punctoque poſtico gemi- no atro.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo omnino N. repandae. An- tennae nudae. Caput et thorax cinerea. Alae anticae cinereae faſcia lata ante medium brunnea. Faſcia haec in medio pallidior puncto diſtincto brunneo margineque poſt- co ſinuato. Faſcia altera latior, repanda ap- ce puncto gemino atro. Poſticae baſi obſcu- rae, apice pallidiores: faſcia obſcura. Sub- tus flaueſcentes ſtriga obſcuriore.

obſcura. 136—7. N. laeuis alis deflexis obſcuris: ſtriga po- ſtica punctata fuſca, ſubtus cinereis imma- culatis.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom. v. Rohr.

Statura media praecedentium. Corpus obſcu- rum. Alae obſcurae, apice pallidiores ſtri- ga e punctis fuſcis.

Subtus omnes cinereae, immaculatae.

faſciata. 137—8. N. laeuis alis deflexis fuſcis: puncto ſtri- gaque albis, poſticis ſubtus ſtriga punctorum alborum.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura praecedentium. Corpus fuſcum, ſub- tus albidum. Alae longitudine corporis

Palpi apice albi. Alae omnes ſupra fuſcae aut cinereae, anticis puncto paruo centrali ſtrigaque poſtica albis, poſticis ſtriga tantum albida. Subtus anticae concolores, poſticae baſi cinereae ſtrigis undatis fuſcis, apice fuſcae ſtriga punctorum alborum.

8—19. N. criſtata alis deflexis cinereis: ſtrigis undatis obſcurioribus, in medio fuſcis: maculis ordinariis flauis. *cinerago.*

Habitat Kiliae.

Media. Statura praecedentium. Corpus cinereum. Alae cinereae, nitidulae ſtrigis 5—6. undatis obſcurioribus. Media pars alae fuſceſcens maculis duabus flauis: anteriore minore orbiculata, poſteriore reniformi lacte flauis. Subtus cinereae.

8—19. N. criſtata alis deflexis obſcure flauis fuſco undatis punctoque medio fuſco. *ochrago.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Parua. Antennae cinereae. Corpus cinereum. Alae anticae obſcure flaueſcentes ſtrigis undatis fuſcis. In medio alae punctum magnum, obſcurum. Poſticae fuſco cinereae.

3—4. N. criſtata alis deflexis cinereo fuſcoque variis: macula oblonga baſeos nigra. *marmorea.*

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Statura et magnitudo omnino N. Linariae. Caput et thorax griſea. Abdomen cinereum. Alae deflexae, cinereae, mox magis mox minus fuſco variae. Ad baſin marginis te-

nuioris macula ſubocellaris griſea et
iacet macula oblonga diſtincta nigra.
culae ordinariae in medio, anterior
poſterior maior reniformis. Poſticae
albidae puncto medio ſtrigaque poſtica

dimidiata. 274—5. N. criſtata alis deflexis baſi cinereis
ce fuſcis cinereo ſtrigoſis.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Parua. Corpus obſcurum. Alae obſcurae,
cinereae, apice fuſcae ſtrigis plurimis,
tis, cinereis. Macula obſcurior in medio
colore fuſceſcente. Poſticae fuſcae.

pumila. 275—6. N. criſtata alis brunneis: macula media
flaueſcente punctoque centrali atro.

Habitat Kiliae.

Statura et magnitudo N. Piſi. Caput et tho-
rax brunnea, immaculata. Alae anticae
brunneae, pallidius maculatae puncto cen-
trali, minuto, atro et pone hoc verſus mar-
ginem craſſiorem macula magna, transuer-
ſa flaueſcens. Poſticae cinereae ſubtus ma-
cula media fuſca.

conuergens. 297—8. N. criſtata alis deflexis ſubdentatis gri-
ſeo fuſcis apice cinereis: angulo ani macula
fulua.

Noctua conuergens Wien. Verz. 84. 8.

Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schiffermyller.

Alae ultra medium fuſco griſeoque variae baſi
lineola atra. In medio maculae ordinariae,
poſteriore reniformi: lunula obſoleta alba,

apice cinereae macula anali ferruginea punctisque marginalibus nigris.
Larua coeruleſcens lineis punctisque albis, capite brunneo.

N. criſtata alis deflexis dentatis nigris atro undatis apice cineraſcentibus: poſticis baſi maculisque duabus marginalibus albis. *alchymiſta.*
Noctua alchymiſta Wien. Verz. 89. 5.
Noctua conuergens Ent. ſyſt. 3. 100. 298.*
Habitat in Europae Quercu.
Larua cinerea flauo ſubpunctata: ſpinis duabus dorſalibus, duabusque caudalibus, capite coeruleo.
Puppa folliculata, nigra, antice truncata, brunnea.

1. N. criſtata alis deflexis nigris albo variis: *pupilla.* puncto medio ocellari diſtincto.
Habitat Kiliae.
Statura et magnitudo N. riuularis. Caput et thorax variegata. Alae nigrae, albo undatae puncto medio diſtincto annulo niueo cincto. Poſticae fuſcae.

10. N. criſtata alis deflexis nigro alboque *Panthea.* variis: puncto medio diſtincto atro.
Habitat in Heluetiae Pino Dom. de Clairville.
N. ludificae affinis. Caput album antennis nigris. Thorax albo nigroque varius. Abdomen atrum ſegmentorum marginibus albis. Alae albo nigroque variae, in medio macula magna alba et in hac punctum diſtinctum,

atrum. Poſticae cinereae margine ni-
punctato.

Larua piloſa, fuſca: dorſo albo nigro ma-
to faſciculo colli caudaeque.

Roeſſ. Inſ. 3. tab. 48.

Puppa folliculata, brunnea.

Vitis idaea. 381. N. criſtata alis deflexis fuſcis: poſticis
alba.

Noctua vitis idaea Linn. ſyſt. Nat. 2. 853.
Fn. Su. 1169.

Habitat in Succiae Vitis idaea.

Nimis affinis N. Arbuti at alae poſticae
faſcia alba.

HYBLAEA. *Palpi* porrecti, compr-
in medio dilatati.
Labium porrectum,
tum.
Antennae ſetaceae.

ſcabra. 4—5. H. alis deflexis compreſſis obſcuris:
tribus undatis punctoque eleuato piloſo.

Habitat in America boreali D. v. Rohr.

Media. Palpi magni, valde compreſſi. An-
nae ſetaccae. Caput et thorax criſtatus.
ſcura, immaculata. Alae valde compr-
adſcendentes, obſcurae ſtrigis tribus und-
atris punctoque medio eleuato e faſcicu-
lorum.

obliqua. 7. H. alis deflexis brunneis nigro irroratis:
obliqua fuſca.

Habitat in — —

Statura parua H. ſagittae. Palpi valde porrecti albo nigroque varii. Alae brunneae atomis numeroſis minutiſſimis nigris. Striga fuſca a marginis exterioris medio ad apicem ducta et ante apicem macula marginalis cinerea, linea nigra incluſa et in hac macula puncta tria coſtalia, albida. Poſticae cinereae.

H. alis deflexis fuſcis: anticis litura apicis albida. *liturata.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldorff.

Reliquis minor. Corpus obſcurum. Alae fuſcae ſtriga una alteraue obſoleta. Anticae apice litura flexuoſa albida.

PHALAENA. *Palpi* cylindrici.
Lingua porrecta, membranacea.
Antennae filiformes.

17. P. pectinicornis alis angulatis obſcure cinereis: puncto medio ſtrigisque duabus punctorum nigrorum. *perſpicaria.*

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Paullo maior Ph. triſtriariae, tota obſcure cinerea. Alae omnes ſupra puncto medio ſtrigisque duabus poſticis e punctis minutis, atris. Subtus pallidiores puncto medio ſtrigaque unica atris.

18. P. pectinicornis alis falcatis pallide teſtaceis: faſcia media obſcuriore flauo notata, margine poſtico coeruleo. *harparia.*

Bombyx harpagala Eſp. Phal. 3. tab. 73. fig. 1. 2.

Habitat in Heluctiae Tilia Dom. de Clairv

Statura omnino P. cultrariae. Alae valde ... catae at haud eroſae, pallide teſtaceae ... medium ſtriga flexuoſa, in medio faſcia ... punctis aliquot flauis, poſtice ſtriga undu... obſcurioribus. Margo poſticus coeruleſc...

Larua ferruginea capite ſpinoſo, dorſo ant... ſpinis duabus, cauda acuta.

Puppa denſe folliculata, pallida antice dentic... lis recuruis.

obſcuraria. 27—28. P. pectinicornis alis dentatis obſcu... nigris.

Habitat in Gallia.

Magna. Antennae pectinatae ferrugineo nigr... Alae var... que variae. Corpus obſcurum. ... de dentatae, obſcurae, anticis ſtrigis duabus ... poſticis unica atris. Subtus omnes pall... pallidiores puncto medio atro ſtrigaque ob... ſoleta pallida.

crocataria. 43—4. P. pectinicornis alis flauiſſimis: atomis ... culaque transuerſe marginis tenuioris pal... de obſcuris.

Habitat in Virginia Dom. Boſc.

Minor P. prunaria. Antennae pectinatae, obſc... rae. Corpus flauum. Alae omnes flauiſſima... atomis et ad marginem tenuiorem verſus ... gulum ani macula transuerſa pallide obſcu...

In poſticis macula oppoſita ad marginem exteriorem. Subtus concolores.

3. P. pectinicornis alis cinereis: ſtrigis duabus punctoque medio transuerſo nigris; ſtriga poſteriore punctata. *belgaria.*

Phalaena belgaria Hybn. Beytr. 2. 4. tab. 2. fig. N.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Media. Antennae pectinatae, apice ſetaceae. Alae cinereae ſtriga antica incurua, in medio puncto magno transuerſo ſtrigaque poſtica punctata nigris. Margo ipſe punctatus. Poſticae uti omnes ſubtus puncto medio ſtrigaque poſtica punctata fuſcis.

4. P. pectinicornis alis omnibus cinereis: ocello medio ferrugineo ſtrigaque nigro punctata. Linn. Fn. Su. 1244. *pandularia.*

Clerk. Phal. tab. 7. fig. 5.

Habitat in Galliae Salice Dom. Boſc.

Alae omnes albidae in medio puncto ocellari ferrugineo. Pone medium ſtriga e punctis nigris margoque nigro punctatus. Subtus concolores at absque ocello.

5. P. pectinicornis alis omnibus cinereis fuſco irroratis: ocello medio ſtrigaque ſubundata fuſca. *circularia.*

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Statura omnino praecedentis. Alae omnes cinereae atomis fuſcis. In medio punctum ocellare album annulo fuſco et in anticis po-

ne hoc, in poſticis per hoc ſtriga fuſca. Po-
ſtice ſtriga fere obſoleta e punctis nigr-
Subtus omnes albidae ſtriga e punctis nigr-

omicraria. 64—5. P. pectinicornis alis albidis: annulo ge-
mino fuſco.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Parua, tenera. Alae anticae albidae, in medio
annulo geminato, fuſco. Margo poſticus
nigro punctatus. Poſticae margine tantum
nigro punctato. Subtus omnes niueae, im-
maculatae: coſta anticarum teſtacea.

hyalinaria. 86—7. P. pectinicornis alis fuſco hyalinis: anti-
cis apice ferrugineis; faſcia obliqua alba.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura praecedentium. Caput atrum. Tho-
rax ferrugineo hirtus. Abdomen ſupra ni-
grum, ſubtus albidum. Alae anticae fuſco
hyalinae, neruis nigris ſtriatae margine om-
ni apiceque latius ferrugineae faſcia lata, ob-
liqua alba. Poſticae fuſco hyalinae margine
tantum poſtico ferrugineo.

coloraria. 96—7. P. pectinicornis alis cinereis: ſtriga pur-
purea, anticis punctis tribus fuſcis.

Habitat in Virginia Muſ. Dom. Boſc.

Corpus medium, cinereum. Alae omnes ci-
nereae ſtriga communi purpurea. Pone ſtri-
gam in anticis puncta tria ſtrigae adiacentia
duobus ad marginem interiorem approximatis
tis. Subtus omnes ferrugineae puncto me-
dio ſtrigaque poſtica ferrugineis.

5—6. P. pectinicornis alis albis: atomis nu- *mixtaria.*
merosis nigris.
Habitat in Galliae Populo Dom. Boſc.
Mas. Antennae pectinatae, apice ſetaceae.
Caput et thorax griſea. Abdomen album
atomis nigris. Alae anticae albae atomis nu-
meroſis, ſtriga baſeos undata, macula media
transuerſa ad coſtam maculisque marginali-
bus, nigris. Poſticae albae puncto medio
atomisque apicis fuſcis. Subtus concolores.
Faemina obſcurior alis ſtriga poſtica undata
nigra.

—13. P. pectinicornis alis flauis: anticis faſ- *rotaria.*
cia lata purpurea, poſticis immaculatis.
Habitat in Germania.
Statura et magnitudo omnino P. purpurariae.
Antennae fuſcae rachi alba. Alae anticae
flauae faſcia lata, ad marginem craſſiorem
dilatata purpurea. Margo poſticus tenuiſſi-
me purpureus. Poſticae magis teſtaceae, im-
maculatae. Subtus flauae, immaculatae.

—13. P. pectinicornis alis flauis: anticis *grataria.*
puncto medio omnibusque faſciis duabus
purpureis.
Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.
Statura parua P. purpurariae. Antennae val-
de pectinatae. Alae flauae anticae puncto
medio, faſcia pone medium ſtrigaque poſti-
ca purpureis. Margo poſticus purpureus.
Poſticae itidem flauae faſcia ſtrigaque purpu-

reis. Subtus concolores at faſciae magis di-
ſtinctae.

puſillaria. 120—1. P. pectinicornis alis niueis: ſtrigis nu-
merofis fuſcis; poſteriore maiore.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Minuta, tota niuea ſtrigis 5—6. fuſcis, quae ad apicem alae coeunt, poſtica reliquis ma-iore.

togata. 145—6. P. ſeticornis alis angulatis purpuraſcen-tibus: margine poſtico flauo.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Parua: tenera. Alae omnes purpuraſcentes mar-gine poſtico flauo. Poſticae flauae. Subtus pallidiores.

bicolorata. 149—50. P. ſeticornis alis dentatis cinereis: ſtriga undata apiceque fuſcis maculisque coſtalibus nigris.

Habitat in Virginia Muſ. Dom. Boſc.

Statura omnino P. Wauariae. Caput et thorax flaueſcentia antennis ſetaceis. Alae anticae cinereae ſtriga media undata, fuſca. Margo poſticus late fuſcus puncto emarginaturae nigris. Puncta praeterea tria coſtalia. P... gra, poſteriori transuerſo, maiori. P... cae valde dentatae ſtriga ante medium, p... cto medio apiceque faſcia et in hac ſtr... aliquot undatae obſcuriores. Subtus om... flaueſcentes ſtriga antica, puncto medio... gaque poſtica fuſcis.

185—6. P. ſeticornis alis cineraſcentibus: faſcia *variata.* media fuſca puncto centrali ſtrigaque undata utrinque nigris.
Habitat Kiliae.
Statura et magnitudo omnino P. rufatae. Caput et thorax fuſca. Alae anticae cinereae, baſi fuſcae in medio faſcia fuſca, quae ad coſtam dilatata. In medio faſciae punctum diſtinctum nigrum et praeterea faſcia antice poſticeque ſtriga valde undata, nigra terminatur. In apice alae litura fuſca. Poſticae cinereae, immaculatae. Subtus cinereae puncto medio ſtrigisque duabus poſticis fuſcis.

190—1. P. ſeticornis alis cinereis: atomis ſtrigis *numerata.* tribus maculaque media fuſcis.
Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.
Media. Antennae ſetaceae, in faemina nigro punctatae. Alae anticae cinereae atomis numeroſis fuſcis ſtrigisque tribus, baſeos parua, incurua, duabus pone medium macula fuſca iunctis. Macula media in faemina multo maior. Poſticae ſtrigis tantum duabus. Subtus omnes pallidiores atomis, puncto medio ſtrigisque duabus fuſcis.

206—7. P. ſeticornis alis albis: ſtrigis undatis *rupeſtrata.* quinque punctoque centrali fuſcis.
Habitat in Germaniae montoſis.
Statura et magnitudo P. bilineatae. Corpus albidum. Alae albae, anticae ſupra ſtrigis quinque omnibus undatis, fuſcis. Inter ſtri-

gam 3—4 punctum centrale diſtinctum, fuſ-cum. Margo poſticus ſtriga e punctis atris, ſubtus obſcurae ſtriga poſtica e punctis ni-bis. Poſticae albae ſtriga unica fuſca. Sub-tus albae puncto ſtrigisque duabus.

pluuiata. 220—1. P. ſeticornis alis cinereis: ſtrigis duabus atomis faſciaque fuſcis.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Statura et magnitudo P. atomatae. Alae om-nes cinereae atomis numeroſis ſtrigis duabus baſeos faſciaque poſtica repanda nigris. Stri-ga nigra alas terminat. Subtus omnes fla-ueſcentes, nigro irroratae ſtrigaque nigra, apice fuſcae macula magna marginali flaueſ-cente. In anticis praeterea puncta duo al-ba, alterum in medio, alterum verſus api-cem, in poſticis punctum paruum, nigrum in medio.

aerata. 238—9. P. ſeticornis alis viridibus: ſtriga niuea.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Parua, tenera. Antennae ſimplices, albae. Tho-rax viridis. Abdomen album. Alae omnes virides ſtriga parua, niuea.

laetata. 261—2. P. ſeticornis alis niueis: ſtrigis puncto-rum atrorum.

Habitat in Ruſſia meridionali Dom. Boeber.

Media. Corpus niueum. Alae anticae niueae ſtriga antica e punctis tribus, puncto me-dio ſtrigaque poſtica e plurimis atris. Mar-go nigro punctatus. Poſticae niueae puncto me-dio ſtrigaque poſtica atris. Margo nigro

punctatus. Subtus concolores at ſtriga anterior alae anticae omnino deeſt.

9–70. P. ſeticornis alis fuſcis cinereo undatis: faſcia media cinerea; punctis duobus nigris. *geminata.*

Habitat Kiliae.

Statura media. Alae anticae fuſcae baſi faſcia media et in hac puncta duo nigra ſtrigisque undatis apicis cinereis. Poſticae uti omnes ſubtus cinereae.

3–4. P. ſeticornis alis niueis: ſtrigis tribus obliquis apice coeuntibus nigris. *apicata.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Parua, tenera. Alae niueae, anticae ſupra ſtrigis tribus poſticis, nigris, quae in apice alae coeunt, ſubtus obſcuriores. Poſticae albae ſtrigis tribus at minus obliquis.

–9. P. ſeticornis alis cinereis, fuſco ſubfaſciatis: margine punctato. *herbariata.*

Habitat in herbariis folia plantarum exſiccatarum exedens Muſ. Dom. Boſc.

Minuta. Alae cinereae faſciis atomisque numeroſis fuſcis. Margo fuſcopunctatus.

–1. P. ſeticornis alis flaueſcentibus: maculis annularibus ſtrigisque undatis fuſcis. *balteata.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Magnitudo P. urticatae. Corpus cinereum. Alae pallide flaueſcentes ſtriga una alteraue baſeos maculis tribus annularibus in medio ſtrigisque tribus valde undatis poſticis nigris. Subtus albidae lituris fuſcis.

riuulata. 319—20. P. ſeticornis alis albidis annulis duobus mediis ſtrigisque tribus fuſcis.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis.

Statura parua P. lemnatae. Palpi magni, compreſ-ſi. Alae anticae albidae ſtriga ante medium undata, annulis duobus in medio, ſtriga pone medium in medio inflexa ſtrigaque ter-minali fuſcis. Poſticae albidae ſtrigis tribus fuſcis. Subtus omnes cinereae ſtriga fuſca.

exaltata. 324—5. P. ſeticornis alis fuſcis: faſciis tribus hyalinis; ſecunda puncto fuſco.

Habitat in Americae Inſulis Dr. Pflug.

Statura praecedentium. Alae anticae faſciis al-ternis fuſcis hyalinisque. In faſcia ſecunda hyalina punctum diſtinctum fuſcum, in fa-cia tertia fuſca punctum nigrum. Praete-rea macula marginalia hyalina verſus apı-cem. Poſticae albidae ſtrigis poſticis fuſc

amata. 324—5. P. ſeticornis alis flaueſcentibus: anticis puncto faſciaque abbreuiata, poſticis baſi hy-alinis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Alae anti-flaueſcentes coſta magis brunnea. In me-verſus coſtam punctum paruum, luna et pone medium faſcia abbreuiata hyalina. Poſticae baſi hyalınae, apice fuſcae.

vidualis. 420—1. P. alis atris: anticis macula, poſticis fa-cia niuea.

Habitat in Ruſſia meridionali Dom. Boeber.

Statura P. atralis at paullo maior. Frons alba. Abdomen nigrum, albo annulatum ano fuluo. Alae anticae atrae macula magna, media, transuerſa, niuea, poſticae atrae faſcia margineque poſtico niueis. Subtus pallidae, in medio atrae faſcia niuea.

LITHOSIA. *Palpi* duo recurui: articulo primo compreſſo, ſecundo falcato.
Antennae ſetaceae.

1. L. alis depreſſis luteis; anticis punctis duobus cyaneis. *quadra.*
Noctua quadra Entom. ſyſt. 3. 2. 24. 54. Linn. ſyſt. Nat. 2. 840. 14.
Wilk papil. 24. tab. 3. a. 17.
Pod. Muſ. Graec. tab. 2. fig. 8.
Schaeff. Elem. tab. 98. fig. 5.
Roeſ. Inſ. 1. phal. 2. tab. 17.
β. *Noctua diplana* alis incumbentibus cinereis, thorace flauo. Sp. Inſ. 2. 215. 29. Linn. Mant. 1. 539.
Habitat in Pini, Quercus Lichenibus.

Lithoſiae corpus medium, depreſſum, immarginatum, agile, capite paruo, transuerſo, oculis magnis, globoſis, prominulis, lateralibus, diſtantibus, antennis thorace longioribus, diſtantibus, vertici inſertis, thorace plano, breui, hirto, alis quatuor aequalibus, planis, conuolutis, abdomine longioribus, pedibus curſoriis tibiis anticis apice uniſpinoſis, poſticis biſpinoſis.

depreſſa. 2. L. alis depreſſis plumbeis: margine flauo, ca-
pite ſanguineo.
Noctua depreſſa Ent. ſyſt. 3. 2. 24. 52.
Habitat in America boreali.

complana. 3. L. alis depreſſis: margine exteriori pallido, po-
ſticis totis flauis.
Noctua complana Ent. ſyſt. 3. 2. 24. 53. Linn. ſyſt.
Nat. 2. 840. 15. Fn. Su. 1153.
Wien. Verz. 68. 4.
Albin. Inſ. tab. 70. fig. G. H.
Hybn. Beytr. 3. tab. 1. fig. F.
Habitat in Quercus Lichene.
Variat alis anticis totis pallidis.
Puppa folliculata, brunnea.

conuoluta. 4. L. alis conuolutis cinereis, capite, thoracisque
lobo antico flauis.
Tinea gigantella Ent. ſyſt. 3. 2. 288. 3.
Wien. Verz. 135. 37.
Habitat in Galliae Lichenibus Dom. Boſc.

magna. 5. L. alis oblongis niueis immaculatis.
Tinea magnella Ent. ſyſt. 3. 2. 288. 4.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

ſocia. 6. L. alis oblongis cinereis, antice albidis poſtic
pallidis: ſtriga undata nigra.
Tinea ſociella Ent. ſyſt. 3. 2. 288. 6.
Tinea tribunella Wien. Verz. 319. 62.
Clerk. phal. tab. 3. fig. 11.
Habitat in Europa boreali.

gelata. 7. L. alis fuſco cinereis: anticis vitta alba.
Tinea gelatella Ent. ſyſt. 3. 2. 289. 11. Linn.
ſyſt. Nat. 2. 883. 344. Fn. Su. 1450.

Tinea ligatella Wien. Verz. 319. 60.
Clerk. phal. tab. 8. fig. 3.
Habitat in Pomonae arboribus.

L. alis oblongis cinereis poſtice obſcurioribus: *grandis.*
puncto albo ſtrigaque undata cinerea.
Tinea grandella Ent. ſyſt. 3. 2. 288. 7.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Lund.

L. alis conuolutis flauis immaculatis. *flaua.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Media quaſi inter L. conuolutam et luteam.
Magnitudo et longitudo prioris at color po-
ſterioris.

L. alis obſcure cinereis nitidis: marginibus *marginata.*
niueis.
Alucita marginella Ent. ſyſt. 3. 2. 333. 13.
Habitat in Anglia Dom. Yeats.

L. alis ſupra luteis immaculatis: anticis ſub- *lutea.*
tus limbo fuſco.
Tinea lutarella Ent. ſyſt. 3. 2. 292. 23. Linn.
ſyſt. Nat. 2. 886. 355. Fn. Su. 1360.
Wien. Verz. 68. 3.
Clerk. Phal. tab. 4. fig. 9.
Habitat in Europae Pino.

L. alis luteis: anticis punctis nigris trifariis, *irrorata.*
thorace antice poſticeque fuluo.
Tinea irrorella Ent. ſyſt. 3. 2. 291. 18. Linn.
ſyſt. Nat. 2. 885. 354. Fn. Su. 1361.
Wien. Verz. 68. 6.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 23. fig. 10.
Clerk. Phal. tab. 4. fig. 5.

Habitat in Lichene parietino aliisque.

roſcida. 13. L. alis luteis: anticis nigro punctatis poſti-
maculatis, thorace atro.

Tinea roſcidella Ent. ſyſt. 3. 2. 291. 19.

Wien. Verz. 68. 7.

Habitat in Auſtria Dom. Schieffermyller.

perla. 14. L. alis cinereis: puncto medio ſtrigaque pun-
ctorum abbreuiata nigris.

Tinea perlella Ent. ſyſt. 3. 2. 292. 21.

Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.

eborina. 15. L. alis anticis pallidis: margine flauo punctis-
que duobus fuſcis.

Tinea meſomella Ent. ſyſt. 3. 2. 293. 25. Linn.
ſyſt. Nat. 2. 886. 356. Fn. Su. 1362.

Wien. Verz. 68. 5.

Clerk. Phal. tab. 4. fig. 14.

Hybn. Beytr. 3. tab. 3. fig. Q.

Habitat in Europae pratis.

puſtulata. 16. L. alis anticis atris: punctis ferrugineis flauis-
que numeroſis.

Tinea puſtulella Ent. ſyſt. 3. 2. 292. 20.

Tinea punctella Cram. Inſ. tab. 372. fig. L.

Habitat — —

GALLERIA. *Palpi* duo apice incraſſa-
ti, oblique truncati.
Antennae ſetaceae.

cereana. 1. G. alis griſeis poſtice emarginatis: dorſo cana-
liculato fuſco.

Tinea cerella Ent. ſyſt. 3. 2. 287. 2.

Tinea mellonella Ent. ſyſt. 3. 2. 305. 79. Linn. ſyſt. Nat. 2. 888. 375. Fn. Su. 1383.
Phalaena cereana Linn. ſyſt. Nat. 2. 874. 282.
Wien. Verz. 137. 2.
Reaum. Inſ. 3. tab. 19. fig. 7—9.
Swammerd. Bibl. Nat. tab. 26. fig. 2.
Roeſſ. Inſ. 3. tab. 41.
Habitat in Apum aluearibus, angiportus, fauos penetrantes, ſtruens.

G. alis fuſco cinereis immaculatis, capite flauo. ***aluearia.***
Tinea griſella Ent. ſyſt. 3. 2. 289. 10.
Reaum. Inſ. 3. tab. 19. fig. 7. 8. 9.
Habitat in Apum aluearibus mel depaſcens.
Praecedente duplo minor.

PHYCIS. *Palpi* quatuor inaequales.
anteriores breuiores, incurui.
poſteriores elongati: articulo ultimo cylindrico.
Antennae ſetaceae.

P. alis oblongis nigris: dorſo margineque poſtico albidis. ***Boleti.***
Tinea boletella Ent. ſyſt. 3. 2. 287. 1.
Habitat in Auſtriae, Sueciae Fugo intrans et exiens per Boletos.

P. alis oblongis griſeis, antennarum articulis duobus inferioribus incraſſatis. ***ſpiſſicornis.***

Tinea ſpiſſicella Ent. ſyſt. 3. 2. 289. 9.
Habitat Kiliae Dom. Lund.

CRAMBUS. *Palpi* quatuor, *anteriores* breuiores, cr... trorſum craſſiores, ob... lique truncati. *poſteriores* porrecti, com... preſſi, conniuentes. *Antennae* ſetaceae.

glaucinatus. 1. C. alis glaucis: ſtrigis duabus *fuſcis repand...*
Phalaena glaucinalis Ent. ſyſt. 3. 2. 219. 33...
Linn. ſyſt. Nat. 2. 881. 328. Fn. Su. 134...
Clerk. phal. tab. 3. fig. 4.
Wien. Verz. 120. 10.
Habitat in Europa.

barbatus. 2. C. antennis pectinatis, femoribus *anticis bar*ba porrecta.
Phalaena barbalis Ent. ſyſt. 3. 2. 219. 33...
Linn. ſyſt. Nat. 2. 881. 329. Fn. Su. 134...
Clerk. phal. tab. 5. fig. 3.
Wien. Verz. 120. 9.
Habitat in Trifolio pratenſi.

antennatus. 3. C. antennis pectinatis, alis *incumbentibus c*...nereis: ſtriga poſtica albida.
Phalaena antennalis Ent. ſyſt. 3. 2. 219. 339.
Habitat Kiliae.

ventilabris. 4. C. antennis pectinatis, tibiis *anticis apice faſ*ciculato piloſis.
Phalaena ventilabris Ent. ſyſt. 3. 2. 220. 342.

Habitat in Carinthia Dom. Saldoner.

C. antennis pectinatis, alis cinereo rufis: ſtrigis duabus albidis, poſticis luteis: margine nigro. *bombycalis.*

Phalaena bombycalis Ent. ſyſt. 3. 2. 220. 341.
Wien. Verz. 120. 6.
Habitat in Auſtria Dom. Schieffermyller.

C. antennis pectinatis, alis cineraſcentibus: ſtrigis tribus fuſcis. *tentacularis.*

Phalaena tentacularis Ent. ſyſt. 3. 2. 220. 342.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 881. 330. Fn. Su. 1344.
Wien. Verz. 119. 2.
Degeer Inſ. 1. tab. 5. fig. 1.
Habitat in Europae Taraxaco.

C. alis griſeis: ſtrigis ferrugineis. *proboſcideus.*

Phalaena proboſcidalis Ent. ſyſt. 3. 2. 221. 343.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 883. 331. Fn. Su. 1346.
Wien. Verz. 119. 1.
Clerk. Icon. tab. 5. fig. 4.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 23. fig. 6.
Habitat in Europae plantis.

C. alis griſeis: ſtriga media ferruginea poſticaque punctorum alborum. *enſatus.*

Phalaena enſalis Ent. ſyſt. 3. 2. 221. 344.
Habitat Kiliae Dom. Amthor.

C. alis ſubdentatis fuſcis: ſtrigis poſticis undatis albis. *elongatus.*

Phalaena elongalis Ent. ſyſt. 3. 2. 221. 345.
Habitat Tranquebariae Muſ. D. Lund.

C. alis griſeis immaculatis. *lanceolatus.*

Phalaena lancealis Ent. ſyſt. 3. 2. 221. 345.
Habitat in Americae Inſulis Dr. Pflug.

roſtratus. 11. C. alis ſubgriſeis: punctis duobus muri...
lineaque apicis nigris.
Phalaena roſtralis Ent. ſyſt. 3. 2. 222. 347. Lin.
ſyſt. Nat. 2. 881. 332. Fn. Su. 1347.
Wien. Verz. 119. 3.
Roeſ. Inſ. 1. phal. 4. tab. 6.
Habitat in Carpino, Hamulo.

nemorum. 12. C. alis griſeis: ſtrigis tribus fuſcis, interme...
dia flexuoſa.
Phalaena nemoralis Ent. ſyſt. 3. 2. 222. 348.
Wien. Verz. 120. 11.
Harris Inſ. tab. 6. fig. 2.
Habitat in Angliae nemoribus.

craſſalis. 13. C. alis anticis fuſceſcentibus apice cinereis:
punctis ocellaribus nigris.
Phalaena craſſalis Ent. ſyſt. 3. 2. 222. 349.
Habitat in Auſtria Dom. Schieffermyller.

alpeſtris. 14. C. alis nigro coeruleſcentique variis: poſticis
nigris.
Phalaena alpeſtralis Ent. ſyſt. 3. 2. 223. 35...
Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermylle...

palpalis. 15. C. alis griſeis: poſticis margine craſſiori albo...
Phalaena palpalis Ent. ſyſt. 3. 2. 223. 351.
Habitat in Anglia.

porrectus. 16. C. alis fuſceſcentibus: ſtriga media brunnea...
Phalaena porrectalis Ent. ſyſt. 3. 2. 223. 352.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis Muſ.
D. Pflug.

C. alis cinereis fuſco irroratis: ſtriga poſtica brunnea. *ſtrigatus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Medius. Palpi compreſſi, thorace longiores. Alae omnes griſeae ſtriga diſtincta, brunnea pone medium.

C. alis cinereis: puncto medio piloſo fuſco ſtrigaque poſtica obliqua fulua. *dilatatus.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura praecedentis at diſtincta et alia. Minor. Palpi compreſſi, porrecti. Alae anticae cinereae puncto medio eleuato, piloſo et pone hoc ſtriga obliqua, fulua. Poſticae fuſcae.

C. antennis pectinatis alis cinereis: puncto medio ſtrigaque poſtica obſoletis fuſcis. *pectinatus.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura praecedentium. Antennae pectinatae, obſcurae. Alae cinereae puncto medio ſtrigaque poſtica fuſcis. Poſticae albidae.

C. alis glabris pallidis: ſtrigis obliquis ferrugineis. *forficatus.*

Phalaena forficalis Ent. ſyſt. 3. 2. 223. 353.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 882. 334. Fn. Su. 1352.
Wien. Verz. 122. 17.
Geoff. Inſ. 2. 166. 111.
Reaum. Inſ. 1. tab. 16. fig. 13. 14.

Habitat in Europae Braſſica.

C. alis glabris fuſco cinereoquè variegatis: poſticis cinereis margine poſtico fuſcis. *Sophiae.*

Phalaena ſophialis Ent. ſyſt. 3. 2. 223. 354.
Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schiffermy

triſtis. 22. C. alis griſeis: ſtrigis tribus recurvatis ſub
tertia terminali.
Phalaena triſtalis Ent. ſyſt. 3. 2. 224. 355.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

obſoletus. 23. C. alis fuſcis: faſcia poſtica obſoleta palli
poſticis ſubtus pallidis.
Phalaena obſoletalis Ent. ſyſt. 3. 2. 229. 37
Habitat in Italia Dr. Allioni.

cornatus. 24. C. alis cinereis: ſtriga poſtica albida, ant
nis medio incraſſatis.
Phalaena cornicalis Ent. ſyſt. 3. 2. 229. 374.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Lund.

capitatus. 25. C. alis fuſcis: maculis duabus pallidis, ca
bicorni.
Phalaena capitalis Ent. ſyſt. 3. 2. 229. 375.
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.

dorſatus. 26. C. alis cinereis: linea dorſali faſciaque po
fuſcis.
Phalaena dorſalis Ent. ſyſt. 3. 2. 229. 376.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.

pinguis. 27. C. alis cinereis margine craſſiori nigro fa
ciato.
Phalaena pinguinalis Ent. ſyſt. 3. 2. 230.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 882. 336. Fn. Su.
Wien. Verz. 120. 13.
Reaum. Inſ. 3. tab. 20. fig. 5—11.
Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 8. 9.
Habitat in Europae pinguibus, lardo, bu
aliisque.

8. C. alis oliuaceis: faſcia poſtica dentata pallida. *ramalis.*

Phalaena ramalis Ent. ſyſt. 3. 2. 230. 378.
Phalaena dentalis Wien. Verz. 120. 14.
Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.

9. C. alis griſeo fuſcis: maculis duabus coſtalibus albis, corpore niueo. *niueus.*

Phalaena niuealis Ent. ſyſt. 3. 2. 232. 388.
Habitat in Germania Dom. de Hattorff.

0. C. alis ferrugineis: ſtriga flaua, margine craſſiori flauo punctato. *erigatus.*

Phalaena erigalis Ent. ſyſt. 3. 2. 237. 408.
Phalaena punctalis Mant. Inſ. 2. 222. 310.
Phalaena anguſtalis Wien. Verz. 120. 7.
Habitat in Sueciae nemoribus.

1. C. alis ſtriatis cinereis: margine poſtico atro punctato. *Sacchari.*

Phalaena ſaccharalis Ent. ſyſt. 3. 2. 238. 411.
Act. Soc. Hiſt. Nat. Hafn. 3. tab. fig.
Habitat in Americae meridionalis Saccharo, cuius caules perforat, deſtruit, exſiccat. Dom. v. Rohr.

2. C. alis oblongis cinereis: punctis duobus atris ante ſtrigam curuam undulatam obſoletam. *colonum.*

Tinea colonella Ent. ſyſt. 3. 2. 288. 5. Linn. ſyſt. Nat. 2. 883. 346. Fn. Su. 1358.
Clerk. phal. tab. 3. fig. 8.
Wien. Verz. 133. 1.
Habitat in Europa boreali.

3. C. alis anticis griſeis: coſta inaequali ſtrigaque media teſtaceis. *hortorum.*

Tinea hortella Ent. ſyſt. 3. 2. 296. 43.
Habitat in Lapponia Dom. de Paykull.

margaritaceus. 34. C. alis fuſcis: linea unica albiſſima.
Tinea margaritella Ent. ſyſt. 3. 2. 295. 35.
Wien. Verz. 134. 5.
Hybn. Beytr. 2. tab. 4. fig. Z.
Habitat in Auſtria Dom. Schieffermyller.
Oua erecta, ouata, coſtata, albida.

carnea. 35. C. alis anticis flauis: lateribus ſanguineis.
Tinea carnella Ent. ſyſt. 3. 2. 296. 41. Linn. ſyſt. Nat. 2. 887. 353.
Wien. Verz. 138. 13.
Schaeff. Icon. tab. 147. fig. 2. 3.
Habitat in Germaniae Trifolio pratenſi.
Larua villoſa, nigra, cauda bifida.
Puppa folliculata, brunnea.

lineatus. 36 C. alis albidis fuſco lineatis apice ſtrigis duabus fuſcis.
Tinea linetella Ent. ſyſt. 3. 2. 292. 22.
Tinea ?*orella* Linn. ſyſt. Nat. 2. 885. 35?
Habitat in agro Paedemontano Dr. Allioni.

[illegible] 37. C. alis anticis flauis: maculis duabus albiſſimis, anteriore oblonga, poſteriore ouata.
Tinea pinetella Ent. ſyſt. 3. 2. 294. 31. Linn. ſyſt. Nat. 2. 886. 356. Fn. Su. 1368.
Clerk. Phal. tab. 4. fig. 15.
Knoch. Beytr. 1. tab. 4. fig. 7.
Wien. Verz. 134. 7.
Panz. Fn. Germ. 6. tab. 22.
Habitat in Europae Pinetis.

8. C. alis cinereis: linea unica abbreuiata albiſſima. *culmorum.*
Tinea culmella Ent. ſyſt. 3. 2. 295. 34. Linn. ſyſt. Nat. 2. 886. 361. Fn. Su. 1370.
Reaum. Inſ. 1. tab. 17. fig. 13. 14.
Wien. Verz. 134. 9.
Habitat in Europae graminoſis.

9. C. alis anticis cinereis: linea albiſſima poſtice ramoſa apice ſtriis obliquis. *pratorum.*
Tinea pratella Ent. ſyſt. 3. 2. 294. 32 Linn. ſyſt. Nat. 2. 886. 360. Fn. Su. 1369.
Clerk. phal. tab. 3. fig. 14.
Wien. Verz. 135. 29.
Habitat in pratis graminoſis.

10. C. alis cinereis: linea albiſſima, margine poſtico nigro punctato. *paſcuum.*
Tinea paſcuella Ent. ſyſt. 3. 2. 295. 33. Linn. ſyſt. Nat. 2. 886. 359. Fn. Su. 1367.
Wien. Verz. 134. 4.
Hybn. Beytr. 2. tab. 4. fig. U.
Habitat in Europae paſcuis.

11. C. alis ſtriatis argenteis fuſco nitidulis. *argyreus.*
Tinea argyrella Ent. ſyſt. 3. 2. 294. 30.
Wien. Verz. 135. 28.
Habitat in Auſtria Dom. Schieffermyller.

12. C. argenteus antennis fuſco annulatis. *argenteus.*
Tinea argentella Ent. ſyſt. 3. 2. 296. 38. Linn. ſyſt. Nat. 2. 895. 421. Fn. Su. 1432.
Phalaena perlella Wien. Verz. 134. 11.
Habitat in Rubo, Vrtica.

arbuſtorum. 43. C. argenteus alis anticis flaueſcentibus nitidis
ano barbato albo.
Tinea arbuſtella Ent. ſyſt. 3. 2. 293. 24.
Habitat Kiliae.

niueus. 44. C. argenteus nitidus immaculatus, antennis
concoloribus.
Tinea niuella Ent. ſyſt. 3. 2. 296. 39.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Lund.

conchaceus. 45. C. alis anticis fuſcis: linea unica interrupta
albiſſima.
Tinea conchella Ent. ſyſt. 3. 2. 295. 36.
Wien. Verz. 134. 6.
Habitat in Auſtria Muſ. D. Schieffermyller.

cryptorum. 46. C. alis griſeis: linea dimidiata albiſſima ſtri-
gaque poſtica undata argentea.
Tinea cryptella Ent. ſyſt. 3. 2. 300. 58.
Habitat in India orientali Dr. Koenig.

ſtrigatus. 47. C. alis anticis cinereo flaueſcentibus: ſtriga
marginali argentea.
Tinea ſtrigella Ent. ſyſt. 3. 2. 297. 44.
Tinea chryſonuchella Wien. Verz. 124. 8.
Habitat in Germania.

marginatus. 48. C. alis anticis griſeis: margine craſſiori albo.
Tinea marginella Ent. ſyſt. 3. 2. 297. 46.
Wien. Verz. 319. 65.
Habitat in Germania Dom. de Hattorff.

vinetorum. 49. C. alis anticis fuſcis, lineolis tribus argenteis:
intermedia longiore interrupta.
Tinea vinetella Ent. ſyſt. 3. 2. 294. 29.
Habitat Dresdae Muſ. Dom. Romani.

C. alis lanceolatis cinereis: vitta fuſca. *mucronatus.*
Tinea mucronella Ent. ſyſt. 3. 2. 298. 47.
Wien. Verz. 136. 45.
Habitat in Auſtria Dom. Schieffermyller.

C. alis cinereis fuſco ſtriatis. *crinitus.*
Tinea barbella Ent. ſyſt. 3. 2. 297. 45.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

C. alis cinereis: vitta fuſca, antennis piloſis. *bicoſtatus.*
Tinea bicoſtella Ent. ſyſt. 3. 2. 306. 86. Linn. ſyſt. Nat. 2. 890. 387. Fn. Su. 1438.
Tinea pyropella Wien. Verz. 137. 53.
Clerk. phal. tab. 3. fig. 15.
Habitat in Europae hortis.

C. alis fuſcis immaculatis. *moerens.*
Tinea triſtella Ent. ſyſt. 3. 2. 296. 40.
Wien. Verz. 134. 17.
Habitat in Auſtria.

C. niger alis fuſcis, abdomine rufo. *niger.*
Tinea nigrella Ent. ſyſt. 3. 2. 298. 49.
Habitat in Daniae nemoribus.

C. ater aeneo nitidus alis poſticis apice anoque teſtaceis. *ater.*
Tinea atrella Ent. ſyſt. 3. 2. 298. 52.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

C. alis anticis griſeis: ſtrigis atomisque fuſcis. *Fagi.*
Tinea fagella Ent. ſyſt. 3. 2. 300. 57.
Wien. Verz. 134. 34.
Habitat in Auſtriae Fago.

C. alis griſeo fuſcis nitidulis immaculatis. *tetrix.*
Tinea tetricella Ent. ſyſt. 3. 2. 303. 69.

Wien. Verz. 138. 22.
Habitat in Auſtria Dom. Schieffermyller.

Mercurii. 58. C. alis albis fuſco variegatis.
Tinea mercuriella Linn. ſyſt. Nat. 2. 868.
Habitat in Europae hortis.
Media. Antennae nigrae. Caput et tho-
niuea. Alae niueae atomis maculisque
minatis fuſcis. Margo poſticus fuſcus
ga alba.

Oxyacanthae. 59. C. alis fuſco nebuloſis: ſtriga poſtica al-
Tinea oxyacanthella Ent. ſyſt. 3. 2. 29
Linn. ſyſt. Nat. 2. 886. 357.
Habitat in Sueciae Oxyacantha.
Striga niuea pone medium alae.

lugubris. 60. C. alis fuſco cinereis: ſtrigis poſticis angula-
tis obſoletis brunneis.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Statura omnino C. moerens at duplo fere mi-
nor. Alae obſcure cinereae ſtrigis duabus
aut tribus angulatis brunneis.

hirtus. 61. C. hirtus alis cinereis atomis punctisque
fuſcis.
Habitat Kiliae.
Corpus magnum, hirtum. Alae anticae ci-
nereae atomis numeroſis, fuſcis, In me-
puncta tria nigra et margo poſticus fuſ-
punctatus. Poſticae cinereae, immaculatae.

ſinuatus. 62. C. alis flauicantibus: ſtrigis duabus undu-
fuſcis.

Tinea ſinuella Ent. ſyſt. 3. 2. 308. 94.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

PYRALIS. *Palpi* nudiuſculi, baſi cylindrici, medio dilatato ouati, apice ſubulati.
Antennae filiformes.

15. P. fuſca alarum margine tenuiori poſticoque niueis. *caprana.*
Habitat in Heluetiae Salice capraea Muſ. D. de Clairville.
Magna. Caput et thorax fuſca, immaculata. Alae deflexae, fuſcae margine tenuiori communi inaequali poſticoque niueis.
Larua 16poda alba, capite rufo albo ſtriato.
Puppa nuda, brunnea.

16. P. alis flauis: punctis duobus ferruginеis. *flauana.*
Habitat in Centaurea Scabioſa Muſ. Dom. de Clairville.
Media. Caput et thorax flaua, immaculata. Alae incumbentes, flauae punctis duobus ferrugineis: uno poſt alterum.
Larua 16poda, atra.
Puppa nuda, brunnea.

18. P. alis cinereis: ſtrigis numeroſis undatis fuſcis. *orbana.*
Habitat in Germania.
Magna. Caput et thorax griſea. Alae cinereae ſtrigis numeroſis undatis punctoque medio

diſtincto fuſcis. Margo atro punctatus. P
ſticae ſupra fuſcae, ſubtus cinereae.

albana. 31—2. P. alis niueis: margine poſtico nigro
Tinea lactella Ent. ſyſt. 3,2. 313.116.
Habitat in Americae Inſulis.
Parua. Corpus niueum. Alae anticae ni
margine poſtico nigro, poſticae imm
latae.

tuberculana. 39—40. P. alis griſeis fuſco punctatis: marg
craſſiori antice trituberculato.
Pyralis tuberculana Boſc. Act. Soc. Linn. 1. 1
tab. 17. fig. 4. 5.
Habitat in Galliae Hedyſaro Onobrychis. M
Dom. Boſc.
Vix huius generis. Alae mox griſeae, mox
bae puncto nigris punctisque tribus cu
bus, eleuatis.
Larua fuſco viridis, intra folliculum e paren
ma plantae fabricatum et cauli affixum.

obſcurana. 44—5. P. alis anticis obſcuris: coſta albo p
ctata anguloque ani punctis nigris.
Habitat in Gallia Dom. Boſc.
Media. Alae anticae obſcure brunneae,
te medium macula dorſalis communis, ſ
Margo exterior albo punctatus. An
ani macula punctisque tribus approxim
nigris. Poſticae fuſcae.

Branderiana. 63—4. P. alis fuſcis ferrugineo variis margi
que poſtico ferrugineo.
Phalaena Branderiana Linn. ſyſt. Nat. 2. 8
320.

Habitat in Europa boreali.
Affinis P. fuſcanae at omnino diſtincta. Alae fuſcae ferrugineo variae margine poſtico ferrugineo macula magna fuſca. Poſticae fuſcae margine poſtico fuluo.

3. P. alis vireſcentibus albo variis: macula poſtica quadrata ſubargentea; punctis minutiſſimis atris. *marmorana.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura et magnitudo P. arcuanae. Alae anticae vireſcentes, albo maculatae. Verſus angulum ani macula quadrata, obſoleta, argentata et in hac puncta aliquot minutiſſima, atra. Poſticae cinereae ſtriga ſubmarginali, fuſca. Subtus anticae fuſcae, poſticae cinereae.

5. P. alis anticis flauiſſimis: maculis brunneis ſparſis. *Rohrana.*

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.
Statura et magnitudo omnino P. Chriſtiernanae. Caput flauum antennis cinereis. Corpus cinereum. Alae anticae flauiſſimae maculis plurimis ſparſis, brunneis praeſertim ad marginem craſſiorem et poſticum. Poſticae cinereae.
von Rohr Americae meridionalis indefeſſus ſcrutator periit in itinere Guineenſi.

78. P. alis nigris nitidulis: maculis duabus fuluis. *fuluana.*

Tinea *fuluella* Ent. ſyſt. 3. 2. 317. 134.

Habitat in Germaniae Dom. de Paykull.

repandana. 87 — 8. P. alis brunneis: faſciis tribus albis, me-
dia repanda.

Habitat in Europa.

Magna. Corpus ferrugineum. Alae anti-
brunneae faſciis tribus albis, anteriore di-
ſtincta, media repanda, tertia obſoletiore.
Poſticae cinereae.

Cuviana. 94 — 5. P. alis anticis fuſco viridique variis: pun-
ctis tribus marginalibus niueis.

Habitat Kiliae.

Nimis affinis videtur P. triangulanae. Alae an-
ticae fuſco viridique variae punctis tribus co-
ſtalibus albis: anteriore minore. Versus
marginem ſtriga alba obſoleta.

Cuvier Profeſſor Pariſienſis amiciſſimus Anato-
miae comparatae et Inſectorum ſcrutator
eximius.

approximana. 116 — 17. P. alis flaueſcenti nitidulis: punctis tri-
bus approximatis coſtalibus nigris.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura, magnitudo et ſumma affinitas P. Bo-
canae. Caput et thorax fuſcana. Alae pal-
lide flaueſcentes, nitidulae punctis tribus ap-
proximatis, nigris. Poſticae cinereae.

lunana. 122 — 3. P. niuea alis variegatis: lunula exterio-
re niuea.

Habitat in Heluetia Dom. de Clairville.

Statura et magnitudo ſequentium. Caput et
thorax niuea, immaculata. Alae variega-

tae lunula ad marginem craſſiorem niuea. In apice litura albida puncto nigro.

3. P. alis ſubcaudatis fuſcis: margine tenuiore punctoque medio niueis. *ephippana.*

Habitat in Heluetia Dom. de Clairville.

Magna in hac familia. Caput et thorax niuea, immaculata antennis cinereis. Alae incumbentes, fuſcae margine interiori a thorace exeunte punctoque magno eleuato in medio albis.

3. P. niuea alis ſubcaudatis fuſcis immaculatis. *liberana.*

Habitat in Heluetia Dom. de Clairville.

Magnitudo et ſtatura praecedentis. Caput et thorax niuea, immaculata. Alae in angulum excurrentes, fuſcae, immaculatae.

2. P. alis flauis fuſco ſtrigoſis arcuque magno coſtali fuſco. *reticulana.*

Habitat in Europae hortis.

Magna. Corpus cinereum. Alae anticae flauae ſtrigis numeroſis, fuſcis et in medio coſtae macula magna fuſca in cuius medio macula coſtalis flaua. Poſticae cinereae.

50. P. alis fuſcis: faſciis duabus baſeos maculisque variis apicis albis. *Latreillana.*

Habitat Kiliae.

Parua. Caput album. Thorax albus margine antico fuſco vireſcente. Alae fuſcae faſciis duabus baſeos: poſteriore parum interrupta et pone medium maculae variae albae.

Latreille Gallus Inſectorum ſcrutator ocula-
ſimus.

compoſana. 164—5. P. alis fuſcis: macula dorſali com-
argentea e ſtrigis quatuor compoſita.
Tinea compoſitella Ent. ſyſt. 3. 2. 316. 129.
Habitat in Angliae nemoribus.

tapezana. 167—8. P. alis nigris poſtice albis, capite niu-
Tinea tapezella Ent. ſyſt. 3. 2. 303. 70. Lin.
ſyſt. Nat. 2. 888. 371. Fn. Su. 1414.
Geoff. Inſ. 2. 187. 13. 14.
Wien. Verz. 142. 13.
Reaum. Inſ. 3. tab. 20. fig. 12.
Habitat in pellibus intra cylindros meatus m-
dens.

pulchana. 167—8. P. alis baſi fuſcis apice aurulentis fuſco
ſtrigoſis: puncto medio apicisque nigris, ca-
pite niueo.
Tinea pulchella Ent. ſyſt. 3. 2. 303. 71.
Habitat in Daniae domibus Muſ. Dom. Lund.

ſepulcrana. 175—6. P. niuea alis planis atris immaculatis.
Tinea ſepulchrella Ent. ſyſt. 3. 2. 316. 131.
Habitat in America Dr. Pflug.

TINEA. *Palpi* quatuor:
antici obſoleti.
poſtici corniformes, reflexi.
Lingua breuis, membranacea.
Antennae ſetaceae.

guttella. 1. T. alis atris: anticis punctis atris numeroſis
capite ferrugineo.

Tinea guttella Ent. ſyſt. 3. 2. 293. 26.
Tinea anthracinella Wien. Verz. 319. 60.
Hybn. Beytr. 1. tab. 3. fig. Q.
Habitat in Europae Sedo acri.

T. alis pallidis: vitta lata viridi. *vittella.*
Tinea vittella Ent. ſyſt. 3. 2. 293. 27.
Habitat in India orientali Muſ. D. Lund.

T. alis fuſcis: vitta communi dentata alba, thorace niueo: punctis duobus atris. *2punctella.*
Alucita 2punctella Ent. ſyſt. 3. 2. 334. 14.
Tinea Echiella Wien. Verz. 140. 54.
Hybn. Beytr. 4. tab. 1. fig. B.
Habitat in Germaniae Echio.

T. alis coeruleſcenti cinereis: puncto vitta media maculisque rhombeis contiguis atris. *puſiella.*
Ent. ſyſt. 3. 2. 301. 64. Linn. ſyſt. Nat. 2. 884. 347.
Tinea ſequella Ent. ſyſt. 3. 2. 290. 15. Linn. ſyſt. Nat. 2. 885. 352. Fn. Su. 1365.
Clerk. phal. tab. 10. fig. 14.
Panz. Fn. Germ. 6. tab. 21.
Act. Berol. 3. tab. 1. fig. 6.
Hybn. Beytr. tab. 1. fig. D.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 23. fig. 9.
Wien. Verz. 140. 55.
Habitat in Lithoſpermo.

T. alis anticis niueis: punctis 50 nigris. *euonymella.*
Tinea euonymella Ent. ſyſt. 3. 2. 289. 12. Linn. ſyſt. Nat. 2. 885. 350. Fn. Su. 1363.
Geoff. Inſ. 2. 183. 4.

Friſh. Inſ. 3. tab. 16.
Merian. Eur. 2. tab. 2.
Albin. Inſ. tab. 60. fig. A. C.
Reaum. Inſ. 2. tab. 13. fig. 12. 13.
Wien. Verz. 183. 18.
Roeſſ. Inſ. 1. phal. 4. tab. 8.
Wilks pap. 4. tab. 1. a. c.
Sulz. Inſ. tab. 16. fig. 99.
Habitat in Euonymo, Sorbo.

padella. 6. T. alis anticis plumbeis: punctis 20 nigri
Tinea padella Ent. ſyſt. 3. 2. 290. 13. Li
ſyſt. Nat. 2. 885. 351. Fn. Su. 1364.
Friſh. Inſ. 5. tab. 6. fig. 1.
Reaum. Inſ. 2. tab. 12. fig. 5—9.
Roeſſ. Inſ. phal. 4. tab. 7.
Harr. Inſ. 7. tab. 3. fig. k. m.
Schaeff. Icon. tab. 145. fig. 2. 3.
Wien. Verz. 139. 19.
Habitat in Pomonae arboribus.

plumbella. 7. T. alis anticis plumbeis: macula media p
ctis numeroſis apiceque fuſcis.
Tinea plumbella Ent. ſyſt. 3. 2. 290. 14.
Wien. Verz. 139. 34.
Habitat in Auſtria Dom. Schieffermyller.

viduella. 8. T. alis anticis atris: faſciis tribus niueis,
media interrupta, capite thoraceque
Tinea viduella Ent. ſyſt. 3. 2. 299. 53.
Habitat in Lapponia Lulenſi Dom. de Pay

lugubrella. 9. T. alis anticis nigris: faſciis duabus albis
teriore abbreuiata, capite albo.

Tinea lugubrella Ent. ſyſt. 3. 2. 299. 54.
Habitat in Lapponia Dom. de Paykull.

T. alis nigris: margine tenuiori baſi albo; punctis duobus nigris. *funerella.*
Tinea funerella Ent. ſyſt. 3. 2. 309. 98.
Habitat in Auſtria Dom. Schieffermyller.

T. niuea alis deflexis nigris: vitta communi dorſali poſtice ad marginem exteriorem dilatata niuea. *circulella.*
Tinea circulella Ent. ſyſt. 3. 2. 301. 61.
Habitat Kiliae.

T. alis fuſco cinereis: lineola media faſciaque poſtica undatis albis. *undella.*
Tinea undella Ent. ſyſt. 3. 2. 309. 96.
Habitat Kiliae.

T. alis niueis: latere dorſali fuſco. *dorſella.*
Tinea dorſella Ent. ſyſt. 3. 2. 301. 63.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

T. alis coeruleſcentibus: latere dorſali albo thorace criſtato. *ſalicella.*
Tinea ſalicella Ent. ſyſt. 3. 2. 301. 62. Linn. ſyſt. Nat. 2. 887. 367. Fn. Su. 1378.
Wien. Verz. 131. 37.
Roeſſ. Inſ. 1. phal. 4. tab. 9.
Wilks pap. 5. tab. 1. a. 10.
Habitat in Europae Salice.

T. alis fuſco aureis: vitta abbreuiata maculaque flauis. *flauella.*
Alucita flauella Ent. ſyſt. 3. 2. 332. 9.
Tinea maiorella Wien. Verz. 140. 1.

Habitat in ligno antiquo Quercus.

uifrontella. 16. T. alis anticis cinereis immaculatis c... fuluo.

Tinea flauifrontella Ent. ſyſt. 3. 2. 305. 7...

Wien. Verz. 143. 22.

Habitat in Inſectis pennisque Auſtriae, G...

Muſ. Dom. Boſc.

populella. 17. T. alis griſeis: punctis tribus nigris marg... que nigro punctato.

Tinea populella Linn. ſyſt. Nat. 2. 885. 35...

Habitat in Europae Populo.

Statura et magnitudo omnino T. undell... diſtincta videtur. Antennae albo nigro... annulatae. Corpus griſeum. Alae g... ſiue obſcure cinereae, fuſco irroratae pu... ctis in medio tribus nigris, diſtinctis. M... go nigro punctatus.

applanella. 18. T. alis depreſſis fuſcis: punctis tribus c... libus albis.

Pyralis applana Ent. ſyſt. 3. 2. 285. 174.

Clerk. phal. tab. 2. fig. 15.

Habitat Kiliae Dom. de Sehèſtedt.

umbellella. 19. T. alis planis ſtriatis griſeis: maculis ap... ximatis emarginatis diſci nigris.

Pyralis umbellana Ent. ſyſt. 3. 2. 286. 17...

Habitat in umbellatis variis flores contor...

Muſ. Dom. Boſc.

Heraclella. 20. T. alis depreſſis griſeis: anticis lineolis ... approximatis nigris.

Pyralis heracleana Ent. ſyſt. 3. 2. 286. 17...

Phalaena heracleana Linn. ſyſt. Nat. 2. 880. 326. Fn. Su. 1334.
Schaeff. Inſ. 1758. tab. 2. fig. 3. 4. Monogr.
Reaum. Inſ. 2. tab. 6. fig. 1—4.
Degeer Inſ. 1. tab. 29. fig. 6. 7.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 3. 4.
Habitat in umbellis plantarum umbelliferarum inprimis Heraclei contortis deſtructisque floribus caules ex alis foliorum penetrans.

T. alis depreſſis fuſcis: lineolis transuerſis numeroſis albis, thorace denticulis duobus dorſalibus. *Rutella.*
Habitat in Galliae Ruta, cuius folia contorquet Muſ. D. Boſc.

T. alis depreſſis fuſcis, capite thoraceque niueis. *depreſſella.*
Pyralis depreſſana Ent. ſyſt. 3. 2. 287. 180.
Habitat in Succiae nemoribus.

T. alis fuſcis: maculis tribus flaueſcentibus, capite ferrugineo. *capitella.*
Tinea capitella Ent. ſyſt. 3. 2. 315. 125. Linn. ſyſt. Nat. 2. 894. 418. Fn. Su. 1374.
Habitat in Anglia.

T. alis nigro argenteoque nebuloſis, capite albo. *gemmella.*
Tinea gemmella Ent. ſyſt. 3. 2. 315. 124. Linn. ſyſt. Nat. 2. 894. 414. Fn. Su. 1388.
Clerk. phal. tab. 10. fig. 10.
Habitat intra folia Quercus ſubcutanea.

T. alis fuſco aureis: maculis quatuor marginalibus albis, capite rufo. *rupella.*

Tinea rupella Ent. ſyſt. 3. 2. 315. 126.
Wien. Verz. 320. 45.
Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.

praelatella. 26. T. alis violaceis: ſtriga punctisque duabus oppoſitis albis.
Tinea praelatella Ent. ſyſt. 3. 2. 315. 127.
Wien. Verz. 320. 46.
Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.

ſulphurella. 27. T. fuſca capite thorace alarum baſi maculisque coſtali ſulphureis.
Tinea ſulphurella Ent. ſyſt. 3. 2. 315. 128.
Habitat Hamburgi Muſ. Dr. Schulz.

bracteella. 28. T. alis nigris baſi maculaque marginali ſulphureis.
Tinea bracteella Ent. ſyſt. 3. 2. 313. 115. Linn. ſyſt. Nat. 2. 894. 415. Fn. Su. 1426.
Wien. Verz. 138. 24.
Clerk. phal. tab. 12. fig. 4.
Habitat in Carpini Betulae ligno.

oppoſitella. 29. T. alis fuſcis: maculis duabus oppoſitis ... uis, poſticis fuſcis.
Alucita oppoſitella Ent. ſyſt. 3. 2. 344. 55.
Habitat in Anglia.

6punctella. 30. T. alis cinereis fuſco faſciatis punctisque ... bus atris.
Tinea 6punctella Ent. ſyſt. 3. 2. 313. 115.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

betulinella. 31. T. alis albidis apice fuſco variis.
Alucita betulinella Ent. ſyſt. 3. 2. 334. 16.

Habitat in Boleto Betulino Sueciae Dom. de Paykull.

T. alis nigricantibus: faſciis duabus; poſteriore obſoletiore, capite albo. *leucatella.*
Tinea leucatella Ent. ſyſt. 3. 2. 309. 99. Linn. ſyſt. Nat. 2. 891. 391. Fn. Su. 1444.
Wien. Verz. 139. 42.
Hybn. Beytr. 3. tab. 1. fig. B.
Habitat in Europae nemoribus.

T. alis fuſco nitidulis: faſciis duabus albis; poſteriore interrupta, capite ruſo. *bifaſciella.*
Tinea bifaſciella Ent. ſyſt. 3. 2. 309. 100.
Habitat Hafniae Dom. de Seheſtedt.

T. alis atris nitidulis immaculatis, antennis flauis. *antennella.*
Tinea antennella Ent. ſyſt. 3. 2. 312. 110.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

T. alis vireſcentibus albo punctatis faſciisque duabus interruptis brunneis. *viridella.*
Tinea viridella Ent. ſyſt. 3. 2. 312. 109.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Francillon.

T. alis atris nitidulis: punctis quatuor niueis. *8punctella.*
Tinea 8punctella Ent. ſyſt. 3. 2. 311. 107.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

T. alis nigris: anticis ſtriga argentea. *cinctella.*
Tinea cinctella Ent. ſyſt. 3. 2. 309. 97. Linn. ſyſt. Nat. 2. 891. 390. Fn. Sv. 1380.
Tinea ligatella Wien. Verz. 319. 70.
Habitat in Europae hortis.

T. alis ciliatis exalbidis: limbo maculisque fuſcis. *limbella.*

Tinea limbella Ent. ſyſt. 3. 2. 304. 77.
Habitat in Germaniae nemoribus.

ſtrobilella. 39. T. alis fuſco argenteoque undatis: pol-
fuſcis, margine albo.
Tinea ſtrobilella Ent. ſyſt. 3. 2. 310. 101. Lin
ſyſt. Nat. 2. 892. 402. Fn. Su. 1419.
Clerk. phal. tab. 12. fig. 10.
Wien. Verz. 135. 24.
Habitat in Abietis ſtrobilis.

nitidella. 40. T. alis anticis argenteis: lineola baſeos arg-
que communi dorſali fuſcis.
Tinea nitidella Ent. ſyſt. 3. 2. 291. 16.
Wien. Verz. 137. 58.
Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schiffermyller.

cornella. 41. T. alis niueis: faſcia punctisque numeroſis
fuſco aureis.
Tinea cornella Ent. ſyſt. 3. 2. 291. 17.
Tinea ſparſella Wien. Verz. 141. 66.
Habitat in Germaniae Corno.

variella. 42. T. alis anticis nigris: linea baſeos punctis dor-
bus faſciiſque duabus abbreuiatis niueis.
Tinea variella Ent. ſyſt. 3. 2. 299. 55.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

marmorella. 43. T. alis anticis nigris flauo maculatis.
Alucita variella Ent. ſyſt. 3. 2. 336. 20.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

teſſerella. 44. T. alis fuſco alboque teſſellatis, capite p-
de teſtaceo.
Tinea teſſerella Ent. ſyſt. 3. 2. 298. 48.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

T. alis obſcure fuſcis nitidulis immaculatis. *obſcurella.*
Tinea obſcurella Ent. ſyſt. 3. 2. 312. 112.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Antennae albo nigroque annulatae.

T. alis fuſcis: maculis duabus dorſalibus al- *muſcalella.*
bis, capite fuluo, antennis pectinatis.
Tinea muſcalella Ent. ſyſt. 3. 2. 314. 122.
Wien. Verz. 143. 28.
Habitat in Auſtria Dom. Schieffermyller.

T. alis baſi cinereis apice fuſcis. *inſectella.*
Tinea inſectella Ent. ſyſt. 3. 2. 303. 72.
Habitat in Inſectis ex Africa miſſis Dom. Boſc.

T. alis cineraſcentibus: arcu punctoque dor- *pectinella.*
ſalibus albidioribus.
Tinea pectinella Ent. ſyſt. 3. 2. 310. 103.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

T. griſea nigro punctata alis pallide faſciatis: *dodecella.*
punctis trium parium fuſcis.
Tinea dodecella Ent. ſyſt. 3. 2. 311. 108. Linn.
ſyſt. Nat. 2. 902. Fn. Su. 1421.
Degeer Inſ. 1. tab. 22. fig. 22. 23.
Habitat intra Pini Turiones.

T. alis nigris apice atris: ſtriga obliqua alba. *ſtrigella.*
Tinea ſtrigella Ent. ſyſt. 3. 2. 308. 93.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

T. alis fuſco cinereis: punctis duobus dorſa- *fuſcella.*
libus nigris.
Tinea fuſcella Ent. ſyſt. 3. 2. 312. 113. Linn.
ſyſt. Nat. 2. 893. 409. Fn. Su. 1349.
Habitat in Europae hortis.

punctella. 52. T. alis anticis linearibus cineraſcentibus: ...
ctis quatuor fuſcis.
Tinea punctella Ent. ſyſt. 3. 2. 308. 95. ...
ſyſt. Nat. 2. 899. 386. Fn. Su. 1337.
Tinea alucitella Wien. Verz. 144. 40.
Habitat in Pomariis.

pellionella. 53. T. alis canis: puncto medio nigro, capite griſeo.
Tinea pellionella Ent. ſyſt. 3. 2. 304. 73. ...
ſyſt. Nat. 2. 887. 372. Fn. Su. 1415.
Geoff. Inſ. 2. 184. 6.
Roeſſ. Inſ. 1. phal. 4. tab. 17.
Reaum. Inſ. 3. tab. 6. fig. 12—16.
Habitat in veſtimentis piloſis.

veſtianella. 54. T. alis cinereis: coſta alba, apicibus ad...
dentibus plumoſis.
Tinea veſtianella Ent. ſyſt. 3. 2. 304. 74. ...
ſyſt. Nat. 2. 888. 370. Fn. Su. 1417.
Wien. Verz. 139. 40.
Habitat in veſtimentis, quae miſere deſtru...

ſarcitella. 55. T. alis cinereis thorace utrinque puncto al...
Tinea ſarcitella Ent. ſyſt. 3. 2. 304. 75. ...
ſyſt. Nat. 2. 888. 373. Fn. Su. 1416.
Roeſſ. Inſ. 1. phal. 4. tab. 17.
Reaum. Inſ. 3. tab. 6. fig. 9. 10.
Wien. Verz. 139. 41.
Habitat in veſtimentis, pellibus intra folli...
lum occulta.

ſtigmatella. 56. T. alis ſublinearibus ferrugineis: macula co...
ſtali alba.

Tinea ſtigmatella Ent. ſyſt. 3. 2. 304. 76.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Yeats.

T. alis argenteis: arcu dorſali fuſco. *cucullatella.*
Tinea cucullatella Ent. ſyſt. 3. 2. 305. 80. Linn. ſyſt. Nat. 2. 889. 376. Fn. Su. 1384.
Geoff. Inſ. 1. phal. 4. tab. 11.
Habitat in Sorbo intra folliculum conicum, piloſum.

T. alis niueis: arcu communi maculisque duabus marginalibus fuſcis. *arcella.*
Tinea arcella Ent. ſyſt. 3. 2. 305. 81.
Habitat in Germania Dr. Schulz.

T. alis atro aureis: macula baſeos faſciaque media flauis. *Oliviella.*
Tinea Oliviella Ent. ſyſt. 3. 2. 316. 132.
Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

T. alis ſubgriſeis: litura dorſali flaua apiceque punctis tribus nigris. *Petiuerella.*
Tinea Petiverella Ent. ſyſt. 3. 2. 317. 133.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 895. 423. Fn. Su. 1381.
Clerk. phal. tab. 12. fig. 11.
Wien. Verz. 136. 31.
Habitat in Europae hortis.

T. antennis albo annulatis, alis griſeo fuſcis: puncto apicis nigro. *Liſterella.*
Tinea Liſterella Ent. ſyſt. 3. 2. 317. 135. Linn. ſyſt. Nat. 2. 896. 432. Fn. Su. 1395.
Wien. Verz. 139. 30.
Habitat in Europae hortis.

T. alis flaueſcentibus argento ſtriatis: maculis duabus ſulphureis marginalibus. *Geoffroyella.*

Tinea Geoffroyella Ent. ſyſt. 3. 2. 318.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 896. 430.
Habitat in Europa auſtraliori.

cornutella. 63. T. alis anticis nigro aureis baſi flauo lin
maculisque duabus flauis oppoſitis.
Habitat in Gallia.
Antennae mediocres atrae, annulo anteap
albo. Palpi flaueſcentes. Alae antic
gro aureae lineis duabus aut tribus flau
baſi ad medium ductis. Pone medium ma
culae duae flauae oppoſitae.

Knochella, 64. T. alis fuſco aureis: linea abbreuiata pun
que apicis niueis.
Tinea Knochella Ent. ſyſt. 3. 2. 318. 137.
Habitat in Thymo Serpyllo Germaniae Dom.
Hybner.

Fabricella. 65. T. alis aureis: maculis punctisque niueis, p
ſticis fuluis.
Tinea Fabricella Ent. ſyſt. 3. 2. 319. 140.
Tinea Fabricella Swed. Act. Holm. 17
277. 28.
Habitat in India orientali Dom. Lee.

Deniſella. 66. T. alis fuſceſcentibus: lineola faſciaque alb
Tinea Deniſella Ent. ſyſt. 3. 2. 319. 141.
Wien. Verz. 138. 23.
Habitat in Auſtria. Muſ. Dom. Schiefferm

Schaefferella. 67. T. alis nigris: diſco flauo, ſtrigis lineis d
bus punctisque tribus argenteis.
Tinea Schaefferella Ent. ſyſt. 3. 2. 322. 15
Linn. ſyſt. Nat. 2. 898. 443. Fn. Su. 140

Wien. Verz. 138. 21.
Habitat in Fagi foliis ſubcutanea.

8. T. alis nigris: diſco aureo maculaque marginali poſtica alba. *Schwarzella.*
Habitat in Germania.
Statura omnino praecedentis. Alae anticae aureae limbo tenuiori nigro. In diſco lineae duae ſubmarginales a punctis argenteis. Punctum ultimum argenteum lineae exterioris terminatur macula marginali alba.
Dom. Schwarz Norimbergenſis Roeſellii continuator feliciſſimus.

9. T. atra capite ano alarumque punctis quatuor niueis. *quadrella.*
Tinea quadrella Ent. ſyſt. 3. 2. 298. 51.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

10. T. alis flauis: margine exteriori et interiori niueis. *Colutella.*
Alucita Colutella Ent. ſyſt. 3. 2. 337. 24.
Reaum. Inſ. 3. tab. 11. fig. 1—4.
Habitat in Colutea arboreſcente folliculum incuruum e cortice arboris ſtruens Dom. Boſc.

11. T. alis auratis: macula apicis purpurea. *Thunbergella.*
Tinea Thunbergella Ent. ſyſt. 3. 2. 326. 170.
Habitat in Gallia Dom. Boſc.
Thunberg Profeſſor Upſalienſis, Capitis Bonae ſpei et Iaponiae inveſtigator, olim comes amiciſſimus per campos nemoraque Upſalienſia.

12. T. alis auratis argenteo ſubfaſciatis: angulo ani macula atra; punctis tribus argenteis. *Fyeslella.*

Tinea Fyeslelia Ent. ſyſt. 3. 2. 318. 1[illegible]
Habitat in Germania Dom. de H[illegible]

mediella. 73. T. alis teſtaceis: macula magna con[illegible]
Alucita mediella Ent. ſyſt. 3. 2. 337. 26.
Habitat in Germaniae nemoribus

granella. 74. T. alis albo nigroque variis, capite [illegible]
Alucita granella Ent. ſyſt. 3. 2. 334. 15.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 889. 377. Fn. Su. 1[illegible]
Geoff. Inſ. 2. 186. 11.
Wien. Verz. 141. 77.
Leuwenh. Epiſt. 1692. mart. 7.
Reaum. Inſ. 3. tab. 20. fig. 14—16.
Roeſſ. Inſ. 1. phal. 4. tab. 12.
Back. Microſc. tab. 13. fig. 13.
Degeer Act. Holm. 1746. 48.
Habitat in frumentorum granariis [illegible] dens glomeransque, hyeme parietes [illegible]

Roeſſella. 75. T. alis nigro auratis: punctis novem [illegible] teis conuexis ſubmarginalibus.
Tinea Roeſſella Ent. ſyſt. 3. 2. 324. 16[illegible] ſyſt. Nat. 2. 898. 445. Fn. Su. 1406.
Wien. Verz. 143. 30.
Frish. Inſ. 3. 31. tab. 4.
Clerk. phal. tab. 12. fig. 13.
Degeer Inſ. tab. 30. fig. 10—12.
Habitat in Mali foliis ſubcutanea, nitid[illegible]

Leuwenhoekella. 76. T. alis auratis: ſtriga baſeos punctiſque [illegible] tuor oppoſitis argenteis.
Tinea Leuwenhoekella Ent. ſyſt. 3. 2. 325. 1[illegible]
Linn. ſyſt. Nat. 2. 897. 437. Fn. Su. 140[illegible]

Wien. Verz. 141. 7.
Habitat in Europae hortis.

T. alis fuſco auratis: punctis quatuor eleua- *Linneella.*
tis argenteis.
Tinea Linneella Ent. ſyſt. 3. 2. 325. 166. Linn.
ſyſt. Nat. 2. 898. 446. Fn. Su. 1408.
Geoff. Inſ. 2. 200. 45.
Clerk. phal. tab. 12. fig. 8.
Habitat in Pomonae arboribus.

T. alis auratis: maculis ſeptem argenteis, ſe- *Rajella.*
cunda tertiaque connatis.
Tinea Rajella Ent. ſyſt. 3. 2. 326. 167. Linn.
ſyſt. Nat. 2. 898. 447. Fn. Su. 1407.
Wien. Verz. 143. 32.
Degeer Inſ. 1. tab. 31. fig. 11. 12.
Habitat in Alni foliis ſubcutanea.

T. alis auratis baſi faſciis duabus maculisque *Schreberella.*
duabus apicis argenteis nitidiſſimis.
Tinea Schreberella Ent. ſyſt. 3. 2. 326. 168.
Habitat in Anglia Dom. Yeats.

T. alis auratis: ſtrigis quatuor argenteis, po- *Klemannella.*
ſticis duabus interruptis punctoque termina-
li atro.
Tinea Klemannella Ent. ſyſt. 3. 2. 326. 169.
Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

T. alis auratis: ſtriga antica lineolisque tri- *Hermannella.*
bus argenteis diſci, apice fuſcis.
Tinea Hermannella Ent. ſyſt. 3. 2. 324. 162.
Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

Rhediella. 82. T. alis nigris apice fuluis: ſtrigis interm
argenteis.
Tinea Rhediella Ent. ſyſt. 3. 2. 324. 161. Lin.
ſyſt. Nat. 2. 895. 444. Fn. Su. 1405.
Clerk. phal. tab. 12. fig. 12.
Habitat in Europae arboretis.

Brongniardella. 83. T. alis flaueſcentibus: ſtrigis quatuor
atrae innatis.
Habitat in Gallia Dom. Boſc.
Statura et ſumma affinitas T. ſyringellae. Ca-
put album. Thorax fuſcus. Alae anti-
flaueſcentes ſtrigis quatuor diſtinctis al-
quae antice ſtriga atra terminantur. Ma-
atra ad apicem marginis interioris: pun-
duobus albis. Poſticae cinereae. Pedes al-
bo nigroque annulati.
Brongniard iunior exſurgens Profeſſor Pariſien-
ſis amiciſſimus entomologiam Pariſinam or-
ſeruat.

Syringella. 84. T. alis auratis, ſtrigis variis albis, p
nigro marginatis.
Tinea Syringella Ent. ſyſt. 3. 2. 328. 177.
Habitat in Germaniae Syringa.

Forſterella. 85. T. alis fuſco auratis: arcu dorſali lineolisq
marginalibus argenteis, apice macula a
pupilla argentea.
Tinea Forſterella Ent. ſyſt. 3. 2. 328. 176.
Habitat Hamburgi Muſ. Dr. Schulz.

Eſperella. 86. T. alis cinereis: ſtrigis tribus abbreuiatis
neolisque duabus apicis argenteis fuſco ma
ginatis.

Tinea Eſperella Ent. ſyſt. 3. 2. 320. 145.
Habitat in Africa Muſ. Dom. Banks.

T. alis auratis: faſciis duabus punctisque tribus argenteis. *Goedartella.*
Tinea Goedartella Ent. ſyſt. 3. 2. 320. 146.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 897. 436. Fn. Su. 1401.
Wien. Verz. 123. 31.
Clerk. phal. tab. 12. fig. 14.
Habitat in Alnetis, in Betulae gemmis.

T. alis nigris: faſciis tribus argenteis transverſe diuaricatis. *Merianella.*
Tinea Merianella Ent. ſyſt. 3. 2. 320. 147. Linn. ſyſt. Nat. 2. 897. 438. Fn. Su. 1402.
Geoff. Inſ. 2. 198. 43.
Wien. Verz. 143. 31.
Reaum. Inſ. 1. tab. 17. fig. 12.
Habitat in Europae Pruno Pado.

T. alis cupro auratis: faſciis duabus maculaque apicis flauiſſimis. *Allionella.*
Tinea Allionella Ent. ſyſt. 3. 2. 321. 148.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

T. alis nigris: ſtrigis tribus nigro argenteis; tertia interne bifida. *Schieffermyllerella.*
Tinea Schieffermyllerella Ent. ſyſt. 3. 2. 321. 150.
Habitat Hamburgi Muſ. Dr. Schulz.

T. alis planis auratis: limbo atro; punctis argenteis numeroſis. *Bergſtraeſſella.*
Tinea Bergſtraeſſella Ent. ſyſt. 3. 2. 321. 151.
Habitat in Germania Dom. de Hattorff.

Schulzella. 92. T. alis auratis: lineis duabus oppoſitis mar-
ginalibus punctorum argenteorum,
atra.
Tinea Schulzella Ent. ſyſt. 3. 2. 321. 152.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis D.
Pflug.

Myllerella. 93. T. alis auratis: ſtrigis duabus baſeos ſtriisq
apicis argenteis.
Tinea Myllerella Ent. ſyſt. 3. 2. 325. 165.
Habitat in Europae hortis.

Seppella. 94. T. alis auratis: ſtrigis duabus argenteis.
Tinea Seppella Ent. ſyſt. 3. 2. 320. 144.
Habitat in Anglia.

Albinella. 95. T. alis fuſcis: linea unica aurea antro
arcuata.
Tinea Albinella Ent. ſyſt. 3. 2. 319. 143. Lin.
ſyſt. Nat. 2. 897. 453. Fn. Su. 1398.
Habitat in Europae arboretis.

Stroemella. 96. T. alis atris: punctis quatuor argenteis ma
culisque quatuor marginalibus flavis.
Tinea Stroemella Ent. ſyſt. 3. 2. 323. 157.
Habitat in Norwegiae nemoribus.

Gleichella. 97. T. alis planis atris: faſcia media maculisq
duabus apicis oppoſitis argenteis.
Tinea Gleichella Ent. ſyſt. 3. 2. 323. 155.
Tinea metallella Wien. Verz. 144. 34.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Yeats.

cydoniella. 98. T. alis auratis: lineola baſeos punctisque qu
tuor parium albiſſimis.
Tinea cydoniella Ent. ſyſt. 3. 2. 323. 159.

Wien, Verz. 144. 35.
Habitat in Pyro Cydonia Dom. Schieffermyller.

T. alis argenteis poſtice ſubcaudatis fuſco ſtriatis punctoque atro. *Clerkella.*
Tinea *Clerkella* Ent. ſyſt. 3. 2. 329. 181. Linn. ſyſt. Nat. 2. 899. 450. Fn. Su. 1411.
Habitat in Europa boreali.

T. alis argenteis nitidis: faſciis tribus flauis, tertia interrupta lineolaque apicis nigra. *hortella.*
Tinea *hortella* Ent. ſyſt. 3. 2. 327. 174.
Habitat Pariſiis Dom. Boſc.

T. alis fuſco argenteis: faſcia poſtica aurea. *Drurella.*
Tinea *Drurella* Ent. ſyſt. 3. 2. 327. 172.
Habitat Hafniae.

T. alis atris nitidis: punctis quinque niueis, duobus communibus, capite fuluo. *10 guttella.*
Tinea *10guttella* Ent. ſyſt. 3. 2. 311. 106.
Habitat Pariſiis Dom. Boſc.

T. alis flaueſcentibus fuſco variis: punctis tribus atris. *blandella.*
Habitat Kiliae.
Parua. Antennae albo nigroque annulatae. Caput et thorax flaueſcentia. Alae flaueſcentes fuſco parum variegatae punctis tribus diſtinctis atris, anteriore ad marginem tenuiorem duobusque in medio uno poſt alterum; poſteriore maiore.

T. alis argenteis: lineolis obliquis marginalibus faſciis punctoque apicis atro. *Cramerella.*
Tinea *Cramerella* Ent. ſyſt. 3. 2. 327. 173.

Habitat in Anglia.

aurella. 105. T. alis auratis poſtice atris: faſcia argen-
Tinea aurella Ent. ſyſt. 3. 2. 329. 180.
Wien. Verz. 142. 9.
Habitat in Lipſiae Pomona.

Blancardella. 106. T. alis auratis: lineola apicis maculisque
ſeptem marginalibus argenteis.
Tinea Blancardella Ent. ſyſt. 3. 2. 327. 17
Habitat in Anglia Dom. Yeats.

Podella. 107. T. alis nigris: faſcia alba.
Alucita Podella Ent. ſyſt. 3. 2. 341. 42. Linn.
ſyſt. Nat. 2. 896. 428.
Geoff. Inſ. 2. 194. 32.
Habitat in Europa.

Paykullella. 108. T. alis fuluo cupreis: baſi faſcia media ma-
culaque apicis flauo aureis.
Alucita Paykullella Ent. ſyſt. 3. 2. 340. 38.
Habitat in Italia Dr. Allioni.

parvella. 109. T. alis obſcure cinereis: maculis duabus co-
ſtalibus fuſcis.
Alucita parvella Ent. ſyſt. 3. 2. 343. 50.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom.
v. Rohr.

minutella. 110. T. alis albidis: faſciis tribus fuſcis.
Alucita minutella Ent. ſyſt. 3. 2. 344. 51.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom.
von Rohr.

feſticella. 111. T. alis anticis albis: maculis duabus fuſc
apice flauis.
Alucita feſticella Ent. ſyſt. 3. 2. 344. 52.

Wien. Verz. 319. 80.
Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.

T. alis albis nigro punctatis annuloque communi dorſali inaequali eleuato, apice emarginatis. *Clairuillella.*

Habitat in Heluetiae Malo Dom. de Clairville.

Caput album, immaculatum. Thorax poſtice eleuatus, niueus. Alae albae, nigro punctatae in medio dorſi macula annulata, eleuata, atra. Margo poſticus late emarginatus emarginatura atra.

Larua viridis: lateribus nigro punctatis.

Puppa folliculata: folliculo albo antice poſticeque attenuato.

Dom. de Clairville amiciſſimus Heluetiae Entomologiam ſtrenue obſeruauit.

T. alis cinereis: pari punctorum dorſali atro poſtice eleuatis acuminatis. *Schellenbergella.*

Habitat in Heluetiae Lonicera Dom. de Clairville.

Statura et magnitudo praecedentis. Caput et thorax cinerea, immaculata. Alae cinereae, in medio dorſi pari punctorum atrorum, poſtice eleuatae, acuminatae.

Larua cinerea dorſo inaequali eleuato punctisque anticis atris.

Puppa utrinque attenuata folliculo flaueſcente.

Dom. Schellenberg amiciſſimus Heluetiae Inſecta delineauit.

Helwigella. 114. T. alis acuminatis cinereis: pari dorſali punctorum nigrorum margineque exteriori albo.

Habitat in Heluetiae Evonymo Dom. de Clairville.

Praecedenti affinis. Caput et thorax cinerea, immaculata. Alae poſticae acuminatae, cinereae margine exteriori albo parique punctorum atrorum in medio dorſo.

Larua nigricans linea dorſali e maculis concatenatis quadratis flauis.

Puppa brunnea in folliculo utrinque attenuato, flauo.

Dom. Helwig Profeſſor Brunſwicenſis Inſectorum obſeruator eximius.

Vltimae tres ſpecies mihi haud rite examinatae, ideoque de genere haereo.

ALUCITA. *Palpi* duo recurui, hirſutiſſimi. *Antennae* elongatae, ſetaceae.

Reaumurella. 1. A. alis nigris extrorſum deauratis, antennis longiſſimis.

Alucita Reaumurella Ent. ſyſt. 3. 2. 342. 41. Linn. ſyſt. Nat. 2. 895. 425. Fn. Su. 139

Geoff. Inſ. 2. 192. 28.

Wien. Verz. 143. 22.

Habitat in Europae Salice.

Latreillella. 2. A. alis aureis: punctis duobus oppoſitis niueis

Habitat in Galliae arbuſtis.

Statura omnino A. Reaumurellae. Antennae longiſſimae, nigrae, apice albae. Caput et thorax hirta, nigra. Alae aureae, nitidae: punctis duobus albis, oppoſitis.

Latreille amiciſſimus Gallus Inſectorum characteres genericos elaborare tentat.

A. alis pallidis immaculatis, antennis longiſſimis. *Swammerdammella.*

Alucita *Swammerdammella* Ent. ſyſt. 3. 2. 338. 31. Linn. ſyſt. Nat. 2. 895. 423. Fn. Su. 1381.

Wien. Verz. 141. 2.

Clerk. phal. tab. 12. fig. 1.

Habitat in Europa frequens.

A. alis viridi aureis, corpore atro, antennis albis. *vindella.*

Alucita *vindella* Ent. ſyſt. 3. 2. 341. 43.

Wien. Verz. 142. 4.

Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.

A. alis pallidis ſubtiliſſime fuſco reticulatis, capite fuluo, antennis albis. *Panzerella.*

Alucita *Panzerella* Ent. ſyſt. 3. 2. 339. 32.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

A. alis fuſceſcentibus immaculatis. *pilella.*

Alucita *pilella* Ent. ſyſt. 3. 2. 339. 33.

Wien. Verz. 142. 6.

Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.

A. alis fuſcis: angulo ani albo. *Robertella.*

Alucita *Robertella* Ent. ſyſt. 3. 2. 339. 34. Linn. ſyſt. Nat. 2. 896. 429. Fn. Su. 1394.

Habitat in Europae Pomona.

Degeerella. 8. A. alis atro aureis: faſcia flaua.
Alucita Degeerella Ent. ſyſt. 3. 2. 341. 40. Linn. ſyſt. Nat. 2. 895. 426. Fn. Su. 1393.
Geoff. Inſ. 2. 193. tab. 12. fig. 5.
Wien. Verz. 143. 21.
Degeer Inſ. 1. tab. 32. fig. 13.
Habitat in Europae hortis frequens.

Sulzella. 9. A. alis aeneo nigris: faſcia aurea.
Alucita Sulzella Ent. ſyſt. 3. 2. 341. 41. Linn. ſyſt. Nat. 2. 896. 427.
Wien. Verz. 123. 24.
Habitat in Europae hortis.

Frishella. 10. A. antennis apice albis, alis fuſco auratis.
Alucita Frishella Ent. ſyſt. 3. 2. 339. 35. Linn. ſyſt. Nat. 2. 896. 433. Fn. Su. 1396.
Wien. Verz. 319. 82.
Habitat in Europae floribus frequens.

calthella. 11. A. atra alis anticis totis aureis, capite ferrugineo.
Alucita calthella Ent. ſyſt. 3. 2. 340. 37. Linn. ſyſt. Nat. 2. 895. 422. Fn. Su. 1432.
Wien. Verz. 142. 16.
Habitat in Calthae floribus frequens.

Erxlebella. 12. A. antennis unicoloribus: alis anticis fuſco aureis, poſticis nigris, capite fuluo.
Alucita Erxlebella Ent. ſyſt. 3. 2. 340. 36.
Habitat Goettingae Dr. Schulz.

promulella. 13. A. alis anticis fuſco aureis poſticis flauis: margine nigro.

Tinea promulella Ent. ſyſt. 3. 2. 340. 39.
Wien. Verz. 142. 17.
Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.

T. alis cupro aureis nitidis. *cuprella.*
Tinea cuprella Ent. ſyſt. 3. 2. 342. 45.
Wien. Verz. 330. 44.
Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.

T. alis auratis: faſcia fuſca, antennis apice albis. *faſciella.*
Tinea faſciella Ent. ſyſt. 3. 2. 342. 46.
Wien. Verz. 142. 20.
Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.

T. alis auro purpureoque variegatis nitidiſſimis. *Sparmannella.*
Tinea Sparmannella Ent. ſyſt. 3. 2. 324. 160.
Habitat Pariſiis Dom. Boſc.

PSOLOPHUS. *Palpi* duo porrecti, medio dilatati, ungue arcuato, acuto, retractili.
Antennae filiformes.

P. alis incumbentibus ferrugineis: macula coſtali obſoleta, flaua. *cornutus.*
Habitat in arborum gemmis Galliae D. Boſc.
Statura... Caput et thorax obſcura antennis albo nigroque variis. Alae incumbentes, ferrugineae macula magna, obſoleta, flaua in medio coſtae. Poſticae nigrae margine albido.

unguicula- 2. Y. alis incumbentibus obſcure cinereis: ma
tus. la dorſali ſtrigaque poſtica fuſcis.
Habitat in arborum gemmis Galliae Dom. B
Statura et magnitudo praecedentis. Ant
cinereo fuſcoque variae. Caput et th
cinerea. Alae incumbentes obſcure
reae macula media parva ſtrigaque po
culam fere obſoleta fuſcis. Poſticae fu

vittatus. 3. Y. alis deflexis albis fuſco lineatis: punctis ma
gineque poſtico atris.
Alucita vittella Ent. ſyſt. 3. 2. 332. 10.
Phalaena vittella Linn. ſyſt. Nat. 2. 890. 38
Fn. Su. 1366.
Wien. Verz. 136. 42.
Clerk. phal. tab. 3. fig. 10.
Degeer Inſ. 1. tab. 26.
Habitat in Heſperis matronalis gemmis.

uſtulatus. 4. Y. alis incumbentibus linearibus fuſco bru
neis apice uſtulatis.
Tinea uſtulella Ent. ſyſt. 3. 2. 307. 88.
Habitat in Italia.

elongatus. 5. Y. alis incumbentibus linearibus teſtaceis im
maculatis.
Tinea elongella Ent. ſyſt. 3. 2. 307. 89. Lin
ſyſt. Nat. 2. 890. 385. Fn. Su. 1436.
Tinea ciliella Wien. Verz. 136. 51.
Habitat in Europae hortis.

hemedacty- 6. Y. alis incumbentibus linearibus pallide teſta
lus. ceis rufo irroratis.
Tinea hemedactylella Ent. ſyſt. 3. 2. 307. 90.

...en. Verz. 144. 41.
...bitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.
...alis incumbentibus ciliatis cinereis nitidulis *Oleae.*
...immaculatis.
...ea *oleella* Ent. ſyſt. 3. 2. 308. 53. 91.
...itat in nucleis fructus Oleae, quos cadere
...facit ante maturitatem. Muſ. Dom. Boſc.
...alis incumbentibus linearibus fuſcis: macu- *cylindricus.*
...li, tribus flauis.
...a *cylindrella* Ent. ſyſt. 3. 2. 308. 54. 92.
...itat Hamburgi Muſ. Dr. Schulz.
... alis anticis cinereis fuſco irroratis: dorſo *dorſatus.*
...communi albido; maculis duabus nigris.
...cita *dorſella* Ent. ſyſt. 3. 2. 336. 22.
...bitat in Saxonia Dom. Hybner.
Y. alis poſtice acuminatis eleuatis rufis; mar- *harnatus.*
...gine communi dorſali dentato flauo.
...bitat in Heluetiae Lonicera, Groſſularia D.
de Clairville.
...tura et magnitudo Y. ſyluarum. Caput et
thorax flaueſcentia. Alae deflexae, poſtice
acuminatae, eleuatae, rufae margine inte-
riori, communi ultra medium flauo, den-
tem unum alterumue exſerente.
...rua flaueſcens, dorſo ſanguineo.
...pa folliculo cylindrico, utrinque attenuato,
cinereo.
Y. alis flauo auratis: faſciis duabus fuſcis ob- *ſyluarum.*
liquis.
...cita *ſyluella* Ent. ſyſt. 3. 2. 331. 5. Linn.
ſyſt. Nat. 2. 893. 413.

Habitat Upſaliae.

nemorum. 12. Y. alis viridi flaueſcentibus: anticis fa-duabus abbreuiatis dorſalibus obſcurioribus

Alucita nemorella Ent. ſyſt. 3. 2. 331. 6.

Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

lucorum. 13. Y. alis flauis immaculatis, capite thoraceque niueis.

Alucita lucella Ent. ſyſt. 3. 2. 332. 7.

Tinea antennella Wien. Verz. 135. 19.

Habitat in Sueciae nemoribus.

alpinus. 14. Y. alis flauis: maculis oliuaceis.

Alucita alpella Ent. ſyſt. 3. 2. 332. 8.

Wien. Verz. 135. 21.

Habitat in Auſtriae montoſis Muſ. D. Schiffermyller.

Xyloſtei. 15. Y. alis cinereo fuſcis: vitta dorſali communi alba ſinuata.

Alucita Xyloſtella Ent. ſyſt. 3. 2. 330. 1. Linn. ſyſt. Nat. 2. 890. 389. Fn. Su. 1390.

Geoff. Inſ. 2. 195.

Roeſſ. Inſ. 1. phal. 4. tab. 10.

Wien. Verz. 137. 54.

Habitat in Lonicera Xyloſteo.

dentatus. 16. Y. alis fuſcis apice falcatis: vitta dorſali communi unidentata alba.

Alucita dentella Ent. ſyſt. 3. 2. 331. 4.

Tinea harpella Wien. Verz. 136. 50.

Degeer Inſ. Ueberſ. 2. 1. 364. 1.

Habitat in Europae Caprifolio.

Y. niueus alis rufo auratis: macula coſtali *coſtatus.* baſeos alba fuſco punctata.

Tinea *coſtella* Ent. ſyſt. 3. 2. 336. 23.

Habitat in Anglia Dom. Drury.

Y. alis pallide auratis: vitta dorſali niuea; *ephippium.* faſcia aurea.

Tinea *ephippella* Ent. ſyſt. 3. 2. 330. 3.

Tinea *pruniella* Wien. Verz. 141. 75.

Habitat in Europa Dr. Schulz.

Y. alis atris: vitta dorſali ſinuata punctisque *capitatus.* duobus marginalibus albis.

Tinea *capitella* Ent. ſyſt. 3. 2. 330. 2.

Habitat in Americae Inſulis Dr. Pflug.

Y. alis obſcure cinereis: vitta media dentata *ſinuatus.* fuſca.

Tinea *dentella* Ent. ſyſt. 3. 2. 343. 49.

Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Rohr.

Y. alis anticis niueis: vitta communi dorſali *nyctemerus.* dentata maculisque coſtalibus atris.

Tinea *nyctemerella* Ent. ſyſt. 3. 2. 333. 11.

Wien. Verz. 130. 38.

Habitat in Auſtria Muſ. Dom. Schieffermyller.

Y. alis cinereo fuſcis nitidulis: lineola inter- *autumnalis.* rupta albida, antennis pectinatis.

Habitat in Gallia in autumno gelu primo veniente Dom. Boſc.

Media. Antennae utrinque pectinatae. Alae cinereo fuſcae, nitidulae linea media a baſi ad medium ducta, in medio interrupta, al-

ba, fere obſoleta. Ad marginem exte-
rem lineola alia itidem albida.

maculatus. 23. Y. alis anticis fuſco auratis: macula ba-
coſtali niuea.

Alucita maculella Ent. ſyſt. 3. 2. 333. 12.
Habitat Halae Saxonum Muſ. Dom. Hybner.

CLASSIS XII.

RYNGOTA.

ROSTRO: VAGINA ARTICULATA.

FLATA.

Roſtro absque maxilla palpiſque.
Roſtrum porrectum, inflexum.
Vagina cylindrica, canaliculata, quadriarticulata, articulis aequalibus ſub ſetarum baſi inſerta.
Setae tres longitudine vaginae, ſubaequales, ſetaceae, acutae, intra vaginam latentes.
Labium magnum, conicum, ſubulatum, acutum, roſtrum inuoluens.
Antennae breues, biarticulatae, ſub oculis inſertae.

DELPHAX.

Roſtro absque maxilla palpiſque.
Roſtrum porrectum, inflexum.
Vagina cylindrica, canaliculata, triarticulata: articulis aequalibus.
Setae tres.
Labium breue, ſubulatum.

Antennae filiformes, biarticulatae: articulo pri-
mo maiori, lato, compreſſo, utrinque mar-
ginato, ſecundo breuiori, ſubcylindr-
apice ſetigero in oculorum cantho infer-
inſertae.

Roſtrum huius generis mihi haud rite exam-
natum.

MEMBRACIS. *Labium* corneum, elongatum, apice membranaceum, ſubulatum.

Antennae ſubulatae, ſub capitis clypeo inſertae.

1. M. thorace foliaceo obtegente: dorſo late emarginato, corpore brunneo. *ſinuata.*
Habitat in America Dom. Hybner.
Corpus paruum colore variat, mox brunneum macula una alteraue fuſca, mox griſeum ſtriga poſtica alba. Thorax valde productus, elytra obtegens; dorſo foliaceus, in medio late emarginatus.

2. M. thorace foliaceo obtegente: dorſo late emarginato; corpore nigro, pedibus albis. *emarginata.*
Habitat in Carolina Dom. Boſc.
Statura et ſumma affinitas praecedentis at duplo minor. Corpus nigrum ſtriis aliquot obſoletis pedibusque albis. Thorax foliaceus dorſo late emarginato. Elytra apice hyalina.

3. M. thorace foliaceo rotundato fuſco: ſtriga ante marginem anticum faſciaque poſtica albis. *fuſcata.*
Habitat in India orientali Dom. Hybner.
Statura omnino M. faſciatae. Thorax foliaceus, rotundatus, fuſcus ſtriga tenui ante

marginem anteriorem faſciaque latiore ante apicem albis. Apex acuta, nigra. Elytra fuſca.

rupicapra. 13—14. M. thorace tricorni: cornu intermedio ſublongiori recuruo, elytris obſcure hyalinis.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Corpus paruum, fuſcum. Thorax cornubus tribus: lateralibus craſſioribus, obtuſis ſeu potius truncatis ſubdentatis intermedio poſteriori, recuruo. Elytra fuſco hyalina. Alae albidae.

Tarandus. 23—4. M. thorace bicorni: cornubus fornicatis, elytris hyalinis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo M. cornutae. Corpus obſcurum dorſo fuſco. Thorax cornubus duobus compreſſis, fornicatis, obtuſis, poſtice ſubulatus, abdomine longior. Elytra hyalina, fuſco venoſa. Alae albidae. Pedes ferruginei.

Capra. 23—4. M. thorace bicorni poſtice breui emarginato, corpore fuſco.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Corpus M. cornuta minus, totum fuſcum, immaculatum. Thoracis cornua magna, craſſa, obtuſa poſtice breuis, emarginatum. Elytra fuſca.

minuta. 32. M. thorace ſubinermi ſcabro poſtice producto longitudine abdominis, elytris albidis baſi atris.

bitat in India orientali Dom. de Seheſtedt.
nuta. Caput et thorax atra, punctis eleua-
tis ſcabra. Thorax poſtice productus atte-
nuatus, ante apicem parum eleuatus longi-
tudine abdominis. Elytra obſcure albida,
fuſco ſubmaculata, baſi atra. Alae breuio-
res, hyalinae. Corpus nigrum.

. thorace inermi atro poſtice producto lon- *faſciata.*
gitudine abdominis, elytris baſi faſcia flaua.
bitat in Americae Inſulis Muſ. Dom. Boſc.
tura parua praecedentis. Caput et thorax
leuia, atra, immaculata. Elytra obſcura
baſi faſcia flaua.

ETTIGONIA. *Os* roſtro inflexo.
Vagina biarticulata,
gulae inſerta.
Antennae ſetaceae.

. T. thorace poſtice atro teſtaceo macula- *8guttata.*
to, elytris baſi nigris: punctis quatuor albis.
bitat Cajennae Muſ. Dom. Boſc.
tura et magnitudo T. plebejae. Caput pal-
lidum faſciis duabus parallelis, atris. In
medio faſciae dilatatae ſuperioris ſtemmata
tria, inferioris puncta duo maculaque palli-
da. Thorax antice rufus, in medio faſcia
ta pallida, poſtice ater macula magna tri-
quetra, teſtacea. Abdomen nigrum. Elytra
baſi ad medium nigra punctis quatuor mag-
nis, albis 3. 1. apice hyalina. Alae breues
nigrae margine poſtico albo.

coſtalis. 22—3. T. atra elytris hyalinis: coſta fulua.

Habitat in Philadelphia Muſ. Dom. Boſc.

Statura praecedentis. Caput et thorax atra. Abdomen nigrum ſegmentorum marginibus ſubtus teſtaceis. Elytra aquea coſta late fulua, inprimis a baſi ad medium. Pedes nigri femoribus anticis rufis.

punctata. 23—4. T. thorace poſtice atro ferrugineo lineato, alis hyalinis: ſtigmate albo ſtrigisque duabus punctorum fuſcorum.

Habitat in Ruſſia meridionali Dom. Boeber.

Media. Caput et thorax antice nigro ferrugineoque varia. Thorax poſtice ater lineis tribus poſtice coeuntibus ferrugineis. Scutellum albidum macula media nigra. Elytra hyalina ſtigmate in medio coſtae albo punctisque ſtrigis duabus anteriore e punctis quinque maioribus nigris, poſteriore e punctis ſex. Alae hyalinae ſtigmate albo.

hyalina. 32—3. T. nigra thorace ſtriga media lineolisque duabus ferrugineis, elytris hyalinis: ſtigmate nigro.

Habitat in Ruſſia meridionali Dom. Boeber.

Parua. Caput nigrum margine antico ferrugineo. Thorax niger ſtriga media lineolisque duabus poſticis ſtriga connexis, ferrugineis. Scutellum nigrum macula apicis margineque ferrugineis. Abdomen ſupra nigrum, ſubtus cinereum. Elytra hyalina immaculata ſolo ſtigmate coſtali parvo nigro.

6. T. brunnea thoracis lobo antico flauo maculato, alis hyalinis. *brunnea.*
Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.
Caput nigrum fronte atra. Thorax obſcure brunneus, lobo antico utrinque maculis tribus flauis. Scutellum flauum. Abdomen brunneum ſegmentorum marginibus flauis. Pectus albidum. Alae hyalinae coſta baſeos flaueſcente.

FLATA. *Os* labio conico roſtrum inuoluente.
Antennae biarticulatae, ſub oculis inſertae.

F. atra alis macula ocellari albo hyalina, abdomine apice flauo. *perſpicillata.*
Cicada *perſpicillata* Ent. ſyſt. 4. 27. 1.
Stoll. Cicad. tab. 1. fig. 5.
Habitat in Indiis Dr. Schulz.

F. elytris compreſſis adſcendentibus viridibus: punctis ocellaribus ferrugineis. *ocellata.*
Cicada *ocellata* Ent. ſyſt. 4. 27. 2.
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

Flatae corpus medium, oblongum, tardum, immarginatum capite paruo, compreſſo, utrinque carinato, carina eleuata, acuta, oculis paruis, globoſis, lateralibus, ſub carina inſertis, thorace transuerſo: lobo antico diſtincto, rotundato, ſcutello paruo, rotundato, elytris alisque magnis, aequalibus, abdomine multo longioribus, pedibus tenuibus, tibiis compreſſis, colore vario.

limbata. 3. F. elytris deflexis viridibus: margine rubro interiori baſi nigro punctato.
Cicada limbata Ent. ſyſt. 4. 27. 3.
Stoll. Cicad. tab. 11. fig. 54.
Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.

candida. 4. F. niuea, elytris deflexis: lineolis duabus flauis.
Habitat in Isle de France de Billardiere.
Magna. Caput et thorax niuea, immaculata. Elytra deflexa, compreſſa, poſtice elongata acuta, niuea lineolis duabus obliquis flauis ad baſin. Pedes pallidi.

fuſcata. 5. F. elytris deflexis nigro hyalinis immaculatis.
Cicada fuſcata Ent. ſyſt. 4. 28. 4.
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.

phalaenoides. 6. F. exalbida alis deflexis patulis, elytris anticis nigro punctatis.
Cicada phalaenoides Ent. ſyſt. 4. 28. 5. Linn. ſyſt. Nat. 2. 710. 40.
Stoll. Cicad. tab. 2. fig. 9.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 9. fig. 10.
Degeer Inſ. 3. 222. tab. 33. fig. 6.
Habitat in Americae plantis.

bipunctata. 7. F. exalbida elytris deflexis, thoracis margine antico punctis duobus impreſſis.
Cicada bipunctata Ent. ſyſt. 4. 28. 6. Linn. ſyſt. Nat. 2. 710. 41.
Habitat in America.

retuſa. 8. F. exalbida immaculata capite retuſo.
Cicada retuſa Ent. ſyſt. 4. 28. 7.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

F. griſea elytris deflexis capite apice puncto nigro. *griſea.*
Cicada *griſea* Ent. ſyſt. 4. 28. 8.
Habitat in America Dom. v. Rohr.

F. elytris deflexis viridibus: punctis tribus albidis. *3punctata.*
Cicada *3punctata* Ent. ſyſt. 4. 29. 9.
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. D. Banks.

F. viridis elytris deflexis, alis albis, fronte conica. *viuida.*
Cicada *viuida* Ent. ſyſt. 4. 29. 10.
Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Rohr.

F. elytris deflexis viridibus; dorſo ſcabro, capitis margine poſtico thoraceque linea dorſali ſanguineis. *minuta.*
Cicada *minuta* Ent. ſyſt. 4. 29. 11.
Habitat in noua Hollandia Muſ. D. Banks.

F. flaua elytris deflexis obſcuris: linea laterali flaua. *marginata.*
Cicada *marginata* Ent. ſyſt. 4. 29. 12. Linn. ſyſt. Nat. 2. 616. 39.
Habitat in Americae Inſulis.

F. elytris deflexis immaculatis, corpore flaueſcente. *pygmaea.*
Cicada *pygmaea* Ent. ſyſt. 4. 30. 13.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dr. Pflug.

F. elytris deflexis griſeis: pari punctorum nigrorum. *4punctata.*
Cicada *4punctata* Ent. ſyſt. 4. 30. 14.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom. Smidt.

CICADA. Os labio rotundato apice ſetaceo.
Antennae filiformes, ſub oculis inſertae.

ſpinoſa. 16—7. C. fronte retuſa flaua, elytris viridibus: faſciis tribus albidis, oculis ſpinoſis.
Habitat in Isle de France Muſ. D. Bolc.
Minor C. lanata. Frons magna, retuſa, flaua. Oculi prominuli, ferruginei ſpina parua prominente, acuta. Caput et thorax obſcuriora. Elytra deflexa, viridia faſciis tribus obliquis, albidis. Abdomen deeſt. Pedes ſanguinei.

orbona. 25—6. C. capite ſcutelloque fuluis nigro reticulatis; elytris nigris apice obſcure cinereis.
Habitat in America Dom. Hybner.
Statura et magnitudo omnino C. obtuſae. Caput fuluum, nigro reticulatum. Thorax antice fuluus punctis duobus fuſcis poſtice griſeus. Scutellum fuluum, nigro reticulatum. Elytra nigra apice late obſcure cinereae. Abdomen fuluum dorſo atro.

Danais. 28—9. C. viridis elytris hyalinis apice nigris.
Habitat — — Dom. Weber.
Magnitudo C. elongatae. Caput et thorax viridia. Abdomen flaueſcens. Elytra hyalina margine tenuiore tenuiſſime poſticoque

latiori nigris. Stigma ordinarium fuſcum ad marginem craſſiorem.

7. C. viridis capite ſubeleuato; puncto apicis atro. *graminea.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino C. praſinae at paullo minor et diſtincta. Corpus totum viride puncto ſolo atro in apice capitis poſtice parum eleuati.

8. C. ſupra coccinea nigro variegata. *cruenta.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Parua. Caput ſanguineum, punctis duobus anticis maculaque baſeos cum thoracis coeunte atris. Thorax ſanguineus macula apicis utrinque cuſpidata atra. Scutellum atrum linea media apiceque ſanguineis. Elytra ſanguinea vitta lata media ſuturaque atris. Corpus flaueſcens.

8. C. nigra capite thoraceque vitta lata alba, elytris punctis duobus adiacentibus macula coccinea. *feſtiua.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Parua. Caput et thorax nitida vitta lata dorſali niuea. Scutellum nigrum, immaculatum. Elytra nigra verſus apicem punctis duobus oppoſitis niueis adiacentibus macula magna poſtica, coccinea. Corpus pallidum abdomine coccineo, ano nigro.

7. C. obſcura elytris nigris: puncto medio apiceque hyalinis. *paruula.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Minuta. Caput margine undique eleuato … cum margine lineaque media pallidis. Th… rax niger, immaculatus. Elytra nigra … ɛto magno medio apiceque nigro ner… hyalinis.

DELPHAX. Os labio breui conico.
Antennae compreſſae, mar-
ginatae, in oculorum can-
tho inferiori inſertae.

craſſicornis. 1. D. pallida elytris albo nigroque variis.
Cicada craſſicornis Panz. Fn. Germ. 35. tab. 10
Habitat in Germania auſtraliori Dom. Panz…
Antennae pallidae margine fuſco. Caput … thorax pallida macula ouata, atra utrinque … ad ſcutellum. Elytra hyalino atroque varia. Corpus pallidum.

clauicornis. 2. D. fuſca elytris hyalinis: ſtriga poſtica fuſca.
Cicada clauicornis Ent. ſyſt. 4. 41. 62.
Habitat Pariſiis Dom. Boſc.

CERCOPIS. Os labio abbreuiato, trun-
cato, emarginato.
Antennae filiformes, ſub
capitis margine promi-
nulo inſertae.

gigas. 1—2. C. capite thoraceque pallidis ferrugineo lineatis, elytris fuſcis: faſcia punctisque albis …

Delphax corpus paruum, ouatum, immarginatum, agile, capite ouato, transuerſo, antennis vix thorace …

Habitat Cajennae Dom. Dymeril.

Magna in hoc genere. Caput et thorax pallida lineis quatuor ferrugineis: intermediis antice coeuntibus. Scutellum fuſcum. Elytra fuſca, in medio faſcia poſticeque punctis tribus verſus marginem exteriorem albis. Corpus fuſcum.

12. C. atra elytris teſtaceis: ſutura lituraque poſtica nigris. *bicolor.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldorff.

Magnitudo et ſtatura praecedentium. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra teſtacea margine interiori punctisque aliquot verſus angulum ani nigris. Alae albae.

14. C. capite thoraceque nigris: faſcia flaua, elytris pallidis immaculatis. *transuerſa.*

Habitat in Kiliae plantis.

Statura et magnitudo omnino C. ſtriatae. Caput ſupra nigrum faſcia lata flaua, ſubtus flauum. Thorax niger faſcia lata, media, flaua. Scutellum nigrum punctis duobus minutis lineolaque parua verſus apicem flauis. Elytra pallida, immaculata. Corpus nigrum ano pedibusque pallidis.

---

longioribus, marginatis, ſub oculis in cantho ipſo inſertis oculis magnis, rotundatis, prominulis, lateralibus, thorace breui, transuerſo, ſcutello triangulari, elytris deflexis longitudine alarum, abdomine longioribus, pedibus tenuibus, elongatis, ciliatis, colore obſcuro.

lateralis. 24—5. C. atra atomis lineisque obſoletis flau-
elytrorum margine ſanguineo.
Habitat in Carolina Muſ. Dom. Boſc.
Statura omnino C. leucophtalmae. Caput, tho-
rax, ſcutellum atra atomis minutis, nume-
roſis, flauis. Elytra atra lineis tenuiſſimis
flauis. Linea lateralis lata ſanguinea mar-
ne tamen ipſo atro. Corpus atrum linea la-
terali flaua.

albipennis. 43—4. C. pallida thorace fuſco, elytris albis
macula baſeos ſtrigaque fuſcis.
Habitat in Gallia Dom. Boſc.
Statura praecedentium. Corpus pallidum.
Thorax fuſcus, immaculatus. Elytra alba
macula magna baſeos ſtrigaque poſtica obli-
qua fuſcis.

NOTONECIA. Os roſtro arcuato.
Labium conicum, e-
longatum, ſubula-
tum.
Antennae ſub oculis
inſertae.

ciliata. 3—4. N. exalbida thoracis margine dilatato de-
flexo ciliato.
Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff.
N. niuea duplo maior. Caput pallidum ocu-
lis magnis, ouatis, caſtaneis. Thorax tranſ-
uerſus, exalbidus margine utrinque lobo de-
flexo, rotundato, ciliato. Elytra rotunda-

ta, integra, exalbida, pellucida, immaculata. Abdomen nigrum per elytra conſpicuum.

NAUCORIS. Os roſtro ſubinflexo.
Setae tres inaequales.
Labium porrectum, rotundatum.
Antennae breuiſſimae, ſub oculis inſertae.

3. N. abdominis margine ſerrato, capite thoraceque vireſcentibus fuſco maculatis, elytris fuſcis. *maculata.*
Habitat in Galliae aquis Dom. Boſc.
Diſtincta omnino a N. aeſtiuali. Caput vireſcens linea media ad baſin dilatata maculisque utrinque duabus fuſcis. Thorax vireſcens lineis quatuor latis, fuſcis. Scutellum et elytra nigra, immaculata. Corpus vireſcens ano fuſceſcente.

4. N. abdominis margine integro ſupra nigra, pedibus anticis biunguiculatis. *oculata.*
Habitat in Carolina Dom. Boſc.
Affinis N. nepaeformi at omnino diſtincta. Caput paruum oculis valde prominentibus, ouatis canthoque oculorum ſubſpinoſo. Thorax inaequalis, niger. Elytra nigra, immaculata. Pedes antici vix incraſſati tibiis elongatis, incuruis apice unguibus duobus incuruis, acutis, validis.

ACANTHIA. *Roſtrum* ſub capitis apice inſertum.
Labium nullum.
Antennae ante oculos inſertae.

membranacea. 21—2. A. membranacea depreſſa atra thoracis abdominisque margine integro.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino A. corticalis at tota atra et abdominis et thoracis margo integer. Antennarum ultimus articulus rufeſcit.

hiſteroides. 24—5. A. obſcura thorace antice utrinque porrecto ſpinoſo, ſcutelli marginibus albis, capite bifido.

Stoll. Cimic. tab. 25. fig. 197.

Habitat — — Dom. Weber.

Statura depreſſa et magnitudo A. paradoxae. Caput nigrum, bifidum et ſub laciniis roſtrum inſertum. Thorax obſcurus, planus utrinque angulo antico valde porrecto, ſubſpinoſo. Scutellum nigrum utrinque linea marginali alba. Elytra nigra. Corpus obſcurum.

varia. 26—7. A. depreſſa thorace denticulato, capite ſpinoſo, corpore nigro rufò pallidoque variegato.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Corpus planum, depreſſum A. Betulae. Caput fuſcum, utrinque biſpinoſum. Thorax

fuſcus lineis quatuor dorſalibus, eleuatis, ru-
fis: margine dilatato, denticulato, pallido.
Elytra abdomine breuiora, anguſtiora, fuſca,
pallido reticulata. Scutellum fuſcum lineis
tribus rufis. Abdomen fuſco ferrugineoque
varium margine eleuato, carinato.

MEX. *Labium* elongatum, ſubulatum, annulatum.
Antennae filiformes, ante oculos inſertae.

C. ſcutellaris oblongus coeruleus nigro maculatus abdominis margine rufo. *patricius.*
bitat Tranquebariae Dom. Daldorff.
tura oblonga omnino C. nobilis at triplo minor. Caput coeruleum, nitidum linea dorſali punctoque utrinque baſeos nigris. Thorax coeruleus linea dorſali punctisque utrinque quatuor nigris. Scutellum magnum, coeruleum punctis nouem 3. 3. 2. 1. nigris. Corpus flaueſcens faſciis marginalibus coeruleis abdominisque margine rubro. Pedes nigri femoribus rufis.

C. ſcutellaris thorace ſcutelloque pallide purpuraſcentibus: linea dorſali maculisque utrinque tribus cyaneo nigris. *12punctatus.*
bitat Cajennae Muſ. Dom. Boſc.
nus. Caput cyaneum lineis tribus baſin haud attingentibus rufis. Thorax eleuatus, pallide ruſeſcens linea dorſali maculisque tri-

bus oblongis 1: 2: coeruleo cyaneis. Scut-
lum concolor linea dorſali apicem haud at-
tingente, cyanea. Puncta praeterea utrin-
que tria cyanea, aequalia. Margo p-
obſcure cyaneus. Subtus flaueſcens ma-
lis marginalibus cyaneis. Pedes nigri femo-
ribus rufis.

Baro. 7—8. C. ſcutellaris pallens thorace macula ſcu-
tello tribus cyaneo nigris.

Habitat in China Muſ. Dom. Lund.

Corpus magnum. Caput pallens antennis li-
nea media margineque poſtico nigro cyane-
is. Thorax pallens nitidus macula magna
ouata, marginem anticum attingente cya-
nea. Scutellum magnum, glabrum, palli-
dum, nitidum maculis tribus cyaneo ni-
gris: intermedia cordata. Pectus cyaneum.
Abdomen pallidum faſciis cyaneis. Pedes
cyanei.

ſtigma. 10—11. C. ſcutellaris ſcutello atro: baſi linea
dorſali margine maculisque duabus ocellari-
bus fuluis.

Habitat in Senegallia Dom. Dumerill.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput
nigrum lineolis duabus ante oculos fuluis.
Thorax fuluus, nigro irroratus punctis qua-
tuor marginis anticis exterioribus duplicatis
maculisque octo marginis poſtici nigris.
Scutellum magnum, atrum baſi inaequali-
ter, linea media margineque fuluis. Prae-
terea in medio maculae duae ocellares, vel

Potius annuli duo fului. Pectus nigrum. Abdomen faluum margine nigro maculato. Pedes nigri.

28. C. ſcutellaris obſcure rufus: atomis albidis, corpore flaueſcente. *Boſcii.*
Habitat in Americae Inſulis Muſ. Dom. Boſc.
Affinis certe C. paedemontano at minor et diſtinctus. Caput fuſcum. Thorax et ſcutellum obſcure rufa atomis paruis, albidis. Corpus, antennae, pedes flaueſcentia.

1. C. ſcutellaris pallide teſtaceus abdominis margine utrinque prominulo fuſco maculato. *maroccanus.*
Habitat in Tanger Dom. Schousboe.
Statura et magnitudo praecedentium totus pallide teſtaceus abdominis margine utrinque late prominulo maculis obſoletis fuſcis.

2. C. ſcutellaris thorace biſpinoſo, corpore griſeo. *biſpinoſus.*
Habitat in Marocco Dom. Lund.
Magnitudo et ſtatura C. albolineati diſtinctus ſpinis utrinque thoracis duabus porrectis, acutis, altera ad marginem anteriorem paullo breuiore, altera ad marginem poſticum longiore, acutiore.

4. C. ſcutellaris thorace mutico ferrugineo griſeus flauo ſtriatus. *flauo lineatus.*
Habitat — — Muſ. Dom. Boſc.
Statura C. albolineati at omnino diſtinctus. Antennae obſcurae. Caput flaueſcens, immaculatum. Thorax nullo modo ſpinoſus, ſub-

ferrugineus margine lineisque quinque di-
ſtinctis, flauis. Scutellum anguſtius, ferru-
gineo griſeum margine lineisque tribus fla-
uis: intermediis valde abbreuiatis. Elytra
rufeſcentia margine poſtico nigro. Alae
bae. Subtus flauus, nigro punctatus. Pedes
flaui.

coccineus. 34—5. C. ſcutellaris coccineus thoracis margine
antico coeruleſcente, antennis compreſſis.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Paruus. Antennae ſingulares, compreſſae,
marginatae, triarticulatae, griſeae. Corpus
coccineum thoracis margine antico parum
coeruleſcente. Pedes coccinei geniculis fuſcis.

dorſalis. 42—3. C. ſcutellaris nigricans: linea dorſali ſcu-
tellique lineis duabus albis.

Habitat in Mogador D. Schousboe Muſ. Dom.
Lund.

Minor C. litura. Caput canaliculatum, fuſcum.
Thorax fuſcus linea dorſali alba. Scutellum
fuſcum linea dorſali alba. Praeterea utrin-
que lineola alba atrae innata. Corpus ...
cum tibiis pallidis.

coarctatus. 44—5. C. ſcutellaris obſcurus thorace utrinque
bidentato, ſcutello in medio coarctato.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Corpus oblongum magnitudine C. liturae ...
tum obſcurum, minime nitidum capite ...
racisque antico nigris. Thorax utrinque den-
tibus duobus paruis altero verſus apicem

altero verſus baſin. Scutellum utrinque in medio coarctatum.

5. C. ſcutellaris flaueſcens: punctis numero- *cribrarius.* ſiſſimis impreſſis fuſcis, ſcutello poſtice emarginato.

Habitat in India orientali Muſ. Dom. de Sehestedt.

Corpus paruum, ſubrotundum. Thorax et ſcutellum flaueſcentia punctis numeroſiſſimis, impreſſis, fuſcis. Scutellum poſtice ſubemarginatum. Corpus flaueſcens abdominis medio atro. Pedes flaui.

1. C. thorace ſpinoſo: ſpinis nigris flauis, *Antilope.* elytris fuſcis albolineatis.

Habitat in Americae Inſulis Muſ. Dom. Boſc.

Statura C. Dama. Caput, thorax, ſcutellum, corpus flaua, immaculata. Thoracis cornua porrecta, cylindrica, obtuſa, atra. Elytra fuſca, albo lineata. Alae nigrae.

1. C. thorace ſerrato ſpinoſoque: ſpinis ele- *reflexus.* uatis reflexis obſcurus antennis pedibusque rufis.

Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

Medius. Caput nigrum margine tenuiſſime ruſo apiceque emarginato: Antennae rufae articulo ultimo nigro, baſi pallido. Thorax niger maculis duabus dorſalibus rufis margine ſerrato: dente poſtico longiori eleuato, reflexo. Scutellum elytraque griſea punctis numeroſiſſimis nigris, impreſſis. Pedes nigri.

clauatus. 66—7. C. thorace ſpinoſo cinereus nigro vario, thoracis ſpina clauata atra: punctis duobus albis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Paullo minor C. dentato. Caput porrectum. Thorax haud utrinque unidentatum. Thorax tus at utrinque ſpina parua armatus atra: apice punctis duobus albis. Scut apice cinereum. Alae fuſco maculatae. domen flaueſcens margine nigro flauo culato.

Heros. 63—4. C. thorace acute ſpinoſo: ſpinis nigris flaueſcens nigro irroratus, antennis pedibusque flaueſcentibus.

Habitat Cajennae.

Affinis videtur C. pugnax. Caput, thorax, tellum, elytra concolora, flaueſcentia mis innumeris nigris irrorata. Thoracis ſpinae nigrae.

haſtator. 92—3. C. thorace acute ſpinoſo niger antennis abdominis margine pedibusque rufis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura praecedentium. Caput nigrum ſpina acuta, valida. Antennae rufae. Thorax punctatus, niger ſpina valida, porrecta acutiſſima. Scutellum, elytra, alae immaculata. Abdomen nigrum margine feriori rufo: ano bidentato. Pedes rufi.

marginatus. 98—99. C. thoracis margine dilatato rotundato antice albo nigropunctato.

Habitat Tanger Dom. Schousboe.

Corpus paruum, depreſſum. Caput obtuſum, rotundatum, obſcurum. Thorax obſcurus, vix ſpinoſus at margo dilatatus, rotundatus antice albus punctis minutis, atris. Scutellum obſcurum, apice album. Elytra obſcura. Alae cinereae atomis fuſcis. Pectus albo nigroque varium. Abdomen albidum macula magna baſeos nigra margineque ſupra albo nigroque maculato. Pedes pallidi, nigro punctati.

5. C. ruber thorace ſcutello elytrisque maculis duabus atris. *perſpicuus.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Caput nigrum lineis duabus rufis. Thorax rufus maculis duabus paruis, anticis duabusque maioribus dorſalibus, atris. Scutellum magnum, rufum maculis duabus magnis baſeos atris. Elytra rufa maculis duabus verſus apicem atris: poſteriore minore. Alae atra margine apicis albido. Corpus rufum pectore abdominisque margine atro punctatis. Pedes nigri femoribus rufis apice nigris annulo ruſo.

5. C. viridis abdominis margine albo atro punctato. *ſpirans.*

Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Rohr.

Statura et ſumma affinitas C. ſmaragduli at diſtinctus videtur. Antennae virides articulo penultimo apice brunneo, ultimo baſi viridi, tunc albo, demum brunneo. Caput,

thorax, ſcutellum, elytra, alae, pedes vi-
ridia, immaculata. Abdominis margo te-
nuiſſime albidus punctis minutis, atris.

flaueſcens. 116—17. C. flaueſcens antennis rufis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura parua praecedentium. Caput, thorax
elytra, corpus, pedes pallide flaueſcentia
immaculata. Antennae rufae articulo pri-
mo baſi pallido. Abdomen ſubtus linea pun-
ctorum nigrorum.

mactans. 136—7. C. ater antennarum articulo ultimo
thoracis margine ſcutelli puncto baſeos api-
ceque rufis.
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Statura et magnitudo C. geniculati at diſtinctus.
Caput nigrum antennarum ultimo articulo
rufo. Thorax niger linea dorſali obſoleta
margineque rufis. Scutellum nigrum pun-
cto medio baſeos calloſo apiceque rufis. Ely-
tra nigra, immaculata. Abdomen nigrum
margine baſeos rufo. Pedes nigri.

marmoreus. 140—1. C. griſeus thorace ſcutelloque punctis
duobus minutis flauis.
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Magnitudo et ſtatura C. griſei. Corpus fuſco-
griſeum thorace antice punctis duobus minu-
tis flauis, poſtice fuſco fere lineatus. Scu-
tellum punctis duobus minutis, diſtinctis ba-
ſeos. Subtus flaueſcens linea media margi-
nibusque fuſcis et in ſingulo ſegmento albi-

minis utrinque punctum paruum, atrum. Pedes flaueſcentes, fuſco punctati.

3. C. ſupra rufus thorace ſcutelloque punctis duobus aliſque nigris. *oculatus.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Caput rufum antennis nigris. Thorax rufus punctis duobus anticis nigris, flauo cinctis. Scutellum rufum punctis duobus maioribus baſeos nigris. Elytra rufa. Alae nigrae, immaculatae. Abdomen flaueſcens faſciis cyaneis. Pedes rufi tibiis cyaneis.

7. C. glaucus elytris aliſque fuſcis. *glauceſcens.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Medius. Antennae deſunt. Caput, thorax, ſcutellum glauca, immaculata. Elytra fuſca margine glauco. Alae fuſcae. Corpus flaueſcens ſtr[illegible]s abdominis abbreuiatis, nigris. Pedes flaueſcentes.

3. C. niger thorace ſtriga ſcutello punctis duobus abdomine margine ſanguineis. *carnifex.*

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura et magnitudo omnino C. oleracei. Caput nigrum, immaculatum. Thorax niger margine, ſtriga media, quae in medio linea cum margine antico iungitur ſanguineis. Scutellum nigrum punctis duobus ante apicem ſanguineis. Elytra nigra margine baſeos ſanguineo. Corpus atrum abdominis margine ſanguineo.

3. C. niger thorace ſtriga abbreuiata, ſcutello utrinque linea marginali albis. *albipes.*

Habitat in Carolina Dom. Boſc.

Paruus. Corpus nigrum antennarum articulo primo et tertii baſi albis. Thorax punctatus, niger, aeneo parum nitens ſtriga parua media abbreuiata alba. Scutellum punctatum, nigrum utrinque linea baſi ante marginem, apice marginali alba. Elytra punctata, nigra margine baſeos albo. Abdomen nigrum margine albo. Pedes albi.

breuipennis. 174—5. C. ater elytris abbreuiatis, alis albis.

Habitat in India orientali Dom. de Scheſtedt.

Praecedentibus triplo minor et omnino diſtinctus. Corpus totum atrum alis ſolis albis. Elytra breuiſſima.

tricolor. 176—7. C. ater capite flauo, elytris vireſcentibus.

Habitat in India orientali Dom. de Scheſtedt.

Corpus paruum, atrum. Antennae quadriarticulatae, nigrae articulo ultimo flauo. Caput transuerſum, flauum, nitidum oculis magnis, oblongis, prominulis, brunneis. Thorax et ſcutellum nigra, immaculata. Elytra vireſcentia margine poſtico nigro. Alae hyalinae. Abdomen atrum margine tenuiſſime flauo. Pedes flaui.

COREUS. Os roſtro inflexo, capitis apici prominenti inſerto.

Labium elongatum, ſubulatum, incumbens.

Antennae capitis apici inſertae.

C. thorace inermi rufus elytris palleſcentibus apice rufis. *purgator.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura parua C. grauidator. Roſtrum pallidum, baſi rufum, apice fuſcum. Antennae pallidae. Caput et thorax obſcure rufa, inermia. Elytra palleſcentia, apice rufa. Alae fuſcae atomis pallidis. Pedes pallidi femoribus poſticis elongatis, fuſcis annulo albo.

LYGAEUS. Os roſtro inflexo ſub capitis apice inſerto.

Labium elongatum, ſetaceum, acutum.

Antennae ante oculos inſertae.

13. L. thorace ſerrato griſeus elytris litura media atra, femoribus poſticis clauatis dentatis. *Typhaeus.*

Habitat in Carolina Dom. Boſc.

Statura et magnitudo L. clauipes. Antennae nigrae articulo ultimo ouato, craſſiori. Caput griſeum ſpinis quatuor paruis, eleuatis,

acutis, breuibus. Thorax ſerratus, poſtice
ſpinoſus, griſeus, poſtice obſcurior. Elytra
griſea, in medio litura atra. Alae atrae.
Pedes obſcuri tibiis annulo albo. Femora
poſtica valde elongata, clauata dentibus du-
plici ſerie ſerrata, obſcura macula magna
dorſali albida.

laticornis. 14—15. L. thorace ſpinoſo obſcurus elytris flauo
lineatis, antennarum articulo ultimo com-
preſſo baſi albo.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Affinis videtur L. compreſſicorni. Caput fuſ-
cum. Antennae articulo primo et ſecundo
fuſcis, tertio compreſſo apice dilatato, rotun-
dato, baſi albo, apice nigro, quarto elon-
gato, cylindrico, incuruo, baſi albo. Tho-
rax ſpinoſus, fuſcus, immaculatus. Elytra
fuſca, flauo lineata. Alae nigrae. Corpus
obſcure ferrugineum. Pedes inermes tibiis
poſticis compreſſis.

dilatatus. 20—1. L. thorace ſubſpinoſo glaucеſcente: mar-
gine atro tibiis poſticis membranaceis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Antennae nigrae, albo annulatae. Caput glau-
cum. Thorax glaucus margine tenuiſſime
atro. Elytra glauca, fuſco ſtriata. Alae
obſcurae. Corpus flaueſcens. Pedes flaui
femoribus poſticis apice dentatis fuſcis tibiis-
que dilatato membranaceis faſcia lata fuſca.

arcuatus. 21—2. L. thorace ſubſpinoſo oblongus niger tho-
race faſcia rubra femoribus baſi albis: poſti-
cis dentatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino L. auſtralis. Antennae articulo primo nigro ſecundo tertioque ruſis, apice nigris, quarto ruſo. Caput nigrum. Thorax ſubſpinoſus, niger faſcia media arcuata, rubra. Scutellum et elytra nigra, immaculata, obſcura. Subtus fuſcus. Pedes nigri femoribus omnibus baſi albis, poſticis elongatis dentatis, tibiis incuruis apice uniſpinoſis.

29. L. thorace ſpinoſo niger elytris flauis nigro notatis, abdomine ruſo. *haemorrhoidalis.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura praecedentium. Antennae nigrae articulis primo excepto annulo albo. Caput thorax, ſcutellum nigra, immaculata. Elytra flaueſcentia in medio lituris aliquot nigris. Alae atrae. Abdomen ſanguineum. Pedes nigri femoribus poſticis haud incraſſatis at ſubtiliſſime dentatis.

30. L. corpore fuſco flauoque vario, femoribus poſticis elongatis dentatis. *pedeſtris.*

Gerris pedeſtris Ent. ſyſt. 4. 190. 11.

Habitat in India orientali Dr. Koenig.

Praecedentes omnes forte proprii generis.

31. L. thorace acute biſpinoſo oblongus fuſcus femoribus poſticis elongatis dentatis. *fuſcus.*

Habitat in India orientali Dom. Hybner.

Statura et ſumma affinitas L. ſerripedis. Corpus ſupra fuſcum, immaculatum abdomine ſubtus palleſcente macula media atra. Tho-

rax ſpina poſtica acuta et pone hanc altera minor.

Batatas. 31—2. L. thorace ſubſpinoſo obſcurus niger ab- dominis margine eleuato carinato.

Habitat Surinami Dom. Boſc. Cajennae Batatas deſtruens Dom. Richard.

Paullo maior L. cruciger. Caput paruum, fuſ- cum antennis piloſis. Thorax niger margi- ne poſtico prominente, ferrugineo, vix ſpi- noſo. Elytra et alae fuſca. Corpus fuſcum. Pedes ſimplices.

melanoce- phalus. 75—6. L. thorace ruſo: faſcia nigra, elytris ru- fis apice nigris.

Habitat in Gallia Dom. Boſc.

Paruus. Caput cum antennis nigrum, imma- culatum. Thorax rufus faſcia media poſti- ce verſus marginem dilatata. Scutellum ni- grum, immaculatum. Elytra baſi rufa, api- ce nigra, interdum tamen faſcia tantum ely- trorum nigra et apex rufus. Corpus rufum, nigro maculatum. Pedes ruſo fuſcoque varii.

oliuaceus. 87—88. L. oliuaceus capitis thoracisque antico ſanguineis: margine ipſo albo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Nimis affinis L. augur. Antennae nigrae in- terdum annulo albo. Caput ſanguineum. Tho- rax lobo antico ſanguineo: margine albo. Mar- go lateralis ſanguineus, eleuatus. Scutellum et elytra oliuacea, immaculata. Alae atrae. Cor- pus ſanguineo flauoque varium pectore albo maculato, Pedes ſanguinei.

4. L. fuſcus tibiis teſtaceis, femoribus poſticis ſerratis. *tibialis.*
Habitat in India Dom. Hybner.
Statura L. calcarati at paullo minor. Antennae obſcure piceae articulo ultimo nigro. Corpus ſupra fuſcum, ſubtus nigrum tibiis ſolis teſtaceis. Femora poſtica acute dentata.

7. L. ater antennarum ultimo articulo cinereo pubeſcente. *aterrimus.*
Habitat in Gallia Dom. Boſc.
Paullo maior L. Pini at omnino diſtinctus totus ater, nitidus. Antennae nullo modo ſetariae at ultimo articulo cinereo pubeſcente.

10—11. L. thorace cinereo: macula antica atra, elytris cinereis: macula poſtica fuſca. *quadratus.*
Habitat Pariſiis Dom. Boſc.
Statura parua praecedentium. Antennae ferrugineae articulo ultimo fuſco. Caput nigrum. Thorax cinereus macula magna, quadrata, antica, atra margine tamen ipſo tenuiſſime cinereo. Scutellum atrum. Elytra ſtriata, griſea macula ante apicem nigra. Alae albae, nigro ſtriatae. Corpus atrum. Pedes rufi femoribus atris.

14—5. L. ferrugineus thorace elytriſque flauis nigro lineatis. *lineatus.*
Habitat in America boreali Dom. Hirſhell.
Statura omnino L. campeſtris. Caput nigrum antennis ferrugineis. Thorax antice ferrugineus, immaculatus, poſtice flauus lineis

quatuor atris: intermediis latioribus. Scu-
tellum flaueſcens, baſi nigrum. Elytra fla-
ueſcentia vittis duabus atris: exteriore te-
ore, abbreuiata, ante apicem puncto di-
ſtincto terminata. Alae nigrae. Corpus
ferrugineum.

roſeus. 143—4. L. flaueſcens thorace elytrisque roſeis.
Cimex roſeus Mant. Inſ. 2. 204. 144.
Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

neglectus. 150—1. L. niger elytris rufis: ſutura maculaque
marginali nigris.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Statura et magnitudo omnino L. atri. Antennae
capillares videntur. Caput nigrum. Thorax
niger margine poſtico rufo. Elytra rufa ſutu-
ra maculaque parua marginali nigris. Cor-
pus et pedes nigra immaculata.

gramineus. 153—4. L. viridis capite thorace elytrorumque
faſcia apiceque nigris.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Paruus. Antennae mihi deſunt. Caput nigrum.
Thorax ni-
lateribus parum vireſcentibus. Scutel-
ger macula marginali apicis viridi. Elytra vi-
lum viride macula baſeos nigra.
ridia faſcia media punctoque apicis nigris.
Corpus viride.

ERRIS. Os roſtro breui ſubulato.

Labium breuiſſimum, rotundatum.

Antennae filiformes, ante oculos inſertae.

a. G. capite thoraceque ſupra teſtaceis nigro-lineatis, abdomine ſupra fuluo. *fluuiorum.*

Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino G. lacuſtris. Roſtrum inflexum, teſtaceum articulo ultimo nigro. Antennae nigrae. Caput teſtaceum lineis tribus antice coeuntibus, nigris: intermedia antice incraſſata. Thorax teſtaceus linea marginali poſtice coeuntibus nigris, margine tamen ipſo tenuiſſime teſtaceo. Praeterea lineae tres dorſales, nigrae lateribus abbreuiatis. Elytra alaeque fuſca. Abdomen ſupra fuluum, immaculatum, ſubtus pallide flaueſcens utrinque linea laterali, abbreuiata, fuſca. Pedes antici breues, poſtici quatuor elongati, nigri.

6. G. niger thoracis elytrorumque margine albo, elytris abbreuiatis. *foſſularum.*

Cimex foſſularum Roſſ. Fn. Etr. 1354.

Habitat in Italia Muſ. Dom. Boſc.

Statura et magnitudo G. lacuſtris. Antennae quadriarticulatae, nigrae annulis duobus albis, articulo ultimo ferrugineo. Thorax niger margine albo. Corpus griſeum. Pedes griſei femoribus nigris.

REDUVIUS. Os roſtro arcuato. *Antennae* ſupra oculos inſertae.

hirticornis. 11—12. R. rufus elytris alis abdomine pedibusque atris, antennis hirtis nigris.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo R. nigripennis. Antennae hirtae, nigrae. Caput rufum oculis globoſis nigris. Thorax rufus, immaculatus cruce media impreſſa. Scutellum rufum, apice parum emarginatum. Elytra atra, apice [illegible] rufa. Alae atrae. Abdomen atrum ano rufo. Pedes nigri.

flauicans. 12—13. R. flaueſcens capite bituberculato alisque atris.

Habitat Cajennae Dom. Cuvier.

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae deſunt. Caput atrum pone oculos tuberculis duobus eleuatis, obtuſis, nitidis. Thorax et elytra flaueſcentia, immaculata. Alae atrae. Corpus flaueſcens utrinque linea laterali alba.

4notatus. 34—5. R. niger thorace poſtice elytrisque teſtaceis, alis maculis duabus albis.

Habitat in India orientali Muſ. Dom. de Sch[illegible]ſtedt.

Statura praecedentis. Caput cum antennis nigrum. Thorax antice niger, poſtice teſtaceus. Scutellum teſtaceum. Elytra teſtacea. Alae atrae maculis duabus una pone alteram

magnis, albis. Corpus nigrum abdominis margine albo maculato.

7. R. niger elytris abdominis margine pedibusque rufis. *carinatus.*

Habitat in Carolina Muſ. Dom. Boſc.

Magnus. Caput atrum roſtro antennisque fuſcis. Thorax ater, nitidus lineis quinque dorſalibus impreſſis: intermedia abbreuiata. Scutellum nigrum. Elytra rufa. Alae nigrae. Abdomen nigrum margine eleuato, carinato, rufo. Pedes rufi femoribus anticis valde incraſſatis.

9. R. cinereus thorace quadriſpinoſo, abdominis margine ſpinis ciliato. *cinereus.*

Habitat in Carolina Dom. Boſc.

Minus. Caput ſpinis aliquot eleuatis, acutis cinereum. Thorax cinereus ſpinis quatuor acutis in ſtrigam diſpoſitis. Elytra cinerea, immaculata. Alae hyalinae. Abdomen cinereum, margine ſpinis ciliatum. Pedes tenues, inermes, cinerei.

4. R. elongatus ſanguineus capite ſpinis duabus thorace quatuor abdominis margine plurimis. *coronatus.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Corpus tenue, elongatum. Antennae corpore longiores, triarticulatae, filiformes, nigrae capitis apice inſertae. Caput ſanguineum roſtro arcuato ſpinisque duabus eleuatis, validis pone antennas. Thorax ſanguineus

ſpinis quatuor eleuatis, acutis. Elytra ſan-
guinea. Abdomen ſanguineum margine ni-
uato, ſpinis ciliato. Pedes elongati, ru-

apterus. 54—5. R. apterus corpore griſeo, abdomine ni-
gro: margine rufo maculato.
Habitat in Gallia Dom. Boſc.
In Gallia boreali ſemper apterus elytris abbre-
uiatis longitudine dimidii abdominis aliſque
nullis. In Gallia meridionali et alatus inue-
nitur elytris griſeis aliſque albis.

COCCUS. *Roſtrum* vagina ſetaque pe-
ctoralibus.
Antennae filiformes.

Perſicae. 4—5. C. Amygdali Perſicae.
Habitat in Amygdalo Perſica Kiliae.
Corpus medium, ſubrotundum, inaequale,
brunneum.

ceriferus. 26—7. C. corpore cera alba tecto.
Andeſſon Monogr. Madras. 1791.
Pearſon Act. Angl. 1794. Nr. 21.
Habitat in Celaſtro cerifero Indiae orientalis,
ceram albam praebens.
Corpus omnino huius generis cruſta denſiore
aequali e cera albida tectum.

CLASSIS XIII.

ANTLIATA.

OS HAUSTELLO INARTICULATO.

HIRTEA.

proboſcide, hauſtello palpisque.

Proboſcis breuis, exſerta, cylindrica, obtuſa, dorſo canaliculata, ſetam recipiens, apice bilabiata.

Hauſtellum breue, nudum absque vagina.

Seta unica, tenuis longitudine proboſcidis, rigida, ſetacea, acuta, in canalem proboſcidis recondenda.

Palpi duo exſerti, incurui, filiformes, quinquearticulati: articulis ſubaequalibus proboſcide utrinque ad baſin inſerti.

Antennae breues, craſſae: articulo primo longiori, reliquis breuiſſimis, perfoliatis ſupra baſin proboſcidis inſerti.

SICUS.

hauſtello, proboſcide palpisque.

Proboſcis exſerta: ſtipite cylindrico, ſubcorneo, recuruo dorſo canaliculato, capitulo ouato, bilabiato: labiis aequalibus.

Hauſtellum proboſcide dimidio breuior.

Seta unica, rigida, valida, acuta, medio dorſali proboſcidis inſerta, in canalem recondenda.

Vagina fere longitudine ſetae, rigida, obtuſa, ſupra ſetam inſerta.

Palpi duo elongati longitudine proboſcidis, exſerti, filiformes, piloſi, triarticulati: articulis ſubaequalibus.

Antennae breues, approximatae: articulo primo craſſiori cylindrico, ultimo ſubulato.

MULIO.

Os proboſcide, hauſtello palpisque.

Proboſcis exſerta ſtipite cylindrico, corneo, in medio geniculato, dorſo canaliculato, capitulo ouato, bilabiato.

Hauſtellum longitudine proboſcidis in geniculo proboſcidis inſerta in canalem eiusdem recondenda.

Seta unica ſubulata, acuta.

Vagina uniualuis, cornea, obtuſa, ſetam inuoluens.

Palpi duo breuiſſimi, tenues, filiformes, ad baſin hauſtelli inſerti.

Antennae porrectae, cylindricae, vix extrorſum craſſiores, triarticulatae: articulo ultimo baſi ſuperiori ſetigero.

THEREVA.

Os proboſcide, hauſtello palpisque.

Proboſcis intra aperturam orbiculatam oris retracta, cornea, in medio geniculata, rigi-

da apice bilabiata: labiis aequalibus, ouatis, dorſo canaliculata: marginibus eleuatis, carinatis.

Hauſtellum proboſcide breuius, intra canalem latens.

Seta unica, rigida, acuta absque vagina?

Palpi duo proboſcide multo breuiores, piloſi, filiformes inſidentes margine ſquamoſo, membranaceo proboſcidis ante geniculum.

Antennae breues, incumbentes, compreſſae, extrorſum craſſiores, ſetariae.

SARGUS.

Os proboſcide atque hauſtello absque palpis.

Proboſcis breuiſſima, vix exſerta: ſtipite cylindrico, corneo dorſo canaliculato ad receptionem hauſtelli, capitulo bilabiato: labiis aequalibus, rotundatis, conniuentibus.

Hauſtellum breue vix longitudine proboſcidis absque vagina.

Seta unica, breuis, cornea, ſubulata.

Palpi omnino nulli.

Antennae breues, approximatae, triarticulatae: articulo ultimo maiori, compreſſo, ſetigero, inter oculos inſertae.

CEROPLATUS. *Palpi* duo breues, ouati, biarticulati.
Antennae oblongae, compreſſae.

tipuloides. 1. *Ceroplatus.*
Keroplatus tipuloides Boſc. Act. Hiſt. Nat. Pariſ. 1. 42. tab. 7. fig. 3.
Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.
Statura omnino Tipulae. Caput paruum, rotundatum, flaueſcens ſub antennis corniculis duobus eleuatis flauis. Antennae breues, craſſiores, fuſcae. Thorax gibbus, flaueſcens, fuſco lineatus. Abdomen compreſſum, flauum ſegmentorum marginibus nigris. Alae albidae puncto medio ſubmarginali maculaque fuſcis.
Generis character naturalis adhuc deſideratur.

TIPULA. *Hauſtellum* absque vagina.
Palpi duo porrecti, quinquearticulati ad baſin proboſcidis.
Antennae filiformes.

picta. 30—1. T. alis cinereis: annulis maculisque nigris.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura et magnitudo T. ocellaris at diſtincta et alia. Antennae nigrae articulo tertio ferrugineo. Thorax cinereus. Abdomen flaueſcens lineis tribus fuſcis. Alae cinereae

annulis in medio maculisque marginalibus, fuſcis. Pedes teſtacei femoribus annulis duobus fuſcis.

HIRTEA. *Palpi* duo incurui, quinque-articulati.

Antennae breues, craſſae, perfoliatae.

H. nigra glabra alis margine nigricantibus, abdomine fuſco. *breuicornis.*

Tipula breuicornis Ent. ſyſt. 4. 248. 71. Linn. ſyſt. Nat. 2. 976. 42. Fn. Su. 1766.

Tipula flauicanda Degeer Inſ. 6. 529. 35.

Habitat in Europae umbroſis, hortis.

H. alis hyalinis: margine exteriori nigro. *hortulana.*

Tipula hortulana Ent. ſyſt. 4. 248. 72. Linn. ſyſt. Nat. 2. 977. 46.

Geoff. Inſ. 2. 571. 3.

Reaum. Inſ. 5. tab. 7. fig. 7—10.

Tipula Marci Linn. ſyſt. Nat. 2. 976. 38. Fn. Su. 1765.

Hirteae corpus oblongum, villoſum, immarginatum, tardum, capite paruo, exſerto, plano, ore porrecto, cylindrico, oculis magnis, globoſis, lateralibus, prominulis, antennis capite breuioribus, ſupra os inſertis, ſtemmatibus tribus paruis, eleuatis, fere connatis, thorace gibbo, ſcutello vix diſtincto, abdomine ouato, depreſſo, plano, alis duobus magnis, baſi exciſis, incumbentibus, halteribus breuibus, pedibus mediocribus, femoribus anticis compreſſis, validis, tibiis breuibus, ſpina utrinque terminatis: exteriore maiore, tarſis elongatis, quinquearticulatis.

Geoff. Inſ. 2. 570. 2.

Degeer Inſ. 6. 428. 33.

Schaeff. Icon. tab. 15. fig. 1. 2.

Habitat in Aſparagi et Pomonae floribus.

Iohannis. 3. H. nigra glabra alis albis: puncto nigro, pedibus nigris.

Tipula Johannis Ent. ſyſt. 4. 249. 73. Linn. ſyſt. Nat. 2. 976. 41.

Degeer Inſ. 6. 425. 32. tab. 27. fig. 12. 13.

Habitat in Europae umbroſis.

Pomonae. 4. H. glabra nigra alis lacteis: puncto nigro, femoribus ferrugineis.

Tipula Pomonae Ent. ſyſt. 4. 249. 74.

Habitat in Angliae Pomona.

Pyri. 5. H. glabra atra alis hyalinis: puncto marginali nigro, pedibus teſtaceis.

Tipula Pyri Ent. ſyſt. 4. 249. 75.

Habitat in Holſatiae Pomona.

ruficollis. 6. H. glabra atra thorace rufo.

Tipula ruficollis Ent. ſyſt. 4. 249. 76.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Chryſanthemi. 7. H. glabra atra abdomine baſi rufo.

Tipula Chryſanthemi Ent. ſyſt. 4. 249. 77.

Habitat in Chryſanthemo coronario Hiſpaniae D. Vahl.

Thomae. 8. H. glabra atra alis nigris, abdominis lateribus linea crocea.

Tipula Thomae Ent. ſyſt. 4. 250. 78. Linn. ſyſt. Nat. 2. 976. 39.

Schaeff. Icon. tab. 209. fig. 6. 7.

Habitat Upſaliae.

H. oblonga hirta atra alis coſta nigricante. *febrilis.*
Tipula febrilis Ent. ſyſt. 4. 250. 79. Linn. ſyſt. Nat. 2. 976. 44. Fn. Su. 1768.
Geoff. Inſ. 2. 576. 2.
Goed. Inſ. 1. tab. 6.
Petiv. Gaz. tab. 14. fig. 4.
Habitat in Europae locis ſuffocatis.

H. hirta atra pedibus ferrugineis: poſticis elongatis. *brunnipes.*
Tipula brunnipes Ent. ſyſt. 4. 250. 80.
Habitat in Americae Inſulis Muſ. Dom. Banks.

H. abdomine cylindrico atro, alis fuſco hyalinis, ano appendiculato. *forcipata.*
Tipula forcipata Ent. ſyſt. 4. 250. 81.
Habitat in Anglia.

H. glabra atra nitida alis albis. *albipennis.*
Tipula albipennis Ent. ſyſt. 4. 250. 82.
Habitat Hafniae Dom. Lund.

H. cinerea alis albis: margine villoſo. *juniperina.*
Tipula juniperina Ent. ſyſt. 4. 251. 83. Linn. ſyſt. Nat. 2. 977. 51. Fn. Su. 1774.
Degeer Inſ. 6. 404. 26. tab. 25. fig. 7—13.
Habitat in Iuniperi Triglochide, quam cauſſat.

ANTHRAX. Os hauſtello absque proboſcide.

Palpi duo piloſi baſi hauſtelli inſerti.

Antennae diſtantes: articulo ultimo ſetaceo.

Titanus. 18—19. A. hirta fuſca abdomine atro: ſegmentorum marginibus flauis, alis nebuloſis.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Statura A. Sabaei at diſtincta et alia. Caput et thorax hirta, fuſca, immaculata. Abdomen atrum ſegmentorum marginibus flauis. Alae nebuloſae. Pedes flaueſcentes.

Syphax. 10—11. A. hirta fuſca alis hyalinis baſi fuſcis.
Habitat in Barbaria Dom. de Rehbinder.
Statura omnino praecedentium tota hirta fuſca immaculata. Alae hyalinae baſi fuſcae.

SICUS. Hauſtellum ſeta unica vaginaque uniualui.

Palpi elongati, filiformes.

Antennae approximatae, breues.

teſtacea. 1. S. teſtaceus abdominis primo ſegmento fuſco.
Stratiomys teſtaceus Ent. ſyſt. 4. 262. 1.
Habitat in America meridionali.

Sicus corpus mediocre, ouatum, planum villoſum, immarginatum, agile, capite paruo, exſerto, ... dato, oculis magnis, oblongis, fere connatis, ... nis breuibus, approximatis, ſtemmatibus tribus ... proximatis, verticalibus, thorace ouato, ſcutello ...

testaceus abdomine utrinque maculis dua- *ferruginea.*
bus flauis.
Stratiomys macroleon Panz. Fn. Germ. 9. tab. 20.
Tabanus bidentatus Ent. ſyſt. 4. 372. 40.
Habitat in Auſtria.

8. fuſcus abdomine teſtaceo. *bicolor.*
Tabanus biſpinoſus Ent. ſyſt. 4. 372. 41.
Habitat in Germania.

9. fuſcus abdomine atro: ſegmento ſecundo *errans.*
tertioque lateribus albis.
Stratiomys errans Ent. ſyſt. 4. 263. 2.
Habitat — — —

9. fuſcus aureo pubeſcens abdomine atro: ma- *Crucis.*
culis duabus lateralibus apiceque flauis.
Stratiomys Crucis Ent. ſyſt. 4. 264. 7.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom.
Lund.

STRATIOMYS. *Hauſtellum* ſeta unica
absque vagina.
Palpi breues, capitati.
Antennae acuminatae,
baſi connatae.

10. St. ſcutello bidentato nigra pedibus flauis. *flauipes.*
Habitat Algiriae Dom. de Rehbinder.
Statura et magnitudo omnino St. microleon at
tota nigra immaculata pedibus ſolis flauis.

ſcutello, rotundato, biſpinoſo, alis duabus incumbenti-
bus, abdomine longioribus halteribus capitulo oblon-
go ſquamaque breuiore, rotundata, pedibus mediocri-
bus, curſoriis.

villoſa. 26. St. ſcutello mutico nigra cinereo hirta abdo-
minis ſegmentis margine laterali albo.
Nemotelus villoſus Ent. ſyſt. 4. 270. 2.
Habitat in Hungaria Muſ. Dom. Boſc.

RHAGIO. *Hauſtellum* ſetis tribus ab-
que vagina.
Palpi duo baſi ſetarum ex-
riorum inſertae.
Antennae filiformes.

Ibis. 3—4. R. niger thorace ſublineato, abdomine fe-
rugineo trifariam nigro punctato: apice ni-
gro alis variegatis.
Habitat in Italia Dom. Allioni.
Praecedentibus minor. Thorax niger lineis qua-
tuor albidis lineatus. Abdomen ferrugine-
um linea dorſali punctorum nigrorum et alia
utrinque laterali. Anus niger. Alae fu-
alboque variae. Pedes nigri.

nebuloſus. 10—11. R. niger abdomine flaueſcente nigro faſ-
ciato, alis nebuloſis: macula coſtali atra.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Statura et magnitudo omnino R. bicolor. Caput
et thorax nigra, immaculata. Scutellum te-
ſtaceum. Abdomen conicum, flaueſcens an-
nulis plurimis nigris. Alae nebuloſae ma-
cula magna coſtali, nigra. Pedes flaueſ-
centes.

ERIA. *Hauſtellum* uniualue: ſeta unica.

Palpi duo capitati, proboſcidis medio inſerti.

Antennae clauato acuminatae, petiolo communi medio frontis inſertae.

abdomine atro: ſegmentis tribus margine flauis. *clauicornis.*

... *clauicornis* Ent. ſyſt. 4. 277. 1.

Habitat in Barbaria.

... antennis ſetariis abdomine rufo: ano nigro. *abdominalis.*

...phus *abdominalis* Ent. ſyſt. 4. 307. 108.

Habitat in Gallia Dom. Boſc.

Differt a praecedente antennis ſeta niuea.

...LIO. *Hauſtellum* ſeta unica vagina uniualui.

Palpi breuiſſimi, filiformes.

Antennae porrectae, cylindricae, ſetigerae.

... niger thoracis lateribus punctis abdomine que cingulis duobus flauis. *bicinctus.*

...phus *bicinctus* Ent. ſyſt. 4. 293. 54.

...Mulio corpus medium, ouatum, immarginatum, agi...le, capite magno, exſerto, transuerſo, oculis magnis, lateralibus, oblongis, ſuperne conniuentibus, antennis porrectis, cylindricis, capite longioribus tuberculo capitis inter oculos inſertis, thorace ouato, gibbo, ſcutello magno, rotundato, inermi, abdomine ouato,

Muſca bicincta Linn. ſyſt. Nat. 2. 985. 38. Fn.
Su. 1805.
Degeer Inſ. 6. 126. tab. 7. fig. 16.
Habitat in Europae floribus.

arcuatus. 2. M. niger thórace maculis lateralibus, abdomine cingulis quatuor arcuàtis flauis.
Syrphus arcuatus Ent. ſyſt. 4. 293. 55.
Muſca arcuata Linn. ſyſt. Nat. 2. 985. 39. Fn.
Su. 1806.
Geoff. Inſ. 2. 506. 28.
Degeer Inſ. 6. 125. 14. tab. 7. fig. 14.
Panz. Fn. Germ. 2. tab. 10.
Habitat in Europae floribus.

mutabilis. 3. M. tomentoſus thorace inmaculato, abdomine nigro griſeoque mutabili.
Syrphus mutabilis Ent. ſyſt. 4. 294. 59.
Muſca mutabilis Linn. ſyſt. Nat. 2. 985. 40. Fn.
Su. 1807.
Habitat in Europae pratis.

devius. 4. M. tomentoſus thorace coeruleſcente, abdomine obſcure violaceo.
Syrphus devius Ent. ſyſt. 4. 294. 60.
Muſca devia Linn. ſyſt. Nat. 2. 985. 41. Fn. Su.
1808.
Habitat in Europa, Anglia.

dentipes. 5. M. nudus thorace quadrilineato, abdomine clauato, femoribus poſticis incraſſatis dentatis

ſupra conuexo, ſubtus concauo, ano obtuſo, alis ... nis, ouatis, abdomine longioribus, baſi excilis, ... teribus elongatis: capitulo ouato, nudis, pedibus ... ſoriis.

Syrphus *dentipes* Ent. ſyſt. 4. 297. 68.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

M. nudus niger thorace lineis lateralibus, abdomine faſciis tribus flauis. *conopſeus.*
Syrphus *conopſeus* Ent. ſyſt. 4. 297. 69.
Muſca *conopſoides* Linn. ſyſt. Nat. 2. 982. 21.
Fn. Su. 1790.
Schaeff. Inſ. 4. tab. 33. fig. 12. 13.
Habitat in Europae floribus.

M. niger fronte thoracis poſtico pedibusque ferrugineis. *ichneumoneus.*
Syrphus *ichneumoneus* Ent. ſyſt. 4. 297. 70.
Muſca *ichneumonea* Linn. ſyſt. Nat. 2. 986. 42.
Fn. Su. 1809.
Habitat in Europae floribus.

M. ater abdomine rufo baſi apiceque atro. *bicolor.*
Syrphus *bicolor* Ent. ſyſt. 4. 297. 71.
Habitat in Barbariae floribus Dom. Desfontaines.

M. niger pedibus rufis. *ſphegeus.*
Syrphus *ſphegeus* Ent. ſyſt. 4. 298. 72.
Habitat in Angliae floribus Dom. Banks.

THEREVA. *Proboſcis* cornea: late-
bus reflexis, carin...
Palpi duo filiformes, ...
ſi, ſquamae membra...
ceae ante genicul...
proboſcidis inſertae.
Antennae breues compr...
ſae, incumbentes.

ſubcoleoptrata. 1. T. thorace nigro, alis cinereis: vittis duabus
fuſcis repandis.
Syrphus ſubcoleoptratus Ent. ſyſt. 4. 283. 21.
Conops ſubcoleoptratus Linn. ſyſt. Nat. 2.
1006. 13.
Habitat in Europa boreali Dom. Boſc.

hemiptera. 2. T. thoracis limbo ferrugineo, alis cinereis fuſ-
co flaueſcentique variis.
Syrphus hemipterus Ent. ſyſt. 4. 284. 22.
Schaeff. Icon. tab. 71. fig. 6.
Habitat in Angliae nemoribus.

craſſipennis. 3. T. thorace flaueſcente, alis diſco albido: pun-
ᴄto diſtincto nigro.
Syrphus craſſipennis Ent. ſyſt. 4. 284. 23.
Habitat Pariſiis Dom. Boſc.

Thereuae corpus medium, craſſum, obeſum, ou...tum, immarginatum, tardum, capite magno, exſerto, transuerſo, oculis magnis, oblongis verticalibus, ... matibus minutis, vix conſpicuis, antennis paruis ... ſtantibus medio frontis inſertis, thorace ouato, pla... lateribus piloſis, abdomine magno, depreſſo, pl... ano obtuſiſſimo, alis duabus, craſſis, macularis, op... cis, abdomine paullo longioribus, ſquama halterum magna, rotundata, ciliata, pedibus curſoriis.

T. thoracis lateribus fuluis, abdomine atro: *affinis.*
lateribus teſtaceis.
Syrphus affinis Ent. ſyſt. 4. 284. 24.
Habitat in Gallia Dom. Boſc.

T. fuſca abdominis lateribus baſi fuluis, ano *analis.*
albido.
Habitat in Gallia Dom. Boſç.
Statura praecedentium at triplo minor. Antennae incumbentes ſeta nuda. Os album. Thorax piloſus, fuſcus. Abdomen nigrum, baſi fuluum linea dorſali tamen nigra ano ſiue ultimo ſegmento albo. Pedes nigri femoribus baſi ferrugineis. Alae albae macula magna fuſca.

T. atra abdomine cinereo nitidulo, alis ob- *obeſa.*
ſcuris.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Parua. Caput nigrum fronte albida. Thorax piloſus, niger, immaculatus. Abdomen nigrum certo ſitu cinereo nitidulum. Alae obſcurae. Pedes nigri.

SYRPHUS. *Hauſtellum* ſetis quatuor absque vagina.
Palpi duo baſi ſetarum exteriorum inſerti.
Antennae breues, compreſſae, incumbentes.

18. S. antennis ſetariis nudiuſculus niger fe- *megacephalus.*
moribus rufis, alis baſi atris.
Habitat in India orientali Muſ. D. de Seheſtedt.
Magnus. Caput grande, orbiculatum oculis magnis, aeneo nitidulis. Antennae breues articulo ultimo compreſſo ſeta nuda. Thorax et abdomen nudiuſcula, nigra. Alae

hyalinae, baſi atrae lobo erecto auctae, in medio linea transuerſa ad marginem craſſiorem atra. Pedes nigri femoribus rufis, anticis quatuor tibiis albis, poſticis tibiis baſi albis annulo rufo.

vinctorum. 27—8. S. antennis ſetariis tomentoſus cinereus, abdomine pallide ferrugineo: ſegmentis ante marginem nigris.

Habitat in Americae Inſulis Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo omnino S. arbuſtorum. Caput cinereo tomentoſum antennis flauis. Thorax tomentoſus, cinereus ſtriga falcis- que media abbreuiata nigris. Scutellum magnum, ferrugineum. Abdomen ferrugineum, ſegmentis ante marginem nigris margine ip- ſo pallido. Alae hyalinae. Pedes ferruginei.

micans. 63—4. S. antennis ſetariis tomentoſus niger abdomine cinereo villoſo utrinque lunulis tri- bus albis.

Habitat in Europa auſtraliori.

Statura omnino S. voluuli. Caput nigrum antennis ſetariis, flauis. Thorax tomentoſus, niger. Abdomen ouatum cinereo villoſum utrinque lunulis tribus albis. Pedes nigri femoribus poſticis craſſioribus.

ambulans. 63—4. S. antennis ſetariis nudus thorace nigro aeneo, abdomine rufo: ano nigro, pedibus ſimplicibus nigris.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino S. ſegnis at duplo fere minor. Caput atrum, nitidum, immaculatum. Thorax nigro aeneus. Abdomen rufum ano nigro. Alae hyalinae. Pedes ſimplices, nigri.

means. 63—4. S. antennis ſetariis ſubtomentoſus niger antennarum claua tibiarumque baſi teſtaceis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura praecedentium: Caput atrum, nitidum tuberculo eleuato ſupra os. Antennae nigrae claua compreſſa, teſtacea. Thorax ſubtomentoſus, nigro aeneus. Abdomen atrum, immaculatum. Alae hyalinae. Pedes nigri tibiis baſi teſtaceis.

6. S. antennis ſetariis niger abdomine rufo: linea dorſali nigra lineisque obliquis lateralibus albis. *tricolor.*

Habitat in Heluetia.

Statura praecedentis. Antennae breues, compreſſae, ſetariae, nigrae. Thorax nudus, niger, immaculatus. Scutellum nigrum. Abdomen ouatum, rufum linea dorſali nigra. Lineae praeterea tres utrinque obliquae albae.

6. S. antennis ſetariis nudus thorace nigro viridique lineato, abdomine ferrugineo: ſegmento ſecundo margine atro. *floralis.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Paruus. Caput cum antennis flauum oculis nigris. Thorax lineis nigris viridibusque alternis. Scutellum nigrum margine vireſcente. Abdomen elongatum, planum, ferrugineum: ſegmento ſecundo margine nigro. Alae hyalinae. Pedes flaui femoribus tibiisque faſcia fuſca.

MUSCA. *Hauſtellum* ſeta unica absque vagina.

Palpi duo porrecti extrorſum craſſiores.

Antennae breues, clauatae, ſeta inſtructae.

3. M. antennis ſetariis, thorace ſublineato, abdomine atro aeneo, alarum coſta nigra: puncto nigro. *ſtigma.*

Habitat in Americae Inſulis Dom. Lund.
Parua. Antennae fuſcae ſeta nuda. Caput thorax nigra lineolis albis numeroſis ſubli-neata. Scutellum atrum. Abdomen aeneum ano inprimis aeneo. Alae albae punctis quinque fuſcis coſtaque fuſca puncto di-ſtincto hyalino.

demandata. 94—5. M. antennis ſetariis viridi aenea abdomine atro nitido.
Habitat Kiliae.
Statura parua praecedentium. Caput nigrum, vi-rarius obſcure rufum. Thorax piloſus, viridi aeneus. Abdomen atrum, nitidum. Alae albo hyalinae. Pedes atri.

laſciua. 111—12. M. antennis ſetariis nigra alis apice fuſcis: macula ſtrigaque ſemicirculari albis.
Habitat Cajennae Dom. Richard.
Statura et ſumma affinitas M. annulatae. Corpus nigrum, immaculatum. Abdomen ano inflexo, conico. Alae baſi hyalinae, apice nigrae macula transuerſa et poſtice ſtriga ſemicirculari hyalinis. Pedes elongati, nigri antici ante apicem albi, poſtici quatuor annulo paruo albo.

bicolor. 122—3. M. antennis ſetariis teſtacea abdomine conico atro.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Statura M. ungulatae. Caput et thorax teſtacea, immaculata. Abdomen conicum, acutum, atrum, nitidum. Alae hyalinae.

diaphana. 126—7. M. antennis ſetariis, thorace aeneo, abdomine cinereo: ſegmento primo ſecundoque lateribus diaphanis.
Muſca diaphana Mant. Inſ. 2. 349. 82.
Habitat in Europa.

45—6. M. antennis ſetariis piloſa cinerea alis reticulatis, fronte fulua, thorace fuſco punctato. *Chaerophylli.*
Habitat in Europae floribus.
Statura et magnitudo M. reticulatae. Antennae rufae. Caput cinereum ore albo fronteque fulua linea media atra. Thorax cinereus punctis ſparſis fuſcis. Scutellum cinereum puncto medio fuſco. Abdomen cinereum linea dorſali e punctis nigris. Pedes cinerei. Alae albo nigroque reticulatae.

48—9. M. antennis ſetariis fronte plana flaueſcente: linea media ferruginea. *planifrons.*
Habitat Pariſiis Dom. Boſc.
Affinis M. umbraculatae et forte proprii generis. Antennae magnae, cylindricae, obſcurae ſeta albida, ſub fronte prominula inſertae. Caput magnum, planum, flauum linea longitudinali, ferruginea. Oculi laterales, ouati. Thorax obſcurus, flauo ſublineatus. Abdomen elongatum, planum, obſcurum interdum linea longitudinali baſeos ferruginea. Pedes flaui. Alae albidae.

56—7. M. antennis ſetariis flaueſcens alis albo flaueſcentique variis. *flaueſcens.*
Habitat Tanger Dom. Lund.
Corpus medium totum flaueſcens abdominis dorſo paullo obſcuriore. Alae albo flauoque variegatae.

57—8. M. antennis ſetariis cinerea capite pedibusque flauis, alis albis: macula ante apicem radiata atra. *radiata.*
Habitat Pariſiis.
Parua. Caput cum antennis flaueſcens. Thorax et abdomen piloſa, cinerea ano atro. Pedes flaueſcentes. Alae alb e macula magna ante apicem, radios plures exſerente atra. Lineola parua transuerſa atra ante maculam.

SARGUS. Os proboſcide atque hau-
ſtello.
Palpi nulli.
Antennae breues, approxi-
matae: articulo ultimo
compreſſo.

cuprarius. 1. S. glauco aeneus thorace viridi abdomine ob-
longo cupreo.
Muſca cupraria Ent. ſyſt. 4. 335. 96. Linn. ſyſt.
Nat. 2. 994. 92. Fn. Su. 1853.
Geoff. Inſ. 2. 525. 61.
Reaum. Inſ. 4. tab. 22. fig. 7. 8.
Degeer Inſ. 6. 200. 16. tab. 12. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 209. fig. 32?
Habitat in Europae floribus.

auratus. 2. S. nitidus thorace aeneo, abdomine obtuſo
aureo.
Muſca aurata Ent. ſyſt. 4. 335. 97.
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

aeneus. 3. S. viridi aeneus nitidus capite pedibusque te-
ſtaceis.
Muſca aenea Ent. ſyſt. 4. 335. 98.
Habitat in India orientali Dom. Lund.

politus. 4. S. nitidus thorace coeruleo, abdomine aeneo.
Muſca polita Ent. ſyſt. 4. 335. 99. Linn. ſyſt.
Nat. 2. 894. 93. Fn. Su. 854.
Degeer Inſ. 6. 202. 18.
Habitat in Europae floribus.

Sargi corpus paruum, oblongum, glabrum, depreſſum, immarginatum, agile, capite exſerto, rotundato, oculis maximis, fere coeuntibus, antennis breuibus approximatis, inter oculos inſertis, thorace ouato, ſcutello magno, rotundato, abdomine elongato, depreſſo, obtuſo, alis duabus abdomine longioribus, ... exciſis, hyalinis, halteribus porrectis, nudis claua compreſſa, truncata, pedibus tenuibus, curſoriis, colore aeneo, nitido.

S. ater nitidus ſcutello pedibusque flauis. *ſcutellatus.*
Habitat Kiliae.
Statura praecedentium at minor. Caput atrum fronte antennisque flauis. Thorax niger, ſublineatus ſcutello flauo. Abdomen elongatum, atrum dorſo plano. Pedes flaui. Alae hyalinae.

TABANUS. *Hauſtellum* vagina uniualui ſetisque quinque.
Palpi duo clauati, acuminati.
Antennae emarginato acuminatae.

5. T. abdominis primo ſegmento pallido: lunula nigra, alis albis: faſcia atra. *diſpar.*
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Statura et magnitudo praecedentium. Antennae teſtaceae, apice fuſcae. Caput ſub antennis flauum maculis duabus magnis, eleuatis, ouatis, teſtaceis, pone antennas pallidum macula magna, transuerſa, eleuata, atra. Thorax cinereus lateribus flauis. Abdomen fuſcum ſegmento primo pallido: macula media lunata, fuſca. Alae albae coſta faſciaque media lata nigris et in hac faſcia ad marginem tenuiorem macula ouata, alba.
Mas oculis connatis, abdomine teſtaceo: primo ſegmento tamen pallido, lunula fuſca.

5. T. fuſcus thorace albo lineato, abdomine punctato, alis faſcia abbreuiata nigra. *triſtis.*
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Statura praecedentium. Antennae teſtaceae, apice nigrae. Caput nigrum. Thorax fuſcus, albo lineatus. Abdomen fuſcum lineis

quinque punctorum alborum. Alae albae costa faſciaque, marginem tenuiorem haud attingente nigris.

STOMOXYS. *Hauſtellum* vagina uniualui, conuoluta, baſi geniculata ſetisque duobus vaginantibus.
Antennae ſetariae.

bombylans. 5—6. S. piloſa cinerea, abdomine pallido: faſciis tribus atris.
Habitat — — Muſ. Dom. Boſc.
Magna in hoc genere. Antennae incumbentes, craſſiores, ferrugineae. Caput pallidum atomis ferrugineis. Thorax piloſus griſeus, immaculatus. Abdomen valde piloſum faſciis tribus nigris: poſteriore maiore. Alae obſcurae, baſi ferrugineae. Pedes ferruginei.

EMPIS. Os hauſtello et proboſcide inflexis.
Hauſtellum vagina uniualui.
Palpi breues, filiformes.
Antennae ſetariae.

femorata. 10—11. E. nudiuſcula cinerea thorace lineato femoribus poſticis incraſſatis nigris apice teſtaceis.
Habitat Pariſiis Dom. Boſc.
Statura et magnitudo praecedentium. Caput paruum obſcurum roſtro teſtaceo. Thorax cinereus, lineatus. Abdomen mox magis cinereum, mox magis obſcurum pube maris exſerto, reflexo, compreſſo. Alae albae immaculatae. Pedes ferruginei femoribus poſticis incraſſatis, nigris, apice teſtaceis.

MBYLIUS. *Hauſtellum* longiſſimum, rectum, ſetaceum, biualue.
Palpi duo piloſi.
Antennae ſubulatae, baſi connatae.

3. B. alis dimidiato nigris aequalibus hirtus albus, thorace lineis tribus fuſcis micantibus. ***micans.***
itat in Africa Dom. Dymeril.
llo maior B. medio. Corpus totum hirſutiſſimum, album thoracis dorſo lineis tribus latis, fuſcis, micantibus. Alae albae, dimidiato fuſcae et in hac parte lineola parua baſeos alba. Pedes teſtacei.

4. B. alis punctatis baſi fuſcis, antennis compreſſo acuminatis. ***planicornis.***
bitat in Germania.
rpus medium, hirtum. Roſtrum porrectum, nigrum. Antennae ultimo articulo valde compreſſo, acuminato. Thorax flaueſcens, poſtice fuſcus. Abdomen fuſcum punctis duobus poſticis albis. Alae fuſco punctatae baſique fuſcae.

4. B. alis albis baſi fuſcis hirtus cinereus abdomine cruce niuea, antennis acuminatis. ***cruciatus.***
bitat Monſpeliae Muſ. Dom. Boſc.
tura praecedentium. Antennae approximatae, nigrae: articulo ultimo cylindrico apice acumine ſubulato. Roſtrum longitudine corporis. Thorax hirtus, cinereus, antice pilis aliquot rufis. Alae albidae, baſi fuſceſcentes. Abdomen hirtum, cinereum poſtice linea dorſali ſtrigiſque duabus albis. Pedes obſcuri.

VOLUCCELLA. *Hauſtellum* elongatum rectum, biualue.
Palpi nulli.
Antennae approximatae articulo ultimo craſſiori, cylindrico.

atrata. 1—2. V. villoſa atra alis albis immaculatis.
Habitat in Marocco Dom. Schousboe.
Corpus praecedente multo minus, totum pi loſum, atrum, immaculatum. Halteres flaui. Alae albae, immaculatae.

PYCNOGONUM. *Hauſtellum* tubuloſum conicum absque ſe tis.
Palpi ad baſin hauſtelli.

Ceti. 2. P. corpore ouato, pedibus quarti quintique pa ris linearibus muticis.
Cymothoa Ceti Ent. ſyſt. 2. 509. 21.
Oniſcus Ceti Linn. ſyſt. Nat. 2. 1060. 6. Fn. Su. 2056.
Martens Spitzb. tab. 8. fig. D.
Degeer Inſ. 7. 541. 6. tab. 42. fig. 6. 7.
Seb. Muſ. 1. tab. 90. fig. 5.
Pall. ſpicil. Zool. 9. 76. tab. 4. fig. 14.
Habitat in Oceani borealis Balaenis.

PEDICULUS. *Hauſtellum* retractile, re curuum.
Antennae ſubulatae.

Lanii. 15—6. P. abdomine ouato griſeo: margine utrin que ſtrigis octo nigris.
Habitat in Lanio Collurio Dom. Cuvier.
Corpus medium, ouatum. Caput cordatum antice truncatum, obſcurum. Thorax

tice anguſtatus, poſtice obtuſé angulatus. Abdomen ouatum pilis longis, raris, luteis griſeum margine utrinque ſtrigis nigris octo.

1. P. ouatus albidus abdominis medio nigro, thorace antice anguſtato. *Pici.*

Habitat in Pico viridi Dom. Cuvier.

Medius. Caput triangulare: angulo antico acutiuſculo, poſticis rotundatis. Antennae lineares. Thorax albidus, antice anguſtatus, poſtice obtuſe angulatus. Abdomen conuexum, albidum: medio nigro ſegmentis octo; ultimo integro. Pedes breues, pallidi femoribus ouatis, compreſſis.

4. P. elongatus albidus: margine nigro, capite luteſcente. *Anatis.*

Habitat in Anate Boshas Dom. Cuvier.

Corpus medium, elongatum, fere filiforme. Caput ouatum, obtuſum. Thorax cylindricus, utrinque unidentatus. Abdomen ſegmentis octo: ultimo bifido.

7. P. elongatus filiformis flaueſcens: linea laterali atra. *Tantali.*

Habitat in Tantalo leucocephalo D. Daldorff.

Corpus valde elongatum, pallide teſtaceum. Caput triangulare, poſtice latius oculis nigris antennisque longitudine capitis. Abdomen filiforme, planum linea laterali atra.

ACARUS. *Hauſtellum* vagina cylindrica, biualui.
Palpi duo longitudine hauſtelli.
Antennae filiformes.

5. A. ſubrotundus, planus ater albo maculatus maculaque dorſali cyanea biloba. *hiſtrio.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.
Maior A. hiſpano. Antennae breues, craſſi[illegible]
compreſſae, obtuſae utrinque ſetis duabus
elongatis, erectis baſi inſertis, niueis. Ca-
put ſub antennis incraſſatum, veſiculoſ[illegible]
flaueſcens roſtro breui, prominulo. Corpus
depreſſum, planum, ſubrotundum, atrum,
antice maculis quinque albis 3. 2. et poſtice
utrinque quatuor marginalibus. In medio
dorſo macula magna cyanea, poſtice biloba.
Pedes octo brunnei, albo annulati.

variegatus. 7—8. A. obouatus niger antice macula triloba albida poſtice macula biloba ferruginea.

Habitat in Africa Dom. Dumeril.
Statura et magnitudo A. aegyptii. Antennae breues, extrorſum craſſiores. Roſtrum porrectum, cylindricum, obtuſum. Corpus planum, ſupra nigrum antice macula magna trifida, pallida et poſtice macula maiori, biloba, ramum utrinque antice emittente ferruginea. Margo incraſſatus, ſtriatus inciſuris albis. Pedes brunnei geniculis albis.

INDEX ALPHABETICUS

IN

J. C. FABRICII

SUPPLEMENTUM

ENTOMOLOGIAE SYSTEMATICAE,

ORDINES, GENERA ET SPECIES

CONTINENS.

HAFNIAE 1799.

APUD PROFT ET STORCH,

Indici alphabetico Supplementi haec tantum praemonenda ſunt, ordines et genera aſteriſco (*) praepoſita notata, nova et ex eis ordinibus aut generibus compoſita eſſe, quorum nomina uncinis incluſa addita vides; e. c. Genus

* DELPHAX

[Cicada Ent.]

novum et e Cicadis Entomologiae ortum eſt.

Nomina ſpecifica litteris ſic dictis curſivis expreſſa eas ſpecies ſignificant, quae in Entomologia iam occurrunt et hic aut repetita aut ad aliud genus transſcripta ſunt, quod priſtini generis adiectum nomen prodit. Sic *Tinea umbellella* olim Pyralidibus annumerabatur, nunc Tinearum genus ſubiit.

ORDINES.

Ord. 13. ANTHLIATA. - - pag. 547

— 1. ELEUTHERATA. - - — 1

— 10. * EXOCHNATA. [Agonata Ent.] — 372

— 11. GLOSSATA. - - — 419

— 9. * KLEISTAGNATA. [Agonata Ent.] - - - — 307

— 6. MITOSATA. - - — 288

— 5. ODONATA. - - - — 283

— 4. PIEZATA. - - - — 209

— 8. * POLYGONATA. [Agonata Ent.] - - - — 296

— 12. RHYNGOTA. - - - — 511

— 3. SYNISTATA. - - — 197

— 2. ULONATA. - - - — 183

— 7. UNOGATA. - - - — 290

ACANTHIA. pag. 526.

hiſteroides. 24 — 5.
membranacea. 21 — 2.
varia. 26 — 7.

ACARUS. pag. 571 — 572.

hiſtrio. 4 — 5.
variegatus. 7 — 8.

ACHETA. pag. 191 — 192.

aquea. 14 — 5.
Foſſor. 1 — 2.
maculata. 13 — 4.

AESCHNA. pag. 285 — 286.

annulata. 4 — 5.
Heros. 1 — 2.

AGRION. pag. 286 — 287.

Americana. 3 — 4.
Barbara. 2 — 3.
Coromandeliana. 3 — 4.

* ALBUNEA. pag. 397 — 398.

[Hippa Ent.]

dentata. 5.
dorſipes. 3.
ſcabra. 4.
ſcutellata. 2.
Symmiſta. 1.

* ALPHEUS. pag. 404 - 406.

[Aſtacus Ent.]

avarus. 1.
Malabaricus. 4.
rapax. 3.
Tamulus. 2.

ALUCITA. pag. 502 - 505.

calthella. 11.
cuprella. 14.
Degeerella. 8.
Erxlebella. 12.
faſciella. 15.
Friſchella. 10.
Latreillella. 2.
Panzerella. 5.
pilella. 6.
promulella. 13.
Reaumurella. 1.
Robertella. 7.
Sparmannella. [Tinea Ent.] 16.
Sulzella. 9.
Swammerdammella. 3.
vindella. 4.

ANDRENA. pag. 272.

griſea. 4 — 5.

ANTHRAX. pag. 554.

Syphax. 10 — 11.
Titanus. 18 — 19.

ANTHRENUS. pag. 76.

Glorioſae. 4 — 5.
maculatus. 6 — 7.

ANTHRIBUS. pag. 160 - 161.

longicornis. 1.
niveiroſtris. 3 — 4.
pubeſcens. 8 — 9.
Roboris. 4 — 5.

APATE. pag. 156 - 157.

bidens. 10 - 11.
Fagi. 16.
Gonagra. 6 - 7.
Tiliae. 17.

APIS. pag. 273 - 277.

aenea. 121 – 2.
alata. 43 – 4.
aprica. 29 – 30.
atrata. 83 – 4.
Caiennenſis. 13 – 14.
calloſa. 122 – 3.
carbonaria. 59 – 60.
favoſa. 82 – 3.
feneſtrata. 3 – 4.
fervida. 43 – 4.
flavicornis. 111 – 12.
griſea. 101 – 2.
Indica. 59 – 60.
Marylandica. 20 – 1.
muraria. 50 – 1.
nidulans. 33 – 4.
pallens. 110 – 1.
parvula. 123 – 4.
4 - cincta. 119 – 20.
ſeladonia. 120 – 1.

ARANEA. pag. 291 - 293.

bicolor. 10 – 11.
efuriens. 28 – 9.
geminata. 38 – 9.
nobilis. 4 – 5.
pallens. 1 – 2.
parallela. 73 – 4.
rapax. 33 – 4.

ASCALAPHUS. pag. 207.

Surinamenſis. 4 – 5.

ASTACUS. pag. 406 - 408.

Fam. 1. Chelis ſex. pag. 406 – 407.
Fam. 2. Chelis quatuor. pag. 407 – 408.
Bartonii. 3.
coerulescens. 7.
fluviatilis. 2.
? *fulgens.* 8.

fulvus. 6.
marinus. 1.
Noruegicus. 4.
ſcaber. 5.

ATTELABUS. pag. 162 - 164.

coeruleus. 22 – 3.
dentipes. 7 – 8.
formicarius. 13 – 14.
nigriroſtris. 26 – 7.
Pomonae. 27 – 8.
Tranquebaricus. 6 – 7.

* BANCHUS. pag. 233 - 235.

[Ichneumon Ent.]

compreſſus. 5.
falcatorius. 8.
Fornicator. 3.
Haſtator. 2.
Hiſtrio. 9.
pictus. 7.
Variegator. 4.
varius. 6.
Venator. 1.

BEMBEX. pag. 259 - 260.

labiata. 5 – 6.
ſpinoſa. 9 – 10.

BLAPS. pag. 46 - 48.

calcarata. 5 – 6.
dentipes. 8 – 9.
dilatata. 8 – 9.
obtuſa. 3 – 4.
ſerrata. 12 – 13.
ſpinipes. 5 – 6.
tibialis. 13 – 14.
undata. 11 – 12.

BLATTA. pag. 185 - 186.

longipalpa. 20 – 1.
palliata. 24 – 5.
reticulata. 22 – 3.

BOMBYLIUS. pag. 569.

cruciatus. 3–4.
micans. 2–3.
planicornis. 3–4.

BOMBYX. pag. 435 - 440.

brunnea. 45–6.
biſtrigata. 219–20.
criſtata. 94–5.
dilcors. 153–4.
elata. 222–3.
Eryx. 15–16.
Flavia. 196–7.
hepatica. 134–5.
lobolina. 83–4.
obſcurata. 204–5.
perſpicua. 215–216.
ſtricta. 179–80.
teſtacea. 215–16.
transverſa. 141–2.
Venutia. 158–9.
Virginica. 140–1.

BOSTRICHUS. pag. 158.

minimus. 24–5.

BRACHYCERUS. pag. 161 - 162.

criſtatus. 15–16.
undatus. 8–9.

BRENTUS. pag. 174.

formicarius. 5–6.

BRUCHUS. pag. 158 - 160.

aeneus. 8–9.
Capſincola. 22–3.
craſſicornis. 14–5.
femoratus. 7–8.
Gonagra. 11–12.
punctatus. 6–7.
trimaculatus. 10–11.

BUPRESTIS. pag. 134 - 138.

adſperſa. 104 – 5.
angulata. 91 – 2.
10 - punctata. 90 – 1.
exaltata. 97 – 8.
manipularis. 73 – 4.
melancholica. 20 – 1.
Nigrita. 3 – 4.
parvula. 127 – 8.
piloſa. 75 – 6.
plana. 113 – 4.
puſilla. 111 – 4.
14 - guttata. 98 – 9.
reticulata. 82 – 3.
ſanguinea. 88 – 9.
thoracica. 123 – 9.

---

* CALAPPA. pag. 345 - 347.

[Cancer Ent.]

anguſtata. 7.
criſtata. 5.
fornicata. 1.
granulata. 3.
Lophos. 6.
marmorata. 4.
tuberculata. 2.

CALLIDIUM. pag. 149 - 153.

aulicum. 48 – 9.
concolor. 17 – 8.
Hungaricum. 15 – 6.
luscum. 63 – 4.
melancholicum. 43 – 4.
mixtum. 29 – 30.
punctatum. 9 – 10.
ſemipunctatum. 62 – 3.
ſenile. 71 2.
ſtrepens. 19 – 20.
terminans. 56 – 7.
varioloſum. 18 – 9.

CANCER. pag. 334 - 345.

Fam. 1. Corpore gibbo: lateribus inaequalibus, pag. 334 – 339.
Fam. 2. Obcordati corpore gibbo: lateribus levibus antice tantum carinatis, pag. 339 – 341.
Fam. 3.

Fam. 3. Quadrati corpore gibbo; ſupra plano: margine undique carinato. pag. 341–342.

Fam. 4. Depreſſi corpore depreſſo plano. pag. 342–344.

Fam. 5. Obverſi thorace integro poſtice latiore. pag. 344–345.

aeneus. 6.
angulatus. 25.
auritus. 39.
biſpinoſus. 13.
corallinus. 14.
depreſſus. 32.
floridus. 15.
Gonagra. 10.
Grapſus. 29.
litteratus. 31.
maculatus. 16.
Maenas. 3.
minutus. 34.
noduloſus. 11.
Ochrodes. 12.
Pagurus. 1.
parvulus. 9.
Pictor. 5.
Piſum. 33.
plicatus. 36.
puſillus. 35.
quadratus. 27.
rhomboïdes. 28.
Rumphii. 7.
Ruricola. 21.
ſcaber. 8.
ſemicylindricus. 38.
Senex. 22.
ſetoſus. 19.
ſexpes. 37.
ſpinifrons. 20.
tetragonus. 26.
Tinctor. 4.
Tridens. 23.
undecimdentatus. 2.
variegatus. 30.
varioloſus. 18.
Veſpertilio. 17.
vocans. 24.

CANTHARIS. pag. 67-69.

abdominalis. 3–4.
bicolor. 29–30.
bivittata. 27–8.
Diadema. 12–13.
dimidiata. 19–20.
ſericea. 29–30.
triſtis. 11–12.

CARABUS. pag. 54 - 60.

alpinus. 128 – 9.
bivittatus. 160 – 1.
caliginoſus. 94 – 5.
cruciger. 185 – 6.
depreſſus. 89 – 90.
excellens. 9 – 10.
feſtinans. 74 – 5.
flavilabris. 156 – 7.
hilaris. 92 – 3.
impreſſus. 95 – 96.
integer. 128 – 29.
maurus. 61 – 2.
melancholicus. 28 – 9.
8 - punctatus. 70 – 1.
palliatus. 145 – 6.
poſticus. 102 – 3.
4 - notatus. 68 – 9.
4 - puſtulatus. 181 – 2.
rugoſus. 75 – 6.
St. Crucis. 139 – 40.
ſemivittatus. 157 – 8.
ſmaragdulus. 184 – 5.
ſpoliatus. 61 – 2.
tricolor. 126 – 7.

CASSIDA. pag. 81 - 85.

bicolor. 24 – 5.
brachiata. 16 - 7.
brunnea. 9 – 10.
Chinenſis. 42 – 3.
clathrata. 22.
clavata. 30 – 1.
12 - puſtulata. 67 - 8.
gibba. 21 – 2.
ornata. 13 – 4.
ſcripta. 21 – 2.
6 - notata. 18 – 9.
tranſverſa. 52 – 3.
venoſa. 56 – 7.
vittata. 9 – 10.

CEBRIO. pag. 102.

ruficollis. 3.

CERAMBYX. pag. 142 - 143.

cyanicornis. 12 – 3.
humeralis. 26 – 7.
longimanus [Prionus Ent.] 1.
ſcriptus. 48 – 9.
tuberculatus. 17 – 18.

CERCOPIS. pag. 522 - 524.

albipennis. 43-4.
bicolor. 11-12.
Gigas. 1-2.
lateralis. 24-5.
tranſverſa. 23-4.

CERIA. pag. 557.

abdominalis. [Syrphus Ent.] 2.
clavicornis. 1.

* CEROPLATUS. pag. 550.

tipuloides. 1.

CETONIA. pag. 129 - 131.

albopunctata. 89-90.
cineraſcens. 89-90.
flavomaculata. 44-5.
Franciſca. 25-6.
furvata. 89-90.
irrorata. 89-90.

CHALCIS. pag. 242 - 243.

conica. 1-2.
nigricornis. 12.

CHRYSIS. pag. 257 - 258.

coeruleſcens. 9-10.
dimidiata. 15-16.
maculata. 12-13.
ſcutellaris. 4-5.
ſexdentata. 20-1.

CHRYSOMELA. pag. 85-88.

aegrota. 63-4.
Bulgarenſis. 109-110.
Cajennenſis. 70-1.
ebrâea. 29-30.
Exclamationis. 53-4.
marmorata. 70-1.

obſcu-

obſcurata. 18–9.
14-guttata. 28–9.
6-notata. 63–4.
ſumptuoſa. 85.

CICADA. pag. 520-522.

cruenta. 67–8.
Danais. 28–9.
feſtiva. 67–8.
graminea. 46–7.
orbona. 25–6.
parvula. 86–7.
ſpinoſa. 16–7.

CICINDELA. pag. 60-63.

angulata. 33–4.
cyanocephala. 2–3.
cylindricollis. 37–8.
longipes. 30–1.
melancholica. 33–4.
micans. 21–2.
{obſcura. 21–2.
{obſcura. 33–4. *)
ſinuata. 10–11.
ſuturalis. 31–2.

CIMEX. pag. 527-536.

albipes. 162–3.
Antilope. 50–1.
Baro. 7–8.
biſpinoſus. 31–2.
Boſcii. 27–8.
brevipennis. 174–5.
carnifex. 162–3.
clavatus. 66–7.
coarctatus. 44–5.
coccineus. 44–5.
cribrarius. 44–5.
dorſalis. 42–3.
12-punctatus. 4–5.
flaveſcens. 116–7.
flavolineatus. 33–4.
glauceſcens. 156–7.
Haſtator. 92–3.
Heros. 63–4.
mactans. 136–7.
marginatus. 98–9.
marmoreus. 140–1.
Maroccanus. 30–1.
oculatus. 152–3.
patricius. 3–4.

*) Forte *Oculata* vocanda.

erſpicuus. 104–5.
eflexus. 69–1.
ſilans. 114–5.
Stigma. 10–11.
tricolor. 176–7.

CISTELA. pag. 102 - 103.

ſcata. 22–3.
marginata. 25–6.

---

* CLYTHRA. pag. 109 - 115.

[Cryptocephalus Ent.]

Atraphaxidis. 8.
urita. 19.
ucephala. 30.
icolor. 35.
uprea. 28.
uca. 29.
n-maculata. 13.
Ober. 11.
ordei. 34.
oenigii. 32.
Lor. 23.
Lentiſci. 20.
ongimana. 22.
ongipes. 1.
unulata. 12.
axilloſa. 18.
ulloſa. 9.
igripes. 27.
obſita. 14.
8-punctata. 17.
pallens. 25.
Paracentheſis. 33.
picta. 36.
plagiocephala. 24.
plicata. 10.
4-maculata. 21.
4-notata. 5.
ruficollis. 26.
rugoſa. 7.
ſcopolina. 31.
6-maculata. 3.
6-punctata. 4.
taxicornis. 16.
tridentata. 15.
trimaculata. 6.
tripunctata. 2.

COCCINELLA. pag. 76 - 80.

gulata. 116–7.
apitata. 93–4.
incta. 8–9.
aphana. 3–4.
diſcolor. 7–8.
dorſimacula. 13–14.
12-puſtulata. 110–11.
laeta. 61–2.

Nigri-

Nigrita. 93 – 4.
9 · notata. 48 – 9.
pubeſcens. 3 – 4.
rufipes. 101 – 2.
ſtrigata. 80 – 1.
ſuturalis. 16 – 17.
varians. 29 – 30.
vulpina. 116 – 17.

COLYDIUM. pag. 174.

rufum. 4.

* COPRIS. pag. 28 - 37.

[Scarabaeus Ent.]

Antilope. 185 – 6.
aterrimus. 236 – 7.
centricornis. 196 – 7.
Corvus. 180 – 1.
cyaneus. 211 – 12.
Dama. 185 – 6.
Dorcas. 172 – 3.
Dromedarius. 153 – 4.
Furculus. 198 – 9.
fuſcopunctatus. 241 – 2.
Haſtator. 135 – 6.
Helwigii. 220 – 1.
laevigatus. 226 – 7.
Meleager. 172 – 3.
Melitaeus. 159 – 60.
metallicus. 142 – 3.
nuchidens. 184 – 5.
Pardalis. 144 – 5.
parvulus. 240 – 1.
Pirmal. 155 – 6.
politus. 231 – 2.
puſillus. 238 – 9.
4 · dentatus. 203 - 4.
ſanctus. 209 – 10.
Unicornu. 196 – 7.
variegatus. 239 – 40.
Vertagus. 159 – 60.
violaceus. 233 – 4.
Vitulus. 185 – 6.

COREUS. pag. 537.

Purgator. 23.

COSSUS. pag. 441.

Verbaſci.

COSSYPHUS. pag. 123 - 24.

...depreſſus. 2.

Hoffmannſeggii [depreſſus Supl.] 1. *)

CRABRO. pag. 270 - 271.

...ſſipes. 26–7.
...ediatus. 16–17.
...bialis. 27–8.

tridens. 24–5.
varicornis. 27–8.

---

* CRAMBUS. pag. 464 - 475.

[Phalaena, Tinea Ent.]

...peſtris. 14.
...tennatus. 3.
...buſtorum. 43.
...rgenteus. 42.
...gyreus. 41.
...ter. 55.
...rbatus. 2.
...ciflatus. 52.
...mbycalis. 5.
...pitatus. 25.
...rneus. 35.
...lomum. 32.
...chaceus. 45.
...rnatus. 24.
...ſſalis. 13.

crinitus. 51.
Cryptorum. 46.
Culmorum. 38.
dilatatus. 18.
dorſatus. 26.
elongatus. 9.
enſatus. 8.
erigatus. 30.
Fagi. 56.
forficatus. 20.
glaucinatus. 1.
hirtus. 61.
Hortorum. 33.
lanceolatus. 10.
lineatus. 36.

lugu-

*) Coſſyphus alter e *Coſſypho depreſſo* Ent. egreſſus nullo nomine inſignitus, *Depreſſi* nomen eo magis ſibi vindicare videtur, quod ab Olivierio et Herbſtio ſub hoc titulo deſcriptus ac depictus eſt. *Depreſſum* n. I. Suppl. C. *Hoffmannſeggii* vocavimus, Herbſtium eo libentius ſecuti, quo gratum animum erga celeb. *Hoffmannſeggium*, de Entomologia maxime merentem, quantulumcunque eſt, monumento teſtamur.

lugubris. 60.
Margaritaceus. 34.
marginatus. 48.
Mercurii. 58.
moerens. 53.
mucronatus. 50.
Nemorum. 12.
niger. 54.
{*niveus.* 29.
{*niveus.* 44.
obſoletus. 23.
Oxyacanthae. 59.
palpalis. 15.
Paſcuum. 40.
pectinatus. 19.
Pineti. 37.
pinguis. 27.
porrectus. 16.
Pratorum. 39.
proboſcideus. 7.
ramalis. 28.
roſtratus. 11.
Sacchari. 31.
ſinuatus. 62.
Sophiae. 21.
{ſtrigatus. 17.
{*ſtrigatus.* 47.
tentacularis. 6.
Tetrix. 57.
triſtis. 22.
ventilabris. 4.
Vinetorum. 49.

CRANGON. pag. 409 - 410.

boreas. 1.
marginatus. 3.
vulgaris. 2.

CRIOCERIS. pag. 88 - 90.

bicolor. 35 – 6.
2 - ſpinoſa. 1 – 2.
glabrata. 10 – 11.
lineola. 10 – 11.
pallida. 10 – 11.

CRYPTOCEPHALUS. pag. 105 - 109.

arenarius. 90.
atratus. 34 – 5.
coloratus. 71 – 72.
congeſtus. 44 – 5.
imperialis. 44 – 5.
Lundii. 54 – 5.
luridus. 34 – 5.
ornatus. 44 – 5.
parvulus. 87 – 8.
poſtulatus. 58 – 9.
6 - guttatus. 17 – 8.
Scheſtedii. 54 – 5.

Spengleri. 81–2.
3-lineatus. 32–3.
Vahlii. 54–5.
variabilis. 32–3.

CUCUJUS. pag. 123.

rufus. 2–3.

CURCULIO. pag. 165 - 173.

avarus. 196–7.
brunnipes. 381–2.
Calbum. 197–8.
Chamaeropis. 54–6.
Chloris. 46–7.
cribrarius. 9–10.
denticornis. 381–2.
dorſatus. 397–8.
elongatulus. 111–12.
Fabricii. 157–8.
Famulus. 41–2.
Fritillum. 292.
Guineenſis. 6–7.
melanocephalus. 101–2.
moratus. 244–5.
olens. 170.
Pica. 106–7.
pictus. 157–8.
piger. 160–1.
plagiatus. 184–5.
Porculus. 37–8.
prodigus. 238–9.
pudicus. 19–20.
Punctum. 381–2.
4-dentatus. 203–4.
roralis. 390–1.
ſellatus. 255–6.
Striga. 328–9.
Verruca. 353–4.
Volvulus. 107–8.

CYMOTHOA. pag. 304 - 305.

Aſilus. 4.
ſulcata. 3.
imbricata. 2.
paradoxa. 1.

CYNIPS. pag. 213 - 214.

compreſſa. 1–2.
Quercus Jicis. 10–11.
Quercus radicis. 10–11.
Quercus terminalis. 10–11.
Serratulae. 15–6.

---

* DELPHAX. pag. 522.
[Cicada Ent.]

clavicornis. 2.
craſſicornis. 1.

DERMESTES. pag. 71 - 72.

bipuſtulatus. 47.
crenatus. 41 – 2.
frontalis. 20 – 1.
Megatoma. 4 – 5.

DIAPERIS. pag. 178.

hydactina. 1 – 2.

* DIRCAEA. pag. 121 - 122.
[Lymexylon Ent.]

barbata. 1.
diſcolor. 2.
4 - guttata. 3.
ruficollis. 4.

DONACIA. pag. 128.

Equiſeti. 1 – 2.

* DORIPPE. pag. 361 - 362.
[Cancer Ent.]

aſtuta. 2.
callida. 3.
quadridens. 1.

* DROMIA. pag. 359 - 360.
[Cancer Ent.]

aegagropila. 2.
artificioſa. 3.
Rumphii. 1.

DYTISCUS. pag. 64 - 65.

brunneus. 34 – 5.
haemorrhoidalis. 38 – 9.
lateralis. 6 – 7.
ſcriptus. 40 – 1.

ELAPHRUS. pag. 63 - 64.

atratus. 3 – 4.

ELATER. pag. 138 - 140.

aeruginoſus. 33 – 4.
atomarius. 28 – 9.
bipunctatus. 78 – 9.
equeſtris. 78 – 9.
laevigatus. 16 – 17.
melancholicus. 66 – 7.
Morio. 16 – 17.
tomentoſus. 4 – 5.
tridentatus. 71 – 2.

EMPIS. pag. 568.

femorata. 10 – 11.

* ENDOMYCHUS. pag. 100 - 102.

[Galleruca Ent.]

Boviſtae. 5.
coccineus. 2.
cruciatus. 3.
cruentus. 1.
4-puſtulatus. 4.

ERODIUS. pag. 42.

muricatus. 2 – 3.

EROTYLUS. pag. 101 - 102.

marginatus. 18 – 9.
triſtis. 23.
unifaſciatus. 14 – 5.

EUCERA. pag. 278.

brevicornis. 8. craſſipes. 9.

EVANIA. pag. 241-242.

cincta. 3—4. ruficollis. 3—4.
Hiſtrio. 2—3. variegata. 2—3.
petiolata. 5—6.

* FLATA. pag. 517-520.
[Cicada Ent.]

bipunctata. 7. *perſpicillata.* 1.
candida. 4. *phalaenoides.* 6.
fuſcata. 5. *pygmaea.* 14.
griſea 9. *4-punctata.* 15.
limbata. 3. *retuſa.* 8.
marginata. 13. *3-punctata.* 10.
minuta. 12. *vivida.* 11.
ocellata. 2.

* FOENUS. pag. 240.
[Ichneumon Ent.]

Aſſectator. 2. *Jaculator.* 1.

FORFICULA. pag. 185.

herculeana. 1. ruficollis. 11—12.

FORMICA. pag. 279-281.

bituberculata. 38—9. flavicornis. 38—9.
conica. 27—8. fungoſa. 42—3.
cylindrica. 31—2. ſericea. 9—10.
ferruginea. 11—12. tarſata. 38—39.

GALATHEA. pag. 414 - 415.

complectens. 4.	*ſtrigoſa. 1.*
gregaria. 3.	*rugoſa. 2.*

* GALLERIA. pag. 462 - 463.

[Tinea Ent.]

alvearia. 2.	*cereana. 1.*

GALLERUCA. pag. 94 - 99.

abbreviata. 63–4.	gibba. 72–3.
aeruginea. [Ciſtela Ent.] 53–4.	Indica. 71–2.
albicornis. 53–4.	Lauſoniae. 14–5.
brunnea. 4–5.	limbata. 54–5.
collaris. 57–8.	liturata. 69–70.
cyanipennis. 57–8.	melanocephala. 53–4.
dimidiata. 93–4.	4-notata. 66–7.
elongata. 119–20.	ſericea. 20–1.
faſciata. 55–6.	Tranquebarica. 6–7.
flavicollis. 72–3.	viridis. 5–6.

* GAMMARUS. pag. 418.

[Aſtacus Ent.]

Homari. 15.

* GEOTRUPES. pag. 7 - 22.

[Scarabaeus Ent.]

Fam. 1. Thorace cornuto. pag. 7–17.
Fam. 2. Thorace inermi, capite cornuto. pag. 17–21.
Fam. 3. Mutici, capite thoraceque inermi. pag. 22.

Actaeon. 18.	*Alcides. 2.*
Aegeon. 6.	*Aloeus. 28.*
Aenobarbus. 35.	*Antaeus. 31.*

Aries. 49.
Atlas. 26.
Barbaroſſa. 42.
bicornis. 23.
bilobus. 14.
Boas. 21.
Centaurus. 5.
Chorinaeus. 8.
claviger. 10.
Coryphaeus. 22.
coronatus. 51.
Cyclops. 39.
Daedalus. 15.
dichotomus. 9.
didymus. 54.
Dionyſius. 52.
diſpar. 7.
Elephas. 20.
Enema. 12.
excavatus. 61.
farctus. 58.
Geryon. 27.
Gideon. 3.
haſtatus. 11.
Hercules. 1.
Hircus. 56.
Hylax. 48.
Jamaicenſis. 45.
Juvencus. 63.
Maimon. 33.
Meliboeus. 53.
Milon. 40.
Monodon. 50.
naſicornis. 36.
Orion. 24.
Oromedon. 4.
Pan. 13.
piceus. 60.
punctatus. 57.
4-ſpinoſus. 38.
retuſus. 59.
Rhinoceros. 41.
Satyrus. 44.
Silenus. 46.
Simſon. 19.
Stentor. 43.
Sylvanus. 37.
Syphax. 32.
Syrichtus. 47.
Talpa. 62.
Titanus. 34.
Tityus. 25.
truncatus. 16.
Typhon. 29.
valgus. 55.
Vulcanus. 30.
Zoilus. 17.

GERRIS. pag. 543.

Fluviorum. 1–2.
Foſſularum. 5–6.

GRYLLUS. pag. 194 - 196.

…ian. 33—4.
…tus. 61—2.
…icatus. 36—7.
…curus. 33—4.
ſanguinipes. 59—60.
ſcaber. 62—3.
Tamulus. 61—2.

GYRINUS. pag. 65 - 66.

…dus. 5—6.
…nutus. 8.
nitidulus. 9.

HELOPS. pag. 51 - 53.

…caratus. 12—3.
…iculatus. 13 - 14.
…oratus. 23—4.
…ugineus. 26.
micans. 4—5.
obliquatus. 22—23.
planus. 21—2.
ſpinipes. 23—4.

HEMEROBIUS. pag. 202.

…ndidus. 5—6.
nebuloſus. 1—2.

HESPERIA. pag. 429 - 434.

Bion. 240—1.
Cippus. 43—4.
Cnejus. 100—101.
Eleus. 180—1.
…ricus. 267—8.
Flaccus. 347—8.
Gremius. 282—3.
Longinus. 77—8.
Maro. 242—3.
Mathias. 289—90.
Naſo. 236 - 7.
Nero. 289—90.
Phocion. 232—3.
Remus. 348—9.
Zachaeus. 231—2.

HETEROCERUS. pag. 75.

dubius. 2.
marginatus. 4.

HIPPA. pag. 370.

adactyla. 1.
emeritus [Aſtacus Ent.] 2.

* HIRTEA. pag. 551 - 553.

[Tipula Ent.]

albipennis. 12.
brevicornis. 1.
brunnipes. 10.
Chryſanthemi. 7.
febrilis. 9.
forcipata. 11.
hortulana. 2.
Johannis. 3.
juniperina. 13.
Pomonae. 4.
Pyri. 5.
ruficollis. 6.
Thomae. 8.

HISPA. pag. 116 - 117.

capitata. 15.
gibba. 13.
Hyſtrix. 2 - 3.
4 - puſtulata. 3 - 4.
vittata. 14.

HISTER. pag. 37 - 39.

acuminatus. 4 - 5.
bipuſtulatus. 16 - 17.
erythropterus. 16 - 17.
impreſſus. 2 - 3.
inaequalis. 1 - 2.
pulchellus. 16 - 7.
4 - guttatus. 18 - 19.

HYBLAEA. pag. 448 - 449.

liturata. 8.
obliqua. 7.
ſcabra. 4 - 5.

HYLAEUS. pag. 272.

minutus. 16 - 17.

ICH-

ICHNEUMON, pag. 219 - 232.

Abbreviator. 89–90.
Alvearius. 232–3.
…lens. 203–4.
Brunneator. 28–29.
Calculator. 131–2.
Campanulator. 177–8.
Carinator. 127–8.
Caſtrator. 92–3.
clavatus. 189–90.
cyaneus. 218–19.
depreſſus. 220–21.
Deprimator. 182–3.
dorſalis. 218–19.
Elector. 111–12.
Emarciator. 162–3.
Erector. 63–4.
Exhauſtator. 138–9.
exſpectorius. 30–1.
Falciator. 93–4.
ferrugineus. 189–90.
feſtivus. 213–14.
feſtinans. 247–8.
Firmator. 135–6.
Flavator. 54–5.
fulgens. 213–4.
Laminator. 92–3.
laminatorius. 33–4.
Luteator. 87–8.
Minutator. 111–12.
natatorius. 17–8.
nugatorius. 39–40.
obſoletus. 218–9.
Oculator. 57–8.
purpuraſcens. 220–1.
Serrator. 106–7.
Similator. 57–8.
Spinator. 100–1.
ſplendens. 211–12.
ſticticus. 205–6.
ſtigmatizans. 212–13.
teſtaceus. 189–90.
Tripunctator. 135–36.
Truncator. 81–2.
umbratus. 207–8.
Urinator. 111–12.
verticillatus. 235–6.

---

* IDOTHEA. pag. 302 - 304.

[Cymothoa Ent.]

acuminata. 4.
albicornis. 6.
Americana. 1.
aquatica. 7.
emarginata. 5.
linearis. 9.
marina. 8.
Phyſodes. 3.
Pſora. 2.
Scopulorum. 10.

---

* INACHUS. pag. 355 - 359.

[Cancer Ent.]

Fam. 1. Pedibus cylindricis mediocribus. pag. 355-358.
Fam. 2 Pedibus elongatis, filiformibus. pag. 358-359.

aculeatus. 10.
anguſtatus. 14.
Araneus. 7.
Chiragra. 11.
condyliatus. 9.
cornutus. 6.
Hircus. 4.
hybridus. 2.
Lar. 21.
longipes. 19.
longiroſtris. 18.
Maja. 15.
maſcaronius. 12.
muricatus. 1.
naſutus. 13.
Opilio. 8.
Ovis. 3.
Phalangium. 17.
ſagittarius. 22.
Scorpio. 16.
ſpinifer. 20.
Urſus. 5.

IPS. pag. 179.

4-notata. 6-7.
teſtacea. 14-5.

JULUS. pag. 289.

guttulatus. 5-6.

LAGRIA. pag. 118 - 119.

aenea. 14-15.
haemorrhoidalis. 10-11.
livida. 15-6.
viridipennis. 1-2.

LAMIA. pag. 144 - 146.

barbicornis. 92-3.
bicincta. 51-2.
marmorata. 6-7.
mixta. 26-7.
obſcura. 26-7.
Scheſtedii. 93-4.
Spinator. 92-3.

LAMPYRIS. pag. 124 - 125.

iennenſis. 20–1.
aculata. 21–2.
llens. 15–6.
verſicolor. 21–2.
veſpertina. 18–9.

LARRA. pag. 252 - 253.

ifaſciata. 5–6.
ngulata. 6–7.
faſciata. 7–8.

* LEMA. pag. 90 - 94.

[Crioceris Ent.]

Aſparagi. 24.
ifaſciata. 13.
runnea. 3.
ampeſtris. 25.
yanea. 17.
nella. 19.
punctata. 6.
queſtris. 26.
lavipes. 21.
mpreſſa. 2.
elanopa. 20.
elanura. 16.
rdigera. 5.
nigricornis. 10.
nigripes. 14.
praeuſta. 11.
4-puſtulata. 1.
14-punctata. 7.
5-punctata. 9.
retuſa. 4.
ruficollis. 8.
rufipes. 23.
Solani. 18.
ſubſpinoſa. 22.
Tranquebarica. 15.
unifaſciata. 12.

LEPISMA. pag. 199.

ezeana. 1–2.
vittata. 3–4.

LEPTURA. pag. 153 - 154.

onnexa. 47–8.
Coromandeliana. 54.
gax. 19–20.
Lamed [Stenocorus Ent.] 32–3.
maculicornis. 4–5.
Tranquebarica. 53.

* LEU.

*. LEUCOSIA. pag. 349 - 351.

[Cancer Ent.]

Fam. 1. Chelis ovatis. pag. 349–350.
Fam. 2. Chelis filiformibus. pag. 350–352.

cranioſaris. 4.
Cylindrus. 12.
Erinaceus. 11.
fugax. 8.
globoſa. 3.
Nucleus. 9.
Pila. 2.
planata. 6.
porcellana. 5.
punctata. 7.
ſcabriuſcula. 1.
7-*ſpinosa.* 10.

LEUCOSPIS. pag. 259.

atra. 3.

LIBELLULA. pag. 283 - 285.

Aſiatica. 14–15.
Braminea 18–19.
carnatica. 18– 19.
coerulescens. 18–9.
conſpurcata. 1–2.
flavescens. 18–19.
gibba. 14–15.
Tillarga. 25–6.

* LIGIA. pag. 301 - 302.

[Cymathoa Ent.]

Italica. 2.
oceanica. 1.

LIMULUS. pag. 371.

Cyclops. 2.
Polyphemus. 1.

* LITHOSIA. pag. 459 - 462.

[Noctua, Tinea, Alucita Ent.]

complana. 3.
convoluta. 4.
depreſſa. 2.
eborina. 15.

…ava. 9.
…elata. 7.
…randis. 8.
…rrorata. 12.
…lutea. 11.
…magna. 5.
marginata. 10.
Perla. 14.
puſtulata. 16.
quadra. 1.
roscida. 13.
ſocia. 6.

LOCUSTA. pag. 193.

hemiptera. 44–5.
marginata. 46.
Serricauda. 14–5.

LUCANUS. pag. 140.

rufipes. 15.

LYCTUS. pag. 177.

nitidulus. 2–3.

LYCUS. pag. 125 - 126.

ferrugineus. 4–5.

LYGAEUS. pag. 537 - 542.

arcuatus. 21–2.
aterrimus. 96–7.
Batatas. 31–2.
dilatatus. 20–1.
fuſcus. 30–1.
gramineus. 153–4.
haemorrhoidalis. 26–7.
laticornis. 14–15.
lineatus. 124–125.
melanocephalus. 75–6.
neglectus. 150–1.
olivaceus. 87–8.
pedeſtris [Gerris Ent.] 29–30.
quadratus. 110–4.
roſeus. 143–4.
tibialis. 93–4.
Typhoeus. 12–13.

LYTTA. pag. 119 - 120

cinerea. 12 – 3.
villoſa. 15 – 6.

MALACHIUS. pag. 70 - 71.

abdominalis. 9 – 10.
elegans. 4 – 5.
limbatus. 13 – 14.
4 - maculatus. 7 – 8.
thoracicus. 7 – 8.
viridipennis. 7 – 8.

MANTIS. pag. 190 - 191.

cordata. 21 – 22.
lanceolata. 48 – 9.
lobata. 27 – 8.
marginata. 37 – 38.

* MATUTA. pag. 369

[Cancer Ent.]

planipes. 2.
Victor. 1.

MELLINUS. pag. 265 - 267.

bipunctatus. 1 – 2.
interruptus. 4 – 5.
labiatus. 7 – 8.
Nigrita. 9.
ſcaber. 7 – 8.
triſtrigatus. 4 – 5.
variegatus. 1 – 2.

MELOLONTHA. pag. 131 - 133.

atrata. 66 – 7.
calcarata. 90 – 1.
ferruginea. 43 – 4.
lineata. 74 – 5.
lucicola. 66 – 7.
moerens. 64 – 5.
Morio. 27 – 8.
pallens. 43 – 4.
pygmaea. 81 – 2.
Quadridens. 37 – 8.

MEMBRACIS. pag. 513-515.

Capra. 23-4.
emarginata. 4-5.
falciata. 33.
fuſcata. 6-7.
minuta. 32.
Rupicapra. 13-14.
ſinuata. 4-5.
Tarandus. 23-4.

MONOCULUS. pag. 305-306.

Apus. 1.
Crangorum. 3.
piſcinus. 2.

MORDELLA. pag. 127.

nigripennis. 4-5.
pubeſcens. 3-4.
variegata. 3-4.

---

* MULIO. pag. 557-559.

[Syrphus Ent.]

arcuatus. 2.
bicinctus. 1.
bicolor. 8.
conopſeus. 6.
dentipes. 5.
devius. 4.
ichneumoneus. 7.
mutabilis. 3.
ſphegeus. 9.

MUSCA. pag. 563-565.

bicolor. 122-3.
Chaerophylli. 145-6.
demandata. 94-5.
diaphana. 126-7.
flaveſcens. 156-7.
laſciva. 111-12.
planifrons. 148-9.
radiata. 157-8.
Stigma. 72-3.

MUTILLA. pag. 281-282.

calva. 24–5.
dorſata. 13–14.
Pedemontana. 19–20.
vagans. 27–8.

MYCETOPHAGUS. pag. 175.

faſciatus. 1–2.
Populi. 12–13.

MYLABRIS. pag. 120-121.

geminata. 9–10.
minuta. 12.
ruficornis. 10–11.
6-maculata. 9–10.
Sidae. 7–8.

MYRMELEON. pag. 205-207.

ermineum. 6–7.
lineatum. 5–6.
muſtelinum. 7–8.
pictum. 6–7.
tetragrammicum. 3–4.
urſinum. 8–9.

NAUCORIS. pag. 525.

maculata. 1–2.
oculata. 3–4.

NECYDALIS. pag. 155.

longipes. 16–7.
marginata. 23–4.

NITIDULA. pag. 73-74.

faſciata. 22–3.
humeralis. 26–7.
pallida. 6–7.
quadrata. 27–8.

NOCTUA. pag. 441-448.

Alchymiſta. 298.
angulata. 107-8.
Cinerago. 218-9.
convergens. 297-8.
dimidiata. 274-5.
erota. 14-15.
falciata. 137-8.
gemina. 132-3.
madida. 109-10.
marmorea. 273-4.
nictitans. 100-1.
Nyctea. 16-17.
obſcura. 136-7.
Ochrago. 218-9.
Panthea. 309-10.
panthorina. 105-6.
pumila. 275-6.
pupilla. 300-1.
Turcica. 100-1.
Vitiſidaea. 381.

NOTONECTA. pag. 524.

ciliata. 3-4.

NOTOXUS. pag. 66-67.

limbatus. 10-11.
hirtellus. 12.
pedeſtris. 9-10.
populneus. 13.
Rhinoceros. 7-8.

* OCYPODE. pag. 347-348.
[Cancer Ent.]

ceratophthalma. 1.
laevis. 4.
minuta. 5.
quadrata. 2.
rhombea. 3.

ONISCUS. pag. 300-301.

annulatus. 4-5.
Aſellus. 3.
hypnorus. 4-5.
murarius. 3-4.

* ONITIS. pag. 25 - 27.

[Scarabaeus Ent.]

Apelles. 5.
Aygulus. 2.
Belial. 8.
Clinias. 3.
Inuus. 2.
Lophus. 4.
Sphinx. 6.
unguiculatus. 7.

OPATRUM. pag. 40 - 42.

bifurcum. 1—2.
canaliculatum. 15—6.
depreſſum. 4—5.
fuſcum. 1—2.
obſcurum. 1—2.
reticulatum. 1—2.
ſtrigatum. 13—14.
ſubterraneum. 11—12.

---

* OPHION. pag. 235 - 239.

[Ichneumon Ent.]

Fam. 1. Antennis luteis. pag. 235 — 237.
Fam. 2. Antennis nigris. pag. 237 — 239.

amictus. 10.
circumflexus. 6.
Compenſator. 16.
Cultellator. 20.
Cunctator. 19.
Erigator. 14.
Falcator. 11.
Flagellator. 18.
flavifrons. 9.
flavus. 3.
Foliator. 21.
glaucopterus. 4.
Jocator. 15.
luteus. 1.
Mercator. 17.
Morio. 8.
obſcuratus. 7.
Pugillator. 12.
ramidulus. 2.
relictus. 5.
Saltator. 13.

ORI-

* ORITHYIA. pag. 363.
[Cancer Ent.]

mammillaris. 1.

* ORYSSUS. pag. 218-219.
[Sirex Ent.]

coronatus. 1.
Veſpertilio. 2.

OXYPORUS. pag. 181-182.

dimidiatus. 15-6.

PAGURUS. pag. 411-414.

alatus. 13.
aniculus. 2.
araneiformis. 15.
Bernhardus. 3.
clypeatus. 9.
Cultos. 7.
diaphanus. 8.
Diogenes. 5.
Eremita. 10.
Hungarus. 4.
Latro. 1.
Miles. 6.
oculatus. 12.
ophthalmicus. 14.
tubularis. 11.

* PALAEMON. pag. 402-404.
[Aſtacus Ent.]

brevimanus. 4.
Carcinus. 1.
Coromandelianus. 5.
Fucorum. 10.
Lar. 2.
Locuſta. 8.
longimanus. 3.
ſerratus. 9.
Squilla. 7.
Tranquebaricus. 6.

* PALINURUS. pag. 400 - 401.

[Aſtacus Ent..]

Fam. 1. Spinis ocularibus ſimplicibus. pag. 400 - 401.
Fam. 2. Spinis ocularibus ſubtus dentatis. pag. 401.

faſciatus. 3.
Homarus. 1.
ornatus. 2.
quadricornis. 4.

PANORPA. pag - 208.

Coa. 7.
halterata. 8.

PAPILIO. pag. 422 - 429.

Blaſius. 488 – 9.
Callirrhoe. 617 – 18.
Caſſida. 595 – 6.
Eryx. 180 – 1.
Eſra. 284 – 5.
Euphon. 184 – 5.
Fabia. 587 – 8.
Frobenia. 400 – 1.
Grachus. 30 – 1.
Hegeſta. 454 – 5.
Hierta. 281 – 2.
Ilea. 587 – 8.
Interrogationis. 243 – 4.
Larinia. 284 – 5.
Larra. 653 – 4.
Libythea. 598 – 9.
Manlius. 30 – 1.
Miris. 693 – 4.
Narciſſus. 672 – 3.
Phoedon 184 – 5.
Rhea. 334 – 5.
Titania. 655. – 6.

* PARTHENOPE. pag. 352 - 354.

[Cancer Ent.]

dubia. 8.
fornicata. 1.
Giraffa. 2.
horrida 5.
Lar. 6.
Longimana. 3.
Maja. 7.
Regina. 4.

PEDICULUS. pag. 570 - 571.

Anatis. 23 – 4.
Lanii. 15 – 6.
Pici. 20 – 1.
Tantali. 26 – 7.

* PENAEUS. pag. 408 - 409.

Monoceros. 2
Monodon. 1.
planicornis. 3.

PHALAENA. pag 449 - 459.

aerata. 238 – 9.
amata. 324 – 5.
balteata. 300 – 1.
belgaria. 62 – 3.
bicolorata. 149 – 50
circularia. 64 – 5.
colorаria. 96 – 7.
crocataria. 43 – 4.
exaltata. 324 – 5.
geminata. 269 – 70.
grataria. 112 – 13.
harparia. 17 – 18.
herbariata. 278 – 9.
hyalinaria. 86 – 7.
laetata. 261 – 2.
mixtaria. 105 – 6.
numerata. 190 – 1.
obſcuraria. 27 – 28.
omicraria. 64 – 5.
opicata. 272 – 3.
pandularia. 63 – 4.
perſpicaria. 6 – 7.
pluviata. 220 – 1.
puſillaria. 120 – 1.
rivulata. 319 – 20
rotaria. 112 – 13.
rupeſtrata. 206 – 7.
togata. 145 – 6.
variata. 185 – 6.
vidualis. 420 – 1.

PHALANGIUM. pag. 293.

4-dentatum. 6 – 7.

* PHASMA. pag. 186 - 190.

[Mantis Ent.]

angulata. 5.
annulata. 13.
atrophica. 8.
aurita. 14.
biſpinoſa. 10.
Calamus. 3.
Ferula. 2.
filiformis. 1.
Gigas. 6.
Iamaicenſis. 11.
lateralis. 12.
linearis. 15.
necydaloides. 7.
roſea. 17.
Roſſia. 4.
ſpinoſa. 9.
variégata. 16.

PHILANTHUS. pag. 268 - 269.

auritus. 1 – 2.
diſſectus. 11 – 12.
interſtinctus. 11 – 12.
ventilabris. 3 – 4.

PHRYGANEA. pag. 200 - 202.

alba. 30 – 1.
nervoſa. 16 – 17.
pygmaea. 31 – 2.
Tigurinenſis. 18. – 19.
villoſa. 6. – 7.
vittata. 16 – 17.

* PHYCIS. pag. 463 - 464.

[Tinea Ent.]

Boleti. 1.
ſpiſſicornis. 2.

PIMELIA. pag. 44 - 46.

crenata. 16 – 7.
planata. 21 – 2.
punctata. 31 – 2.
pygmaea. 35.
varioloſa. 24 – 5.

PODURA. pag. 199 - 200.

riſtata. 16 – 17.

* POMPILUS. pag. 246 - 252.

[Sphex Ent.]

amethyſtinus. 6.
analis. 1.
auratus. 25.
biguttatuſis. 18.
bifaſciatus. 16.
bipunctatus. 28.
cinereus. 22.
cingulatus. 7.
exaltatus. 31.
faſciatus. 20.
fugax. 24.
fuſcus. 3.
fuſcatus. 14.
gibbus. 17.
guttatus. 34.
hirtus. 36.
hircanus. 30.
hyalinatus. 13.
labiatus. 9.
lunicornis. 21.
maculatus. 32.
Maurus. 11.
mixtus. 12.
niger. 8.
nigricornis. 29.
nigripes. 35.
nitidus. 26.
pulcher. 19.
rufipes. 27.
6-punctatus. 15.
ſimilis. 2.
tricolor. 33.
tropicus. 23.
Urſus. 5.
variegatus. 10.
viaticus. 4.
villoſus. 37.

* PORTUNUS. pag. 363 - 369.

[Cancer Ent.]

Fam. 1. Thorace utrinque bidentato. pag. 363 - 364.
Fam. 2. Thorace utrinque ſexdentato. pag. 364 - 365.
Fam. 3. Thorace utrinque quinquedentato. pag. 365 - 366.
Fam. 4. Thorace utrinque novemdentato. pag. 366 - 369.

annulatus. 4.
armiger. 18.
crucifer. 2.
Defenſor. 10.

Depurator. 9.
feriatus. 10.
Forceps. 21.
Gladiator. 19.
haſtatoides. 20.
haſtatus. 17.
holoſericeus. 6.
Holſatus. 12.
lancifer. 11.
lucifer 3.
pelagicus. 14.
ponticus. 22.
puber. 8.
ſanguinolentus. 15.
Tranquebaricus. 13.
truncatus. 7.
variegatus. 5.
Vigil. 1.

POSIDON. pag. 417 - 418.
[Aſtacus Ent.]

Cylindrus. 2.
depreſſus. 1.

PRIONUS. pag. 141 - 142.

forficatus. 14–15.
pallens. 6–7.
Tranquebaricus. 10.–11.

---

* PSOCUS. pag. 203 - 205.
[Hemerobius Ent.]

abdominalis. 9.
bipunctatus. 7.
fasciatus. 4.
fatidicus. 11.
flavicans. 2.
longicornis. 1.
picicornis. 6.
pulſatorius. 10.
4-punctatus. 8.
6-punctatus. 5.
ſtriatulus. 3.

PTILINUS. pag. 73.

Dorcatoma. 3–4.
ſerratus. 5.

PYCNOGONUM. pag. 570.

ni, [Cymothoa Ent.] 2.

PYRALIS: pag. 475-480.

lbana, [Tinea Ent.] 31-2.
pproxunana, 116-7.
randeriana. 63-4.
-prana. 14-5
ompoſana [Tinea Ent.] 164-5.
phippana. 122-3.
avana. 15-6.
ulvana [Tinea Ent.] 77-8.
atreillana. 149-50.
iberana. 122-3.
unana. 122-3.
marmorana. 72-3.
obscurana 44-5.
orbana. 17-18.
pulchana [Tinea Ent.] 167-8.
repandana. 81-2.
reticulana. 131-2.
Rohrana. 74-5.
ſepulcrana [Tinea Ent.] 175-6.
tapezana. [Tinea Ent.] 167 8.
tuberculana. 39-40.

REDUVIUS. pag. 544-546.

pterus. 54-5.
arinatus. 36-7.
inereus. 48-9.
oronatus. 53-4.
flavicans. 12-13.
hirticornis. 11-12.
4-notatus. 34-5.

RHAGIO. pag. 556.

Ibis. 3-4.
nebuloſus. 10-11.

RHINOMACER. pag. 164.

varius. 1.

RIPIPHORUS. pag. 126.

lituratus. 8–9.
ſpinoſus. 3–4.

SAGRA. pag. 104.

triſtis. 1–2.

SAPERDA. pag. 147-148.

discoidea. 18–19.
hirticornis. 50–1.
marginata. 47–8.
morbillosa. 4–5.
necydalea. 52–3.

---

* SARGUS. pag. 566-567.
[Musca Ent.]

aeneus. 3.
auratus. 2.
cuprarius. 1.
politus. 4.
ſcutellatus. 5.

SCAPHIDIUM. pag. 178-179.

bicolor. 2–3.
immaculatum. 2–3.

SCARABAEUS. pag. 23-24.

capillus. 124–5.
drochaeris. 73–4.
igatus. 98–9.
rator. 104–5.
4-tuberculatus. 94–5.
Sabuleti. 125–6.
tibialis. 127–8.

SCARITES. pag. 43-44.

puſtulatus. 8–9.
lindricus. 8–9.
grandis. 2–3.
porcatus. 4–5.

SCAURUS. pag. 42-43.

lcaratus. 4.
punctatus. 5.

SCOLIA. pag. 255-257.

ochleata. 39.
erythrocephala. 16. 17.
iſtrionica. 35–6.
notata. 24–5.
4-faſciata. 16–17.
Volvulus. 38.

SCOLOPENDRA. pag. 289.

violacea. 6–7.

SCORPIO. pag. 294-295.

mucronatus. 5–6.
Tamulus. 6–7.

SCYLLARUS. pag. 398-400.

aequinoctialis. 2.
antarcticus. 3.
Arctus. 1.
auſtralis. 5.
orientalis. 4.

SEMBLIS. pag. 200.

fuscata. 10-11.
planata. 6-7.

* SICUS. pag. 554-555.
[Stratiomys, Tabanus Ent.]

bicolor. 3.
Crucis. 5.
errans. 4.
ferruginea. 2.
teſtacea. 1.

SINODENDRON. pag. 156.

gibbum. 1-2.
puſillum. 5.

* SOLPUGA. pag. 293-294.
[Phalangium Ent.]

araneoides. 2.
chelicornis. 3.
fatalis. 1.

SPHAERIDIUM. pag. 39.

5-maculatum. 8-9.
Wintherae. 29-30.

SPHEX. pag. 243-245.

annulata. 89-90.
atra. 18-9.
binodis. 1.
cruenta. 54-5.
groſſa. 89-90.
hemiptera. 11-12.
Heros. 88-9.

SPHINX. pag. 434-435.

donna. 56—7.
Lacheſis. 26—7.

SQUILLA. pag. 415-417.

agra. 8.
ta. 7.
eumon. 5.
ulata. 1.
ntis. 2.
Phalangium. 4.
raphidea. 3.
Scyllarus. 6.
vitrea. 9.

STAPHYLINUS. pag. 180-181.

nneus. 44.
aris. 41—2.
lanthus. 46—7.
plagiatus. 32—3.
tuberculatus. 49—50.

STENOCORUS. pag. 146-147.

lindricollis. 16—7.
plebejus. 29—30.

STOMOXYS. pag. 568.

bombylans. 5—6.

STRATIOMYS. pag. 555-556.

vipes. 9—10.
villoſa [Nemotelus Ent.] 26.

* SYMETHIS. pag. 371.
[Hippa Ent.]

arioloſa. 1.

SYR

SYRPHUS. pag. 561-563.

ambulans. 63-4.
floralis. 115-6.
micans. 63-4.
megacephalus. 17-18.
micans. 63-4.
tricolor. 85-6.
Vinctorum. 27-8.

TABANUS. pag. 567-568.

diſpar. 44-5.
triſtis. 44-5.

TENEBRIO. pag. 48-50.

aeneus. 2-3.
brunneus. 15-6.
ellipticus. 15-6.
glabratus. 19-20.
variabilis. 11-12.
violaceus. 2-3.

TENTHREDO. pag. 214-218.

abdominalis. 38-9.
bicincta. 51-52.
fera. 60-1.
furcata. 28-9.
laeta. 10-11.
melanocephala. 38-9.
pallicornis. 31-2.
punctata. 71-2.
ſegmentaria. 33-4.
Stigma. 36-7.
ſtrigoſa. 58-9.
velox. 47-8.

TETRATOMA. pag. 176.

Gazella. 1-2.
ruficollis. 1-2.

TETTIGONIA. pag. 515-517.

brunnea. 35-6.
coſtalis. 22-3.
hyalina. 32-3.
8-guttata. 22-3.
punctata. 23-4.

* THEREVA. pag. 560.

[Syrphus Ent.]

…finis. 4.
…alis. 5.
…aſſipennis. 3.
hemiptera. 2.
obeſa. 6.
ſubcoleoptrata. 1.

TILLUS. pag. 117-118.

…amicornis. 1-2.
Weberi. 1-2.

TINEA. pag. 480-502.

Albinella. 95.
Allionella. 89.
…ntennella. 34.
…pplanella. [Pyralis Ent.] 18.
…rcella. 58.
…urella. 105.
Bergſtraeſſella. 91.
betulinella [Alucita Ent.] 31.
bifaſciella. 33.
bipunctella [Alucita Ent.] 3.
Blancardella. 106.
blandella. 103.
bractella. 28.
Brongniardella. 83.
capitella. 23.
cinctella. 37.
circulella. 11.
Clairvillella. 112.
Clerkella. 99.
Colutella. [Alucita Ent.] 70.
cornella. 41.
cornutella. 63.
Cramerella. 104.
cucullatella. 57.
cydoniella. 98.
Deniſella. 66.
depreſſella [Pyralis Ent.] 22.
10-*guttella.* 102.
dodecella. 49.
dorſella. 13.
Drurella. 101.
Eſperella. 86.
evonymella. 5.
Fabricella. 65.
feſticella. [Alucita Ent.] 111.
flavella. [Alucita Ent. 15.]
flavifrontella. 16.
Forſterella. 85.
funerella. 10.
fuſcella. 57.
Füeslella. 72.
gemella. 24.
Geoffroyella. 62.
Gleichella. 97.
Goedartella. 87.
granella. 74. [alucita ent.]
guttella. 1.
Hellwigella. 114

Hermannella. 87.
Heracleella [Pyralis Ent.] 20.
hortella 100.
inſectella. 47.
Klemannella. 80.
Knochella. 64.
leucatella. 32.
Leuwenhoekella. 76.
limbella. 38.
Linneella. 77.
Liſterella. 61.
cuculbella. 9
marmorella [Alucita variella Ent.] 43.
medicella. [Alucita Ent.] 73.
Merianella. 88.
minutella. [Alucita Ent.] 110.
muscalella. 46.
Müllerella. 93.
nitidella. 40.
obſcurella. 45.
8-punctella. 36.
Oliviella. 59.
oppoſitella [Alucita Ent.] 29
padella. 6.
parvella. [Alucita Ent.] 109.
Paykullella [Alucita Ent.] 108.
pectinella. 48.
pellionella. 53.
Petiverella. 66.
plumbella. 7.
Podella [Alucita Ent.] 107.
populella 17.
praelatella. 26.
punctella. 52.
puſiella. 4. [ei ſequella. ent.
quadrella. 69.
Rajella. 78.
Rhediella. 82.
Roeſella. 75.
rupella. 25.
rutella. 21.
ſalicella. 14.
ſarticella. 55.
Schæfferella. 67.
Schellenbergella. 113.
Schiffermüllerella. 98.
Schreberella. 79.
Schulzella. 92.
Schwarzella. 68.
Seppella. 94.
6-punctella. 30
ſtigmatella. 56.
ſtrigella. 50.
ſtrobilella. 39.
Stroemella. 96.
ſulphurella. 27.
ſyringella. 84.
teſſerella. 44.
Thunbergella. 71.
umbellella [Pyralis Ent.] 19
undella. 12.
variella. 42.
veſtionella. 54.
viduella. 8.
viridella. 35.
vittella. 2.

TIPHIA.

TIPHIA. pag. 254-255.

glabrata. 1-2.
hemiptera. 1-2.
mixta. 10-11.
thoracica. 15-16.

TIPULA. pag. 550-557.

...cta. 30-1.

TRICHIUS. pag. 128-129.

...ctus. 17-18.
piloſus. 17-18.

TRITOMA. pag. 177.

...chella. 4-5.

TROGOSITA. pag. 50-51.

...color. 1-2.
...nuta. 5. 6.
Gigas. 1-2.
picipes. 1-2.

VESPA. pag. 260-265.

...alis. 40-1.
...milis [Sphex Ent.] 66.
...ata. 44-5.
...phica. 101-2.
...dis. 100-1.
...nnenſis. 103.
...atica. 22-3.
...uleopennis. 86.
...dema. 88-9.
labiata. 18-19.
minuta. 65-6.
Morio. 98-9.
myops 40-1.
Neſtor. 42-3.
nitidula. 44-5.
rejecta. 100-1.
Tamula. 78-9.

VOLUCCELLA. pag. 570.

...a. 1-2.

* YPSOLOPHUS. pag. 505-510.

[Alucita, Tinea Ent.]

Alpinus. 14.
autumnalis. 22.
capitatus. 19.
cornutus. 1.
coſtatus. 17.
cylindricus. 8.
dentatus. 16.
dorſatus. 9.
elongatus. 5.
Ephippium. 18.
harnatus. 10.
hemedactylus. 6.
Lucorum. 13.
maculatus. 23.
Nemorum. 12.
Nycthemerul. 21.
Oceae. 7.
ſinuatus [Al. dentella Ent.] 20.
Sylvarum. 11.
unguiculatus. 2.
uſtulatus. 4.
vittatus. 3.
Xylostei. 15.

ZONITIS. pag. 103-104.

nigripennis. 1.
piazata. 7-8.
viridipennis. 2.

Emendanda in Indice alphabetico Entomologiae ſyſtematicae.

Pag. 3 lin. 15 *exoptatum* lege *exoptatam*.
— lin. ult. *effuſa* lege *effuſa*
— 4 — 18 *complectunt* leg. *complectuntur*
— 14 — 21 *violcaea* l. *violacea*
— 44 — 4-5 inſeratur *octoguttata* 72.
— 49 — 19-20. inſeratur *ſedecimguttata* 88. et in columna dextra inſerenda eſt *vigintiguttata* 90.
— 49 — 21-22 inſeratur *ſeptemnotata* 43.
— 49 — 22-23 inſeratur *ſexlineata* 20.
— 53 — 15 *hiereglyphus* leg. *hieroglyphicus*
— 55 — ult. *Blattaniae* leg. *Blattariae*
— 57 — penultimam inter et ultimam inſeratur *lineatus* 302.
— 61 — 3 *Amerianae* leg. *Amerinae*
— 63 — 10 *marginatus* leg. *marginalis*
— 68 — 27 *ſmaragdina* leg. *ſmaragdula*
— 75 — 21 *Chryſeus* leg. *Chryſeis*
— 77 — 20 *Lincius* leg. *Linceus*
— 78 — 23-24 inſeratur *Phidias* 319.
— 79 — 7 *Sylvanus* 337 leg. *Sylv.* 237
— — — 24 *Throx* leg *Thrax*
— — — 28 HEXODORE leg. HEXODON.
— 83 — 21 *Compunctator* leg. *Compunctor*.
— 89 — 11 *ſplendida* leg *ſplendidula*
— 93 — 8 *tenebrans* leg. *terebrans*
— 105 — 5 *pubera* leg. *puber*
— 107 — 14 MYRMELON leg. MYRMELEON
— 108 — 22 num. 88 leg. 38.
— 110 — 2 *Chenopodii* 192 delend.
— — — 35-36 inſeratur *Chenopodii* 192
— 111 — 30 deleat. *Ityux* 13.
— 112 — 4-5 inſerat. *Itynx* 13
— — — ult. *marginata* 250 leg. *marg.* 260.
— 116 — 18 *tibiae* leg. *tibiale*
— 118 — 3 *Archivi* leg. *Achivi*
— — — 16 *Achilles* N. 252 leg. *Ach.* N. 253.
— — — 30-31 inſer. *Amphymedon* T. 45.
— — — 34 deleat. *Amphymedon* T. 45.
— 127 — 3 *Populi* N. 334 leg. *Pop.* N. 343.
— 128 — 14 *Selena* leg. *Selene*
— 135 — 14 *remulata* leg. *remutata*
— — — 25 *prunata* 157 leg. *prun.* 175
— 145 — 5 (*Curſor*) leg. *Curſor* ſine uncinis.
— 156 — 6 *ſpinifex* leg *ſpirifex*
— 158 — 8-9 inſerat. *biguttatus* 36.
— 161 — 2 *Pyraſti* leg *Pyraſtri*.
— 164 — antepenult. TETRUTOMA leg. TETRATOMA.
— 174 — 27 *Conorillae* leg. *Coronillae*.

INDEX ALPHABETICUS

IN

J. C. FABRICII

ENTOMOLOGIAM SYSTEMATICAM,

EMENDATAM ET AUCTAM,

ORDINES, GENERA ET SPECIES

CONTINENS.

HAFNIAE 1796.

APUD PROFT ET STORCH.

PRAEMONENDA.

Nominibus ſpecierum poſtpoſita littera A, eas ſpecies in Tom. IVti Appendice additas eſſe, ſignificat; paginae numero adiecto. — Littera S. iis vero addita eſt, quae in Supplemento, adhuc inedito, deſcribentur. Agonatorum ſolius ordinis nulla ratio habita eſt, quippe qui omnino non abſolutus eſt, et mutatione non levi etiamnum indiget. *) Quamobrem ſola novorum huius ordinis generum nomina hic proponenda cenſebamus, ne iisdem nominibus Auctores ad deſignandas alias res naturales utantur. Ex eadem ratione ſupplementi ſpecies, reliquorum

*) Cuius intereſt, ordinis commutationem diu exoptatam videndi, Fr. Weberi Nomenclatorem Entomologicum Entom. ſyſtem. praefat. et p. 91. ſqq. adeat. Characteres novorum generum ex omni methodo diligentiſſime elaboratos cum deſcriptione et hiſtoria novarum ſpecierum, cel. Daldorf in India, et dein in Europa elaboravit, eosque edendos, Cancrorum collectorum maxima parte adiecta, amico ſuo Hellwigio, Profeſſori Brunsvicenſi, tradidit, quod opus magnam fabularum nebulam diſcutiet, qua nulla alia fere rei naturalis diſciplina magis offuſa eſt.

rum ordinum in indice recenſentur. Is enim praecipuus talium catalogorum uſus habendus eſt, ut tanta rei naturalis nominum confuſio magis diminuatur.

Ubi nomini aliud nomen uncinis ( ) incluſum adiectum videbit Lector, ſciat, ſic nomen mutatum eſſe in Appendice. V. c. Carabus 4-guttatus bis occurrit, eorum ſpec. 80. in Appendice Actaeon vocatus eſt, quod nomen itaque ſic: (Actaeon) — appoſitum, ſuoque loco inſertum eſt.

Cum in eodem genere plures ſpecies idem nomen gerebant, uncina colligens eas conſpiciendas reddit. V. c. Carabus { elevatus. 33. / elevatus. 166. }

Familiae cum characteribus, et eo, quem complectuntur ſpecierum numero, ſub generibus ſuis enumeratae ſunt, ut ſtatim ſpecies familiae ſuae adnumerari poſſint. Rem inutilem plane eſſe, duximus, ſi apud ſingulae ſpeciei nomen pagina repeteretur, tunc quoque cuique numerus Tomi apponendus eſſet. Utrumque numerum apud generis nomen exhibitum vides.

OR-

ORDINES.

Ord. 8.	AGONATA.	Tom. II. pag. 438 — 519.
11.	ANTLIATA.	Tom. IV. pag. 230 — 460.
1.	ELEUTHERATA.	Tom. I. pars a. et b.
9.	GLOSSATA.	Tom. III. pars a. et b.
6.	MITOSATA.	Tom. II. pag. 389 — 397.
5.	ODONATA.	Tom. II. pag. 373 — 388.
4.	PIEZATA.	Tom. II. pag. 100 — 372.
10.	RHYNGOTA.	Tom. IV. pag. 1 — 229.
3.	SYNISTATA.	Tom. II. pag. 63 — 99.
2.	ULONATA.	Tom. II. pag. 1 — 62.
7.	UNOGATA.	Tom. II. pag. 398 — 437.

211. ACANTHIA. Tom. IV. pag. 67—78.

alata. 38.
atra. 4.
Betulae. 26.
campeſtris. 34.
Cardui. 42.
clavicornis. 10.
clavipes. 8.
coriacea. 7.
corticalis. 21.
coſtata. 39.
craſſicornis. 11.
craſſipes. 28.
depreſſa. 22.
eroſa. 29.
faſciata. 15.
flavipes. 3.
gibba. 33.
Goſſypii. 45.
griſea. 27.
grylloides. 6.
Humuli. 43.
laevis. 25.
Lavaterae. 13.
lectularia. 1.
littoralis. 18.
lunata. 20.
maculata. 16.
monſtroſa. 30.
nemoralis. 35.
nigricornis. 9.
pallicornis. 5.
pallipes. 17.
paradoxa. 24.
plana. 23.
pratenſis. 36.
Pyri. 44.
rugoſa. 19.
Sacchari. 40.
ſerrata. 32.
Serratulae. 14.
Sidae. 41.
ſylveſtris. 37.
umbraculata. 31.
vireſcens. 12.
Zoſterae. 2.

249. ACARUS. Tom. IV. pag. 425—434.

Aegyptius. 8.
americanus. 19.
aphidioides. 26.
aureolatus. 15.
Baccarum. 33.
Batatas. 36.
Cajennenſis. 13.
Caraborum. 39.
Coleoptratorum. 38.
coleoptratus. 25.
craſſipes. 21.
croceus. 49.
Dyſenteriae. 31.
elephantinus. 1.
Fucorum. 45.
Fungorum. 46.
geniculatus. 32.
Gymnopterorum. 37.
Hiſpanus. 5.
Holſatus. 16.
Iguanae. 12.
Indus. 18.
Lactis. 30.
lineatus. 14.
Lipſienſis. 10.
littoralis. 44.
longicornis. 43.
marginatus. 11.
motatorius. 24.
Muſcarum. 35.
pallipes. 4.
paſſerinus. 23.
Phaetontis. 41.
Phalangii. 40.
Reduvius. 3.
reflexus. 7.
reticulatus. 17.
Ricinus. 2.
rupeſtris. 42.
ſalicinus. 48.
ſanguiſugus. 6.
Scabicei. 29.
Siro. 28.
telarius. 27.
Tremellae. 47.
undatus. 9.
Veſpertilionis. 22.
vibrans. 20.
Zoſterae. 34.

---

123. ACHETA. Tom. II. pag. 28-33.

aſſimilis. 4.
Braſilienſis. 6.
campeſtris. 11.
Capenſis. 9.
Crucis. 14.
domeſtica. 3.
flavipes. 8.
Gryllotalpa. 1.
Guadeloupenſis. 15.
Hoſpes. 13.
Italica. 16.
maculata. 5.

minuta. 17.
monſtroſa. 2.
Morio. 10.
orientalis. 7.
reticulata. 5.
ſylveſtris. 18.
umbraculata. 12.

121. ACRYDIUM. Tom. II. pag. 25 — 26.

morbilloſum 1.
2-punctatum. 2.
ſubulatum. 3.

165. AESHNA. Tom. II. pag. 383 — 385.

annulata. S.
clavata. 4.
forcipata. 1.
grandis. 2.
Heros. S.
minuta. 5.
variegata. 3.

166. AGRION. Tom. II. pag. 386 — 388.

ciliata. 3.
Coromandeliana. S.
linearis. 5.
nobilitata. 4.
Puella. 2.
Virgo. 1.

A L B U N E A. S.
A L P H E U S. S.

199. ALUCITA. Tom. III. b. p. 330-344.

Alpella. 8.
ariſtella. 28.
aſperella. 21.
Betulinella. 16.
bipunctella. 14.
Calthella. 37.
capitella. 2.
caudella. 29.
Clairvinella. S.
Colutella. 24.
coſtella. 23.
cuprella. 43.
{ dentella. 4.
{ dentella. 49. Degeer

egeerella. 40.
rſiella. 22.
zenbergella. 30.
hippella. 3.
xlebella. 36.
lciella. 46.
llicella. 52.
arella. 9.
rmoſella. 48.
riſchella. 35.
anella. 15.
rpella. 8.
ellwigiella. 8.
Hübnerella. 8.
cteella. 25.
ppella. 18.
ucella. 7.
maculella. 12.
marginella. 13.
mediella. 26.
minutella. 37.
nemorella. 6.
nivella. 17.
nycthemerella. 11.
oppoſitella. 53.
Panzerella. 32.
parvella. 50.
Paykullella. 38.
Perſicella. 19.
pilella. 33.
Podella. 42.
promulella. 39.
Reaumurella. 44.
Robertella. 34.
Scabrella. 27.
Schellenbergella. 5.
ſulphurella. 47.
Sulzella. 41.
Swammerdammella. 31.
ſylvella. 5.
variella. 20.
vindella. 43.
vitella. 10.
Xyloſtella. 1.

---

54. ALURNUS. Tom. I. b. pag. 51.

groſſus. 1.

---

157. ANDRENA. Tom. II. pag. 307 — 314.

aenea. 8.
bicolor. 12.
bidentata. 27.
carbonaria. 22.
cincta. 15.
cingulata. 30.
circulata. 20.
coeruleſcens. 1.
cornuta. 4.
curvipes. 14.
cyanea. 9.
faſciata. 18.
florea. 6.
guloſa. 26.

haemorrhoidalis. 25.
heluola. 11.
hirſuta. 23.
hirtipes. 24.
labiata. 5.
marginata. 10.
metallica. 7.
nigricornis. 28.
nigrita. 17.
pilipes. 21.
rufipes. 2.
ſpiralis. 3.
ſtrigata. 16.
ſuccincta. 31.
tricolor. 13.
vireſcens. 29.
zonata. 19.

33. ANOBIUM. Tom. I. a. pag. 236—238.

Abietis. 9.
Boleti. 6.
Capenſe. 11.
caſtaneum. 4.
micans. 13.
minutum. 12.
molle. 7.
nitidum. 14.
paniceum. 8.
pertinax. 5.
planum. 10.
rufipes. 3.
ſtriatum. 2.
teſſellatum. 1.

227. ANTHRAX. Tom. IV. pag. 256—262.

Abbadon. 23.
Aethiops. 11.
Afra. 7.
Algira. 8.
Belzebub. 14.
capucina. 12.
Cerberus. 1.
Hetruſca. 3.
holoſericea. 9.
Hottentotta. 16.
Ixion. 18.
Lar. 4.
Lucifer. 21.
Maura. 6.
morio. 5.
nigrita. 2.
Sabaeus. 19.
Satyrus. 13.
Sphinx. 20.
Sylvanus. 17.
Tantalus. 15.
Troglodyta. 22.
varia. 10.

42. AN

ANTHRENUS. Tom. I. a. pag. 263—265.

ticornis. 10.
tus. 8.
rio. 2.
ſeorum. 4.
pinellae. 1.
pubeſcens. 7.
Scrophulariae. 3.
ſerraticornis. 9.
varius. 6.
Verbaſci. 5.

ANTHRIBUS. Tom. I. b. pag. 375—378.

binus. 1.
roſtris. 3.
ſus. 4.
roſtris. 2.
niroſtris. 5.
Roboris. S.
ſcabroſus. 6.
ſepicola. 9.
undatus. 7.
varius. 8.

53. APALUS. Tom. I. b. pag. 50-51.

maculatus. 1.
4. maculatus. 2.

95. APATE. Tom. I. b. pag. 360—363.

pucinus. 7.
nutus. 2.
par. 11.
moralis. 6.
nagra. S.
matus. 3.
uita. 5.
batus. 13.
maculatus. 8.
minutus. 15.
Monachus. 4.
muricatus. 1.
ſignatus. 12.
ſinuatus. 9.
tridens. 10.
volvulus. 14.

219. APHIS. Tom. IV. pag. 210—220.

ſinthii. 20.
ris. 11.
toſae. 49.
illeae. 15.
Aegopodii. 33.
Alni. 26.
Aparines. 10.
Arundinis. 8.

Atri-

Atriplicis. 31.
Avenae. 22.
Betulae. 25.
Braſſicae. 41.
burſaria. 9.
Capreae. 3.
Cardui. 16.
Ceraſi. 6.
Corni. 19.
Dauci. 34.
Evonymi. 21.
Fagi. 24.
Fraxini. 23.
Juniperi. 40.
Lactucae. 52.
longiroſtris. 1.
Liguſtici. 46.
Lychnidis. 2.
Mali. 29.
Millefolii. 17.
Nympheae. 18.
Padi. 50.
Papaveris. 38.
Paſtinacae. 13.
Picridis. 32.
Pineti. 45.
Pini. 44.
Piſtaciae. 48.
Populi. 27.
Pruni. 14.
Ribis. 7.
Roboris. 42.
Roſae. 30.
Rumicis. 12.
Quercus. 43.
Salicis. 47.
Sambuci. 4.
Solidaginis. 5.
Sonchi. 53.
Tanaceti. 36.
Tiliae. 39.
Ulmi. 37.
Urticae. 35.
Viburni. 28.
Viciae. 51.
Vitis. 54.

---

158. APIS. Tom. II. pag. 314 — 342.

Acervorum. 36.
Acraenſis. 68.
aenea. S.
aeſtuans. 41.
Africana. 20.
Agrorum. 29.
Amalthea. 52.
Americanorum. 18.
amethyſtina. 51.
analis. 69.
Antiguenſis. 16.
aprica. A. 460.
Arbuſtorum. 24.
argentata. 96.
armata. 56.
autumnalis. 43.
Barbara. 71.
bicincta. 101.
bicolor. 91.
bicornis. 86.

mbylans. 104.
ſilianorum. 40.
yorum. 28.
cephala. 107.
ſra. 19.
loſa. A. 460.
icularia. 57.
olina. 7.
tuncularis. 98.
rana. 59.
ida. 102.
eraria. 67.
cutiens. 114.
nica. 116.
rdata. 109.
aſſipes. 110.
yptarum. 9.
ntata. 108.
midiata. 6.
uncta. 61.
rſata. 64.
eta. S.
eſtris. 23.
ſciata. 85.
eneſtrata. S.
erruginea. 83.
ervida. S.
avifrons. 66.
orea. 118.
Florentina. 74.
fulvipes. 81.
globoſa. 82.
griſea. A. 460.
Guineenſis. 60.
haemorrhoa. 70.
haemorrhoidalis. 106.
hirta. 92.
hirtipes. 49.
Hiſpanica. 17.
holoſericea. 93.
Hortorum. 22.
Hypnorum. 32.
Indica. S.
interrupta. 78.
Ireos. 75.
Italica. 30.
labiata. 120.
lagopoda. 48.
lanata. 90.
lanipes. 113.
lapidaria. 25.
Lapponica. 13.
latipes. 1.
Lucorum. 35.
luctuoſa. 100.
maculata. 77.
manicata. 73.
mellifica. 58.
minuta. 123.
Mniorum. 39.
Morio. 2.
muſcaria. 105.
muſciformis. 103.
Muſcorum. 31.
muſſitans. 53.
myſtacea. 97.
Nemorum. 11.
nidulans. 72.
nidularia. S.
Nigrita. 5.
olivacea. 21.
parietina. 38.

par-

parvula nec pygmaea. A. 461.
plumipes. 55.
pilipes. 54.
Pratorum. 34.
pubeſcens. 95.
punctata. 99.
purpuraſcens. 50.
pygmaea. A. (parvula).
pygmaea. 46.
4-cincta. S.
4-dentata. 112.
rotundata. 80.
ruderata. 10.
rufa. 88.
rufipennis. 89.
rufipes. 62.
rupeſtris. A. (aprica).
rupeſtris. 26.
ſeladonia. A. 460.
ſemicincta. 117.
ſeminuda. 47.
ſenilis. 44.
Sibirica. 33.
ſmaragdula. 122.
Sorocnſis. 12.
ſpinipes. 119.
ſplendida. 4.
ſtictica. 76.
ſubterranea. 37.
Surinamenſis. 14.
ſylvarum. 27.
terreſtris. 8.
thoracica. 63.
tridentata. 115.
tropica. 42.
tuberculata. 84.
Tunenſis. 87.
variegata. 79.
verſicolor. 111.
veſtita. 65.
veterana. 45.
villoſa. 94.
violacea. 3.
Virginica. 15.
viridula. 121.

---

171. ARANEA. Tom. II. pag. 407-428.

1. Fam. oculis  1—14.

2. Fam. oculis  15.

3. Fam. oculis  16—26.

4. Fam. oculis  27.

5. Fam. oculis  28—49.

6. Fam.

ARANEA

6. Fam. oculis 50—52.

7. Fam. oculis 53—62.

8. Fam. oculis 63.

9. Fam. oculis 64—73.

10. Fam. oculis —— 74—79.

uleata. 37.
gulata. 29.
cuata. 65.
gentata. 27.
uatica. 43.
ciularia. 63.
cornis. 13.
lceata. 74.
ncriformis. 6.
Carnifex. 49.
curea. 12.
nerea. 60.
avipes. 50.
uentata. 75.
Diadema. 30.
domeſtica. 21.
dorſalis. 54.
dorſata. 22.
elegans. 79.
extenſa. 1.
faſciata. 28.
fimbriata. 53.
fornicata. 40.
fulvata. 58.

fumigata. 52.
geminata. S.
globoſa. 15.
hexacantha. 39.
hirtipes. 77.
horrida. 16.
impreſſa. 24.
labyrinthica. 41.
laevipes. 25.
latens. 9.
Latro. 19.
liturata. 33.
lobata. 2.
longimana. 3.
longipes. 69.
luſca. 73.
mactans. 11.
maculata. 66.
marmorea. 31.
maxilloſa. 17.
militaris. 35.
myopa. 68.
nigrita. 14.
obſcura. 44.

pal-

pallens. A. 461.
paluſtris. 42.
parallela. A. 461.
pilipes. 67.
pubeſcens. 59.
punctata. 34.
pupillata. 56.
quadrata. 32.
rapax. S.
regia. 4.
rufipes. 70.
ſaccata. 51.
ſanguinolenta. 55.
ſenoculata. 71.
ſexcuſpidata. 76.
ſexpunctata. 48.
ſcalaris. 45.
ſcenica. 57.
ſcopulorum. 72.
ſcorpiformis. 47.
Smaragdula. 18.
ſignata. 10.
ſpinoſa. 36.
Tarantula. 62.
Taurus. 64.
tetracantha. 38.
teſtacea. 23.
13-guttata. 8.
tricuſpidata. 26.
triguttata. 46.
trilineata. 61.
Tribulus. 78.
venatoria. 7.
viatica. 20.
vireſcens. 5.

134. ASCALAPHUS. Tom. II. pag. 95—96.

appendiculatus. 4.
Auſtralis. 5.
Barbarus. 1.
Capenſis. 3.
Cajennenſis. 6.
Italicus. 2.

236. ASILUS. Tom. IV. pag. 376—590.

aeſtuans. 14.
Algirus. 3.
analis. 4.
annulatus. 37.
arcuatus. 50.
ater. 15.
atratus. 19.
auratus. 48.
aureus. 11.
Barbarus. 5.
barbatus. 12.
brunneus. 28.
brunnipes. 35.
Cajennenſis. 45.
calidus. 17.
cinctus. 51.
cingulatus. 41.
Chinenſis. 34.

conopſoides. 59.
crabroniformis. 6.
culiciformis. 61.
cyaneus. 52.
cylindricus. 24.
Diadema. 16.
Ephippium. 7.
faſciatus. 13.
flavus. 18.
forcipatus. 29.
frontalis. 55.
Germanicus. 31.
gibboſus. 8.
gilvus. 22.
glaucius. 46.
groſſus. 1.
haemorrhoidalis. 58.
Hottentotta. 57.
hyalipennis. 54.
limbatus. 26.
linearis. 60.
lineatus. 47.
maculatus. 33.
marginatus. 25.
marginellus. 36.
Maroccanus. 10.
Maurus. 2.
minutus. 63.
Morio. 56.
muſcarius. 62.
nigripes. 39.
nitidulus. 44.
Oelandicus. 53.
Pedemontanus. 9.
plumbeus. 27.
punctatus. 23.
ruficornis. 20.
rufipes. 32.
Sabaudus. 40.
ſtriatus. 49.
ſtylatus. 38.
Teutonus. 43.
tibialis. 30.
tipuloides. 42.
violaceus. 21.

---

180. ASTACUS. Tom. II. pag. 478 — 487.

Boreas. 18.
carcinus. 6.
carinatus. 17.
coeruleſcens. 8.
Crangon. 26.
craſſicornis. 12.
Cylindrus. 15.
Elephas. 4.
emeritus. 21.
fluviatilis. 2.
fulgens. 9.
fulvus. 7.
Groenlandicus. 19.
harengum. 11.
homari. 10.
Homarus. 3.
Hiſtrio. 13.
Locuſta. 24.
Malabaricus. 16.
marinus. 1.

Narval. 5.
Norwegicus. 22.
planatus. 14.
ſerratus. 25.
Squilla. 23.
tettigonus. 27.
varius. 20.

---

100. ATTELABUS. Tom. I. b. pag. 384—392.

aeneus. 23.
aequatus. 20.
alliariae. 27.
angulatus. 13.
Bacchus. 15.
betulae. 37.
betuleti. 16.
bicolor. 18.
bipuſtulatus. 3.
coeruleocephalus. 21.
coeruleus. S.
coryli. 1.
craccae. 28.
cupreus. 22.
cupriroſtris. 25.
curculionoides. 12.
cyaneus. 30.
flavipes. 33.
frumentarius. 35.
fuſcicornis. 9.
fuſciroſtris. 24.
gemmatus. 5.
globoſus. 31.
Hungaricus. 19.
Indicus. 11.
longimanus. 7.
malvae. 32.
nigripennis. 8.
notatus. 6.
Penſylvanicus. 4.
Pomonae. S.
populi. 17.
pubeſcens. 14.
purpureus. 34.
rufiroſtris. 26.
ſellatus. A. 454.
ſorbi. 29.
ſpecioſus. 2.
ſpinoſus. 10.
triſtis. A. 454.
vernalis. 36.

---

150. BEMBEX. Tom. II. pag. 247—252.

Americana. 9.
Carolina. 7.
glauca. 5.
integra. 12
interrupta. 15.
lineata. 10.
lunata. 6.
olivacea. 4.
punctata. 2.
repanda. 8.
roſtrata.

roſtrata. 3.
ruficornis. 16.
ſexfaſciata. 13.
ſignata. 1.
ſpinoſa. A. 458.
ſtriata. 11.
tridentata. 14.

---

226. BIBIO. Tom. IV. pag. 254 — 255.

aenea. 1.
anilis. 9.
flavipes. 3.
florea. 8.
lugubris. 6.
marginata. 4.
nobilitata. 5.
plebeia. 2.
ſtrigata. 7.

---

14. BLAPS. Tom. I. a. pag. 106 — 109.

bupreſtoides. 6.
clathrata. 17.
crenata. 14.
dentipes. A. 439.
dermeſtoides. 7.
emarginata. 9.
excavata. 4.
femoralis. 13.
Gages. 1.
glabra. 15.
granulata. 5.
laevigata. 11.
mortiſaga. 3.
punctata. 16.
ſerrata. A. 439.
ſtriata. 8.
ſulcata. 2.
tibialis. A. 439.
triſtis. 12.
varioloſa. 10.

---

119. BLATTA. Tom. II. pag. 6 — 12.

Aegyptiaca. 3.
Americana. 6.
Auſtralaſiae. 7.
Braſilienſis. 15.
Capenſis. 9.
cincta. 18.
diaphana. 25.
erythrocephala. 8.
Gallica. 11.
Germanica. 22.
Gigantea. 1.
hemiptera. 30.
Indica. 10.
irrorata. 13.
Lapponica. 21.
livida. 23.

longipalpa. S.
maculata. 26.
Maderae. 2.
marginata. 27.
nitidula. 29.
nivea. 12.
oblongata. 28.
Occidentalis. 4.
Orientalis. 17.
Petiveriana. 16.
picta. 19.
reticulata. S.
ruficollis. 24.
Surinamenſis. 5.
variegata. 20.
viridis. 14.

242. BOMBYLIUS. Tom. IV. pag. 407 — 411.

aequalis. 2.
analis. 5.
ater. 12.
Capenſis. 7.
cupreus. 11.
diſcoideus. 6.
fuſcus. 15.
griſeus. 16.
maculatus. 13.
major. 1.
medius. 3.
melanocephalus. 14.
minimus. 10.
minor. 9.
nitidulus. 8.
planicornis. S.
punctatus. 4.
pygmaeus. 19.
ſenilis. 17.
vireſcens. 18.

191. BOMBYX. Tom. III. a. pag. 407 — 487.

Famil. 1. alis patulis 1 — 40.
Famil. 2. alis reverſis 41 — 87.
Famil. 3. alis deflexis 88 — 203.
Famil. 4. alis incumbentibus 204 — 250.

Abas. 38.
Achelous. 33.
Acria. 137.
advena. 141.
Alphea. 118.
Aluco. 48.
Amaſis. 96.
Americana. 81.
Amphimone. 57.
Anachoreta. 125.
Anaſtomoſis. 126.
angulata. 230.
annulata. 238.
antiqua. 216.
apiformis. 87.
argentina. 103.

argulata. 34.
Argus. 24.
Armida. 29.
Atlas. 1.
aulica. 134.
auriflua. 161.
Aurotus. 3.
Auſtralaſiae. 49.
Begga. 154.
bella. 223.
bicolora. 162.
binotata. 247.
biſtrigata. S.
bombella. 234.
Boreas. 21.
brunnea. S.
Bucephala. 99.
Caja. 196.
camelina. 133.
Camelus. 110.
Capenſis. 46.
Capucina. 132.
Caſſandra. 45.
Caſſinia. 164.
caſta. 198.
Caſtalia. 31.
caſtrenſis. 80.
Catax. 71.
Cecropia. 4.
Celſia. 105.
centrolinea. 165.
Certhia. 16.
caeruleocephala. 102.
chryſorrhoea. 160.
Cippus. 127.
communi macula. 148.
compreſſa. 149.
Conſpicillator. 14.
Colon. 214.
Corones. 176.
Coryli. 114.
craſſicornis. 90.
Crataegi. 166.
credula. 211.
Cribrum. 248.
Crini. 243.
Crotalariae. 204.
curtula. 123.
Cyane. 92.
Cynera. 61.
Cytherea. 10.
decora. 104.
deflorata. 202.
deraſa. 237.
Dictaea. 111.
Dione. 9.
Dione. 106.
diſpar. 94.
Dominula. 210.
Dromedarius. 113.
Dryas. 178.
Dumeti. 63.
elegans. 109.
Ephippiger. 122.
Epimethea. 23.
equeſtris. 157.
Eridanus. 167.
Erythrinae. 13.
Everia. 72.
exigua. 173.
Fagi. 51.
faſcelina. 98.

feneſtra. 25.
ferruginea. 78.
feſtiva. 177.
flava. 120.
Flavia. S.
Franciſca. 228.
Franconica. 82.
fuliginoſa. 246.
fulminea. 241.
furcula. 213.
Glorioſae. 242.
Gnoma. 112.
Gonoſtigma. 217.
Graminis. 239.
grammica. 182.
grata. 158.
griſea. 226.
Hebe. 193.
heliophila. 189.
Helops. 100.
heluola. 135.
hepatica. S.
Hera. 209.
Heſperus. 2.
Hibiſci. 60.
Hieracii. 86.
Hippodamia. 18.
Hiſtrio. 221.
hyalina. 203.
Hyphinoe. 91.
Jacobeae. 181.
Janus. 15.
Jeſuita. 229.
ilicifolia. 43.
Ilicis. 84.
illibata. 171.
imperialis. 89.
innocua. 170.
Jo. 37.
Irius. 5.
laeta. 147.
Lagopus. 88.
laneſtris. 68.
Lantanae. 95.
lectrix. 212.
lepida. 156.
leporina. 144.
Liberia. 35.
Lineus. 152.
Lineola. 184.
lota. 145.
lubricipeda. 138.
luctifera. 143.
lugubris. 188.
Luna. 22.
lunigera. 66.
luſca. 55.
lutea. 121.
maculoſa. 199.
Mali. 85.
Matronula. 191.
Megaera. 17.
mendica. 139.
Menete. 201.
Menthaſtri. 140.
Milhauſeri. 150.
militaris. 30.
Monacha. 119.
Mori. 76.
Morio. 116.
munda. 236.
muſcella. 233.

Mylitta. 11.
neuſtria. 79.
nictitans. 19.
nitidula. 169.
nuda. 115.
obſcura. 249.
obſoleta. 155. (175)
ocularia. 59.
oleagina. 101.
ornatrix. 225.
Orientalis. 47.
palpina. 129.
Paphia. 7.
Paradoxa. 218.
Pavonia (minor, media, major.) 32.
pectinella. 235.
Penelope. 26.
pennatula. 183.
perſpicua. 28.
Pini. 62.
Pithyocampa. 74.
Plantaginis. 186.
plumigera. 174.
Polyphemus. 8.
Populeti. 215.
popularis. 240.
Populi. 70.
populifolia. 41.
potatoria. 58.
priverna. 227.
proceſſionea. 73.
Promethea. 12.
Promula. 44.
Proſerpina. 40.
Pruni. 56.
pudibunda. 97.
pudica. 197.
Puella. 207.
pulchella. 224.
punctata. 250.
purpurea. 185.
Pylotis. 222.
quadricincta. 50.
quercifolia. 42.
Quercus. 53.
querna. 131.
ramoſa. 179.
recluſa. 124.
reflexa. 128.
regalis. 93.
repanda. 172.
Ricini. 205.
roſea. 244.
rubea. 117.
Rubi. 65.
rubicunda. 69.
rubricollis. 245.
ruſſula. 180.
rutila. 142.
Salicis. 163.
Salmonea. 39.
ſanguinolenta. 206.
Saturnus. 6.
Semiramis. 20.
Serva. 208.
ſpreta. 151.
Stigma. 54.
ſtrigoſa. 146.
Taraxaci. 83.
Tarquinia. 195.
Tarquinius. 194.

Tau. 36.
teſtacea. S.
tibialis. 168.
transverſa. S.
trepida. 130.
tricolora. 77.
Trifolii. 52.
Tritophus. 108.
Tyrrhea. 27.
Ulmi. 153.
Umber. 220.
undata. 136.
varia. 75.
verſicolora. 64.
veſtita. 232.
viciella. 231.
vidua. 190.
villica. 192.
vinula. 67.
Virginica. S.
Virgo. 200.
vittata. 287.
v. nigrum. 159.
ziczac. 107.
zona. 219.

96. BOSTRICHUS. Tom. I. b. pag. 364—368.

abietinus. 15.
ater. 20.
bidens. 24.
Chalcographus. 5.
crenatus. 10.
cylindrus. 2.
flavicornis. 1.
laricis. 4.
Ligniperda. 14.
melanocephalus. 21.
Micrographus. 8.
minutus. 23.
Monographus. 7.
oleae. 12.
Oleiperda. 11.
Piniperda. 17.
Polygraphus. 6.
pubeſcens. 19.
pygmaeus. 13.
Scolytus. 9.
teſtaceus. 18.
Typographus. 3.
villoſus. 16.
vittatus. 22.
volvulus. A. 454.

99. BRACHYCERUS. Tom. I. b. pag. 379—383.

Algirus. 12.
apterus. 1.
Barbarus. 8.
cornutus. 11.
criſpatus. 10.
globoſus. 5.
inaequalis. 9.
muricatus. 15.
obeſus.

beſus. 4.
ellatus. 2.
tuſus. 13.
oſtratus. 6.
alaris. 3.
Spectrum. 14.
Uva. 16.
verrucoſus. 7. (id. c. Curc. verrucoſa.)

103. BRENTUS. Tom. I. b. pag. 491—494.

Famil. 1. femoribus ſimplicibus 1—4.
Famil. 2. femoribus dentatis 5—10.

Anchorago. 5.
aſſimilis. 2.
barbicornis. 1.
bifrons. 10.
brunneus. 4.
cylindricornis. 9.
diſpar. 8.
monilis. 3.
naſutus. 7.
Volvulus. 6.

97. BRUCHUS. Tom. I. b. pag. 369—374.

abdominalis. 18.
aeneus. S.
analis. 11.
B-ctris. 3.
bipunctatus. 12.
Cacao. 6.
Cilli. 16.
craſſicornis. S.
flavicornis. 24.
gibboſus. 8.
granarius. 15.
maculatus. 22.
marginellus. 10.
Mimoſae. 23.
Nucleorum. 2.
pectinicornis. 26.
Piſi. 5.
punctatus. S.
4-maculatus. 13.
Robiniae. 7.
rufipes. 21.
ſcutellaris. 14.
ſeminarius. 19.
ſerraticornis. 25.
ſpinoſus. 1.
ſuturalis. 17.
Theobromae. 9.
Umbellatarum. 4.
villoſus. 20.

78. BUPRESTIS. Tom. I. b. pag. 185—215

acuminata. 83.
aenea. 31.
affinis. A. 450.
appendiculata. 102.
atomaria. 113.
atra. 117.
attenuata. 9.
aurata. 49.
Aurifer. 22.
aurulenta. 92.
Auſtriaca. 77.
Berolinenſis. 12.
{bicolor. 2.
{bicolor. 103.
biguttata. 115.
bimaculata. 95.
blanda. 48.
canaliculata. 82.
candens. A. 451.
carioſa. 87.
caſtanea. 37.
Chryſis. 36.
{Chryſoſtigma. 57.
{Chryſoſtigma. 71. (Decoſtigma).
collaris. 8.
corruſca. 13.
cruciata. 107.
cuprea. 98.
cyanea. 128.
cyanicornis. 94.
cyanipes. 46.
cylindrica. 67.
decora. 15.
(Decoſtigma.) 71.
depreſſa. 40.
diſcoidea. 127.
dorſata. 56.
elata. 118.
elegans. 52.
elongata. 63.
emarginata. 120.
equeſtris. 39.
excavata. 84.
farinoſa. A. 450.
faſciata. 23.
faſcicularis. 73.
faſtuoſa. 6.
feſtiva. 122.
flavomaculata. 33.
frontalis. 59.
fulgida. 50.
fulminans. 45.
funeſta. 16.
fuſca. 80.
gibboſa. 65.
gigantea. 4.
hirta. 76.
ignita. 28.
impreſſa. 58.
interrupta. 34.
laeta. 124.
linearis. 116.
{lineata. 29.
{lineata. 108.
{lucidula. 24.
{lucidula. A. vid. nitens.
lugubris. 86. lurida.

lurida. 18.
maculata. 32.
manca. 109.
Mariana. 41.
meditabunda. 112.
metallica. 100.
micans. 14.
minuta. 111.
modeſta. 47.
moeſta. 85.
morbilloſa. 21.
Morio. 105.
(nitens.) A. 451.
nitidula. 123.
nobilis. 66.
nobilitata. 101.
novemmaculata. 54.
obſcura. 19.
ocellata. 30.
Onopordi. 75.
ornata. 60.
pavida. 119.
porcata. 55.
pulchra. 64.
punctata. 20.
punctatiſſima. 10.
pygmaea. 110.
quadridentata. 3.
quadrimaculata. 96.
quadripunctata. 106.
rauca. 23.
regalis. 7.
reticulata. A. 451.
Rubi. 91.
ruficollis. 121.
rufipes. 11.
ruſtica. 81.
rutilans. 27.
Salicis. 125.
ſcabra. 69.
ſerrata. 61.
Sibirica. 78.
ſmaragdula. 44.
Sophorae. 126.
ſplendens. 79.
ſternicornis. 35.
ſtriata. 26.
taeniata. 62.
tarda. 99.
tenebricoſa. 89.
Tenebrionis. 90.
terſata. 93.
trifaſciata. 53.
tripunctata. 51.
triſtis. 97.
Trochilus. 70.
Umbellatarum. 104.
umbroſa. 17.
undata. 88.
unidentata. 1.
variolaris. 74.
ventricoſa. 43.
violacea. 38.
vittata. 5.
viridis. 114.
Volvulus. 68.

6. BYRRHUS. Tom. I. a. pag. 84 — 86.

aeneus. 8.
albopunctatus. 3.
ater. 5.
dorſalis. 6.
faſciatus. 4.
Gigas. 1.
minutus. A. 437.
murinus. A. ib.
Pilula. 2.
ſemiſtriatus. A. 437.
varius. 7.

CALAPPA. S.

---

89. CALLIDIUM. Tom. I. b. pag. 318 — 339.

acuminatum. 14.
Aegyptiacum. 80.
aeneum. 6.
agreſte. 21.
alni. 86.
amethyſtinum. 12.
angulatum. 70.
annulare. 79.
atomarium. 63.
arcuatum. 64.
Arietis. 65.
aulicum. 8.
Bajulus. 2.
barbatum. 29.
bicolor. 49.
bifaſciatum. 13.
clavipes. 7.
Colonum. 57.
compreſſum. 31.
cyaneum. 52.
detritum. 72.
ebulinum. 5.
equeſtre. 25.
erythrocephalum. 71.
femoratum. 10.
Fennicum. 3.
flavipes. 40.
flavum. 55.
flexuoſum. 59.
florale. 61.
fugax. 23.
fulcratum. 11.
fulminans. 62.
fulvicolle. 26.
fuſcum. 42.
Gazella. 66.
gibboſum. 83.
glaucum. 73.
griſeum. 30.
Hafnienſe. 46.
hirtum. 27.
ligneum. 39.
lineatum. 33.
luridum. 41.
luſcum. 8.
lynceum. 50.

aſſilienſe. 68.
inutum. 60.
ucronatum. 69.
yſticum. 81.
bſcurum. 1.
rnatum. 77.
icipes. 85.
llicorne. 37.
ebejum. 67.
raeuſtum. 38.
ubeſcens. 28.
uſillum. 53.
ygmaeum. 24.
aucum. 45.
uficolle. 4.
uſipes. 47.
uſſicum. 15.
uſticum. 19.
Salicis. 51.
ſanguineum. 35.
ſericeum. 17.
ſexfaſciatum. 74.
ſpinoſum. 8.
Stigma. 22.
ſtriatum. 48.
ſulcatum. 34.
tenebroſum. 18.
terminans. 8.
teſtaceum. 36.
trifaſciatum. 75.
triſte. 44.
undatum. 56.
unifaſciatum. 84.
variabile. 16.
variegatum. 32.
varium. 58.
Verbaſci. 76.
violaceum. 9.
virens. 82.
vittatum. 20.

86. CALOPUS. Tom. I. b. pag. 303.

ſerraticornis. 1.

175. CANCER. Tom. II. pag. 438 — 467.

1. Fam. Thorace levi: laterib. integerrimis. 1 — 22.
2. Fam. Thorace levi: laterib. inciſis. 23 — 58.
3. Fam. Thorace ſupra hirto aut ſpinoſo. 59 — 102.

aculeatus. 89.
Aegagropila. 59.
aeneus. 56.
angulatus. 38.
araneus. 67.
armiger. 34.
auritus. 102.
barbatus. 76.
biſpinoſus. 27.
Calappa. 54.
ceratophthalmus. 6.
Chabrus. 61.

chelatus. 20.
Chiragra. 93.
condyliatus. 69.
corallinus. 23.
cordatus. 4.
cornutus. 80.
craniolaris. 10.
criſtatus. 74.
Cylindrus. 60.
Defenſor. 32.
depreſſus. 57.
Depurator. 44.
Dromia. 45.
Erinaceus. 75.
exciſus. 12.
feriatus. 47.
floridus. 24.
Forceps. 36.
fornicatus. 50.
Germanus. 101.
Gladiator. 35.
globoſus. 9.
Gonagra. 94.
granarius. 14.
granulatus. 52.
Grapſus. 2.
haſtatus. 33.
hexapus. 22.
Hircus. 66.
holoſericeus. 87.
horridus. 92.
Hyſtrix. 98.
lanatus. 62.
lancifer. 48.
Lar. 100.
longicornis. 21.
longimanus. 96.
longipes. 97.
longiroſtris. 82.
maculatus. 29.
Maenas. 41.
Maja. 90.
mammillaris. 91.
marmoratus. 39.
Maſcaronius. 63.
minutus. 15.
muricatus. 71.
mutus. 3.
naſutus. 64.
noduloſus. 95.
Nucleus. 79.
Ochtodes. 58.
Opilio. 68.
orbiculus. 19.
Ovis. 70.
Pagurus. 49.
parvulus. 43.
pelagicus. 31.
Phalangium. 84.
Pinnophylax. 18.
Pinnotheres. 17.
Piſum. 8.
planatus. 26.
porcellanus. 11.
puber. 86.
punctatus. 78.
puſillus. 16.
pygmaeus. 42.
quadratus. 5.
Quadridens. 88.
raninus. 1.
rhomboides. 28.

roſtratus. 72.
Ruricola. 7.
ſagittarius. 13.
ſanguineus. 30.
Scorpio. 83.
ſeptemſpinoſus. 81.
ſexdentatus. 46.
ſpinifer. 99.
ſpinifrons. 55.
ſuperciliofus. 77.
Tribulus. 73.
tuberculatus. 53.
undecimdentatus. 51.
Urſus. 65.
variegatus. 40.
Veſpertilio. 55.
Victor. 37.
vocans. 25.

29. CANTHARIS. Tom. I. a. pag. 213—221.

analis. 4.
atra. 11.
biguttata. 34.
bimaculata. 13.
bipunctata. 21.
Cardiacae. 35.
Diadema. S.
diſpar. 3.
faſciata. 20.
flavipes. 18.
fulvicollis. 23.
fuſca. 1.
haemorrhoidalis. 15.
laeta. 22.
lateralis. 9.
Lineola. 24.
limbata. 8.
livida. 2.
marginata. 12.
melanocephala. 19.
melanura. 26.
minima. 32.
Morio. 29.
nigra. 30.
nigripes. 25.
nitidula. 28.
obſcura. 6.
pallida. 16.
pallipes. 14.
pellucida. 7.
pulicaria. 31.
ruficollis. 17.
ſmaragdula. 10.
teſtacea. 33.
virideſcens. 5.
vittata. 27.

19. CARABUS. Tom. I. a. pag. 124—168.

Fam. 1. thorace cordato. 1—73.
Fam. 2. thorace poſtice anguſtato. 74—94.
Fam. 3. thorace quadrato. 95—97.

Fam. 4. thorace rotundato margine prominulo obtuſo. 98 — 195.

abbreviatus. 188.
abdominalis. 130.
(Actaeon.) 80.
aeneocephalus. 56.
aeneus. 142.
agilis. 67.
(albipes.) 72.
alternans. 98.
Americanus. 50.
amethyſtinus. 156.
analis. 135.
Andreae. 165.
angulatus. 103.
apricarius. 171.
arenarius. 39.
arvenſis. 17.
aterrimus. 141.
atricapillus. 69.
attelaboides. 35.
attenuatus. 32. vid. *Cychrus.* A.
attenuatus. A. 442.
auratus. 22.
auronitens. 24.
axillaris. A. 441.
azureus. 133.
bicolor. 117.
biguttatus. 184.
binotatus. 119.
bipunctatus. 189.
bipuſtulatus. 164.
bimaculatus. 91.
brevicollis. 113.
calidus. 99.
caliginoſus. S.
Calydonius. 89.
Carnifex. 127.
Carolinus. 8.
caſſideus. 104.
catenulatus. 7.
celer. 190.
Cephalotes. 85.
cinctus. 61.
clathratus. 29.
coeruleſcens. 123.
Comma. 179.
complanatus. 90.
concolor. 14.
convexus. 21.
coriaceus. 3.
crepitans. 53.
Crux major. 158.
Crux minor. 159.
cupreus. 126.
Curſor. 174.
cyaneus. 9.
cyanocephalus. 154.
10-guttatus. 74.
Dianae. 64.
diſcoideus. 146.
Diſcus. 178.
dorſalis. 183.
dorſiger. 140.
{elevatus. 33.
{elevatus. 166.
erythrocephalus. 134.
Exclamationis. 83.
faſciatus. 68.

femoralis. 47.
feneſtratus. A. 443.
ferrugineus. 137.
flavicornis. 45.
flavilabris. S.
fulvicollis. 121.
fulvipes. 43.
fumans. 52.
furcatus. 175.
fuſcus. 150.
geminatus. 12.
Germanus. 167.
gibbus. A. 442.
glabratus. 4.
globoſus. 106.
granulatus. 28.
Guttula. 185.
haemorrhoidalis. 162.
helopioides. 132.
Hiſpanus. 10.
holoſeriecus. 118.
hortenſis. 13.
humeralis. 57.
Hungaricus. 18.
Janus. 51.
impreſſus. S.
Indagator. 107.
Inquiſitor. 109.
integer. S.
interruptus. 87.
irregularis. 15.
lectus. A. 443.
laevigatus. 86.
lateralis. 41.
latus. 129.
lepidus. 124.
leucophtalmus. 36.
Lineola. 136.
lividus. 157.
longicornis. 112.
lunatus. 172.
Maderae. 20.
madidus. 48.
marginalis. A. 440.
marginatus. 147.
marginellus. A. 442.
maxilloſus. 1.
melanocephalus. 153.
meridianus. 177.
metallicus. 96.
micans. 115.
minimus. 195.
minutus. 191.
monilis. 11.
morbilloſus. 26.
multipunctatus. 59.
nigricornis. 143.
nigripennis. A. 442.
Nigrita. 149.
Nimrod. 79.
nitens. 30.
nitidulus. 63.
oblongopunctatus. 60.
oblongus. 71.
oblongus (albipes). 72.
obſcurus. 116.
8-punctatus. S.
oleus. 66.
ovatus. 131.
pallens. 138.
palliatus. S.
pallipes. 151.

parumpunctatus. 144.
piceus. 46.
picicornis. 44.
picipes. 163.
pilicornis. 122.
planus. 37.
politus. 97.
porcatus. 101.
poſticus. S.
praeuſtus. 170.
praſinus. 173.
punctatulus. 120.
punctulatus. 114.
purpureſcens. 6.
pygmaeus. 191.
4-guttatus (Actaeon). 80.
4-guttatus. 181.
4-maculatus. 180.
4-puſtulatus. 70.
quadrum. 152.
reflexus. 102.
reticulatus. 111.
retuſus. 19.
roſtratus. 31. vid. Cychrus.
rubens. 73.
rufeſcens. 169.
rufibarbis. 155.
ruficollis. 65.
ruficornis. 42.
rufipes. 62.
rugoſus. 27.
ſabuloſus. 40.
Schach. 125.
Sclopeta. 54.
Scrutator. 110.
ſeptemguttatus. A. 442.
ſericeus. 100.
ſexguttatus. 74.
ſexmaculatus. 78.
ſexpunctatus. 145.
ſexpuſtulatus. 93.
ſilphoides. 105.
ſmaragdulus. S.
ſpinibarbis. 55.
ſplendens. 23.
St. Crucis. S.
ſtriatulus. 38.
Striola. 95.
ſulcatus. 77.
ſulcatus. A. 443.
Surinamenſis. 139.
ſuturalis. 25.
Sycophanta. 108.
tabidus. 81.
taedatus. 16.
terricola. 49.
teſtaceus. 186.
thoracicus. 2.
tricuſpidatus. 88.
trilineatus. 84.
trilobus. 58.
tripuſtulatus. 92.
triſtis. 193.
truncatellus. 194.
truncatus. 187.
Turcicus. 161.
unicolor. 34.
uſtulatus. 182.
variegatus. 82.
varioloſus. 94.
varioloſus. A. 441.

vaporariorum. 176.
velox. 168.
Venator. 76.
veſtitus. 148.
vittatus. 160.
violaceus. 5.
vulgaris. 128.

---

44. CASSIDA. Tom. I. a. pag. 292—307.

annulata. 57.
Annulus. 18.
affinis. 3.
arcuata. 30.
atrata. 8.
Auſtriaca. 6.
bicolor. S.
bicornis. 44.
bidens. 48.
biguttata. 35.
bimaculata. 57.
binotata. 31.
bipunctata. 69.
bipuſtulata. 65.
bituberculata. 32.
cincta. 13.
clavata. S.
cribraria. 23.
cruciata. 26.
cruenta. 5.
Crux. 27.
cuprea. 66.
cyanea. 46.
deuſta. 22.
diſcoides. 64.
dorſata. 41.
equeſtris. 2.
Exclamationis. 60.
ferruginea. 10.
flava. 51.
gibboſa. 49.
groſſa. 58.
Hebraea. 14.
Jamaicenſis. 42.
inaequalis. 61.
interrupta. 20.
Judaica. 15.
lateralis. 62.
leucophaea. 52.
limbata. 11.
lineata. 59.
margaritacea. 25.
marginata. 39.
marginella. 12.
miliaris. 36.
Murraea. 9.
nebuloſa. 7.
nobilis. 24.
notata. S.
obſcura. 16.
octopunctata. 21.
palliata. 63.
perforata. 43.
punctata. 38.
4-puſtulata. 40.
reticularis. 53.
retiformis. 56.
ſedecimpunctata. 68.
ſexpunctata. 19.

ſexpuſtulata. 67.
ſinuata. 29.
Spinifex. 47.
St. Crucis. A. 446.
ſuturalis. 34.
Taurus. 45.
trifaſciata. 55.
triſtriata. 17.
truncata. 50.
tuberculata. 33.
variegata. 54.
Vibex. 4.
viridis. 1.
vittata. 8.

49. CEBRIO. Tom. I. b. pag. 41 — 42.

Gigas. 1.
fuſcus. 2.

83. CERAMBYX. Tom. I. b. pag. 251 — 261.

Afer. 4.
alpinus. 20.
ater. 17.
balteatus. 42.
barbicornis. 34.
Batus. 18.
bicolor. 31.
bimaculatus. 44.
brevicornis. 48.
Cerdo. 14.
cinereus. 51.
coſtatus. 38.
depreſſus. 32.
Desfontainii. 26.
dimidiatus. 30.
ebulinus. 22.
elegans. 10.
faſciatus. 33.
faſciculatus. 39.
ferrugineus. 19.
feſtivus. 5.
griſeus. 37.
Heros. 15.
hiſpidus. 40.
holoſericeus. 50.
humeralis. 8.
interruptus. 13.
Juvencus. 49.
Kaehleri. 24.
latipes. 11.
longicollis. 52.
longicornis. 46.
longipes. 12.
Lundii. 25.
marginalis. 47.
Morio. 23.
moſchatus. 1.
nebuloſus. 35.
nitens. 3.
obſcurus. 36.
piloſus. 41.
rufipes. 29.
rugicollis. 43.
ſcalaris. 21.

ſeri-

ſericeus. 8.
ſpinicornis. 16.
ſplendidus. 45.
ſtriatus. 28.
ſuccinctus. 27.
ſuturalis. 9.
velutinus. 7.
virens. 2.
vittatus. 6.

205. CERCOPIS. Tom. IV. pag. 47—57.

analis. 7.
angulata. 27.
aptera. 30.
atra. 12.
aurata. 19.
bifaſciata. 40.
biguttata. 35.
capitata. 41.
Carnifex. 15.
coccinea. 4.
coleoptrata. 26.
cruentata. 10.
faſciata. 38.
gibba. 34.
groſſa. 1.
grylloides. 31.
hiſtrionica. 44.
immaculata. 29.
leucocephala. 22.
leucophthalma. 21.
lineata. 24.
maculata. 3.
marginata. 2.
marginella. 20.
nebuloſa. 14.
obſcura. 8.
pedeſtris. 32.
Populi. 45.
praeuſta. 28.
4-faſciata. 17.
reticulata. 46.
rubra. 5.
ruficollis. 36.
ruſtica. 33.
ſanguinolenta. 6.
Schach. 9.
ſpumaria. 18.
ſtriata. 23.
ſtriatella. 43.
trifaſciata. 42.
unifaſciata. 39.
varia. 16.
variegata. 37.
verſicolor. 11.
viridis. 13.
vittata. 25.

231. CERIA. Tom. IV. pag. 277.

61. CEROCOMA. Tom. I. b. pag. 81—83.

lineata. 5.
microcephala. 4.
ruficollis. 6.
Schaefferi. 1.
Schreberi. 3.
Vahlii. 2.

76. CETONIA. Tom. I. b. pag. 124—153.

abbreviata. 76.
acuminata. 78.
Aequinoctialis. 89.
Africana. 61.
arcata. 80.
atromaculata. 55.
aulica. 36.
aurata. 8.
aurichalcea. 71.
bifrons. 3.
Cacicus. 2.
Capenſis. 38.
capucina. 26.
Carmelita. 22.
Carnifex. 29.
Chinenſis. 6.
Chryſis. 24.
clavata. 68.
cordata. 17.
cornuta. 32.
cruenta. 97.
cuprea. 60.
cuſpidata. 16.
diſcoidea. 91.
elata. 52.
elegans. 58.
faſciata. 46.
faſcicularis. 35.
faſtuoſa. 9.
feſtiva. 75.
floralis. 85.
fucata. 69.
fulgida. 64.
funeſta. 82.
Gagates. 66.
glabrata. 30.
glorioſa. 95.
Goliata. 1.
Graculus. 28.
haemorrhoidalis. 79.
hirta. 81.
Hiſtrio. 93.
holoſericea. A. 449.
Hottentotta. 96.
interrupta. 49.
Iris. 65.
Lanius. 27.
limbata. 56.
Lineola. 43.
lobata. 21.
lucida. 25.
lugubris. 92.
lurida. 70.
maculata. 77.
marginata. 40.
marginella. 42.

marmorata. 10.
metallica. 12.
micans. 5.
modeſta. 94.
Morio. 15.
Nigrita. 7.
nitida. 20.
nitidula. 72.
olivacea. 48.
opaca. 14.
ornata. 41.
Philippenſis. 73.
picta. 50.
Polyphemus. 4.
pubeſcens. 13.
punctulata. 84.
purpuraſcens. 37.
quadrimaculata. 59.
quadripunctata. 18.
14 maculata. 86.
5 lineata. 54.
rauca. 31.
rufipes. 19.
ſanguinolenta. 90.
ſemipunctata. 53.
ſignata. 39.
ſinuata. 45.
ſmaragdula. 34.
ſplendida. 57.
ſtictica. 83.
ſtolata. 74.
ſtriata. 44.
Strigoſa. A. 449.
ſulcata. 23.
ſuturalis. 62.
tetradactyla. 67.
thoracica. 47.
trilineata. 51.
triſtis. 33.
variegata. 88.
verſicolor. 87.
viridis. 11.
vittata. 63.

142. CHALCIS. Tom. II. pag. 194 — 198.

aenea. 7.
annulata. 9.
apiformis. 3.
clavipes. 2.
flavipes. 10.
maculata. 11.
minuta. 4.
nigricornis. S.
podagrica. 6.
punctata. 5.
puſilla. 8.
Siſpes. 1.

320. CHERMES. Tom. IV. pag. 221 — 223.

Abietis. 13.
Aceris. 16.
Alni. 12.
Betulae. 11.

Buxi. 5.
Calthae. 9.
Ceraſtii. 4.
Fagi. 6.
Ficus. 17.
Fraxini. 15.
Graminis. 1.
Perſicae. 8.
Pyri. 3.
Salicis. 14.
Sorbi. 7.
Ulmi. 2.
Urticae. 10.

147. CHRYSIS. Tom. II. pag. 238 — 243.

aenea. 17.
amethyſtina. 22.
aurata. 18.
bidentata. 11.
calens. 4.
carnea. 7.
cyanea. 20.
fervida. 16.
feſtiva. 3.
fulgida. 8.
glorioſa. 14.
ignita. 10.
integra. 12.
lucidula. 15.
lyncea. 6.
nitidula. 21.
oculata. 5.
purpurata. 9.
regia. 19.
ſcutellaris. A. 458.
ſmaragdula. 2.
ſplendida. 1.
ſuccincta. 13.

45. CHRYSOMELA. Tom. I. a. pag. 307 — 330.

Adonidis. 23.
aenea. 109.
aeruginea. 116.
Aethiops. 10.
affinis. 13.
Americana. 78.
analis. 93.
areata. 98.
Armoraciae. 112.
Aſiatica. 32.
aucta. 94.
aurata. 87.
Bankii. 16.
Barbara. 95.
bicolor. 12.
bifrons. 34.
bipunctata. 110.
brunnea. 75.
Bulgarenſis. S.
Carnifex. 89.
Centaurii. 40.
cerealis. 76.
clavata.

clavata. 24.
Cochleariae. 113.
collaris. 56.
coriaria. 6.
craſſicornis. 69.
Crotonis. 100.
cuprea. 35.
cyanea. 84.
cyanicornis. 61.
cyanipes. 60.
10-punctata. 62.
Exclamationis. S.
faſtuoſa. 80.
ferruginea. 15.
fervida. 48.
feſtiva. 79.
flavicans. 104.
fucata. 108.
gibboſa. 19.
glabrata. 51.
glorioſa. 82.
Göttingenſis. S.
Graminis. 33.
groſſa. 46.
guttata. 28.
haemorrhoidalis. 107.
Hannoverana. 97.
haemoptera. 37.
Hottentotta. 9.
ignita. 30.
Lamina. 18.
Lapponica. 70.
limbata. 88.
(Linea). 53.
Lineola. 105.
Litura. 103.
lunata. 50.
lurida. 52.
Luſitanica. 14.
luteicornis. 42.
marginata. 91.
marginella. 96.
metallica. 17.
micans. A. 447.
modeſta. 77.
Morio. 5.
nigricornis. 55.
nigrita. 7.
nitida. 86.
notata. 66.
obſcurata. S.
18 guttata. 72.
8-maculata. 20.
pallida. 64.
pallipes. 114.
pectoralis. 102.
Philadelphica. 111.
polita. 49.
Polygoni. 73.
Populi. 44.
praetioſa. 85.
pulchra. 27.
punctatiſſima. 1.
puſtulata. 2.
14-punctata. 29.
5-punctata. 99.
Raphani. A. (nec Galle-
ruca.)
rugoſa. 4.
Rumicis. 67.
Ruſſica. 74.
ſacra. 106.

Salicis. 57.
ſanguinolenta. 90.
ſemiſtriata. 43.
Senegalenſis. 58.
Sehach. 92.
ſcutellata. 101.
Sophiae. 115.
ſpecioſa. 83.
ſplendida. 81.
Staphilaea. 47.
ſtolida. 54.
ſtriata. 65.
Surinamenſis. 31.
ſuturalis. 26.
tenebricoſa. 3.
Tremulae. 45.
tricolor. 41.
trifaſciata. 25.
trimaculata. 22.
triſtis. 36.
undulata. 71.
varians. 38.
viminalis. 59.
violacea. 39.
vittata. 11.
vittata. (Linea). 53.
vulpina. 68.

204. CICADA. Tom. IV. pag. 27—47.

abbreviata. 41.
acuminata. 40.
argentata. 47.
atomaria. 45.
atrata. 19.
aurata. 80.
aurulenta. 26.
barbata. 18.
bicolor. 55.
biguttata. 70.
bipunctata. 6.
bipuſtulata. 79.
brunnea. 68.
clavicornis. 62.
cuniculariа. 15.
cuſpidata. 86.
Cynosbatis. 61.
Diadema. 74.
elongata. 29.
feneſtrata. 36.
ferruginea. 22.
feſtiva. 53.
flaveſcens. 85.
flavicollis. 42.
flavipes. 37.
fulgida. 73.
fuſcata. 4.
griſea. 8. (69).
Hiſtrio. 30.
hyalina. 59.
ignita. 52.
interrupta. 38.
irrorata. 24.
laeta. 44.
lanata. 16.
Lanio. 50.
lateralis. 34.
limbata. 3.
lineata

ineata. 39.
ynœa. 66.
maculata. 78.
marginata. 12.
marginella. 49.
Maura. 57.
minuta. 11.
mixta. 54.
myopa. 27.
nebuloſa. 58.
nervoſa. 64.
nigripennis. 21.
nitipes. 32.
nitidula. (ſplendida.) 83.
nitidula. 87.
obtuſa. 25.
ocellata. 2.
pellucida. 60.
penicillata. 1.
phalaenoides. 5.
picta. 67.
praſina. 46.
punctata. 76.
pygmaea. 13.
guttata. 48.
4-notata. 71.
4-punctata. 14.
4-verrucata. 72.
Quercus. 88.
reticulata. 75.
retuſa. 7.
Roſae. 77.
Serratulae. 63.
(ſplendida). 83.
ſtriata. 51.
ſtriatula. 20.
ſuturalis. 31.
tomentoſa. 17.
triangularis. 82.
tripunctata. 9.
Turca. 56.
Ulmi. 81.
undata. 23.
varia. 65.
variegata. 35.
vittata. 33.
villoſa. 28.
vireſcens. 84.
viridis. 43.
vivida. 10.

---

3. CICINDELA. Tom. I. a. pag. 168—178.

aequinoctialis. 38.
annulata. 8.
biguttata. 3.
aptera. 2.
arenaria. 12.
ſcelaboides. A. 443.
bicolor. 8.
bipunctata. 24.
biramoſa. 28.
Cajennenſis. 36.
campeſtris. 9.
Capenſis. 20.
Carolina. 34.
Catena. 30.
Chinenſis. 18.
cincta. 27.

cyanea.

cyanea. 6.
emarginata. 37.
flexuoſa. 19.
Germanica. 21.
groſſa. 5.
hybrida. 10.
interrupta. 15.
littoralis. 13.
longicollis. 1.
longipes. S.
lunata. 16.
lurida. 17.
marginata. 31.
Maura. 39.
megacephala. 7.
micans. S.
minuta. 40.
obſcura. S.
octoguttata. 72.
quadrilineata. 26.
6-guttata. 29.
6-punctata. 25.
ſylvatica. 11.
trifaſciata. 33.
triſtis. 14.
tripuſtulata. 4.
tuberculata. 22.
unipunctata. 23.
Virginica. 35.

---

212. CIMEX. Tom. IV. pag. 79 — 126.

1. Fam. Scutellati ſcutello longitudine abdominis. 1 — 47.
2. Fam. Spinoſi thorace utrinque ſpina armata. 48 — 98.
3. Fam. Ovati thorace mutico. 99 — 179.

acuminatus. 179.
Aethiops. 174.
agatinus. 133.
Aggreſſor. 95.
albicollis. 75.
albipes. 65.
albolineatus. 32.
albomarginatus. 168.
albomarginellus. 167.
Anchorago. 25.
annulatus. 80.
Annulus. 10.
Arabs. 46.
arcuatus. 12.
Argus. 15.
armatus. 68.
atomarius. 123.
aurantius. 99.
azureus. 115.
Baccarum. 144.
Beryllus. 166.
bicolor. 161.
biguttatus. 164.
bidens. 54.
bioculatus. 157.
bipunctatus. 160.
bipuſtulatus. 70.
brevicornis. 148.
calidus. 117.
Cerinthe. 9.
Cervus. 49.
ciliatus. 93.

ctus. 130.
peatus. 73.
lebs. 119.
ruleus. 166.
idatus. 28.
nator. 87.
brum. 146.
uciatus. 153.
uentus. 135.
llos. 58.
ma. 50.
crepitus. 178.
lirator. 92.
ntatus. 66.
Fontainii. 40.
ſoideus. 154.
par. 7.
ſſimilis. 112.
uraei. 13.
noſus. 121.
ector. 74.
eritus. 84.
ques. 2.
bricii. 14.
errugator. 86.
ſtivus. 151.
briatus. 159.
ricornis. 170.
vipes. 39.
oridanus. 67.
nebris. 142.
liginoſus. 42.
rcatus. 88.
rcifer. 19.
zella. 52.
eniculatus. 136.

Gladiator. 85.
glaucus. 149.
Globus. 36.
gramineus. 158.
grammicus. 26.
gravis. 128.
griſeus. 140.
guttatus. 169.
haemorrhoidalis. 76.
haemorrhous. 69.
hamatus. 97.
Hiſtrio. 165.
Hottentottus. 31.
Janus. 105.
ictericus. 61.
illuſtris. 18.
imperialis. 6.
interſtinctus. 141.
inunctus. 45.
iratus. 120.
irroratus. 34.
Iſerti. 102.
juniperinus. 113.
lanatus. 35.
Lineola. 20.
Litura. 43.
lituratus. 134.
lugens. 175.
Lunula. 64.
luridus. 57.
lynceus. 29.
Lynx. 118.
maculatus. 82.
Maurus. 30.
meditabundus. 129.
melacanthus. 94.

mela-

melanocephalus. 176.
mixtus. 137.
Morio. 171.
mucoreus. 147.
Nigellae. 8.
nigricornis. 59.
nigripes. 101.
Nigriſpinus. 60.
Nigrita. 169.
nigrolineatus. 22.
nobilis. 3.
nubilus. 124.
obſcurus. 106.
oculatus. 79.
oleraceus. 162.
ornatus. 150.
Paedemontanus. 27.
paganus. 17.
pallipes. 38.
papilloſus. 103.
Perditor. 90.
perlatus. 177.
pictus. 163.
Picus. 138.
praſinus. 111.
Pugillator. 89.
pugnax. 83.
punctatus. 62.
Punctum. 100.
Punicus. 71.
4-puſtulatus. 81.
regalis. 5.
rubens. 104.
rubrofaſciatus. 131.
ruficornis. 143.
rufipes. 56.
ruſticus. 33.
rutilans. 108.
rutilus. 152.
Sagitta. 78.
ſanguinipes. 55.
ſcarabaeoides. 37.
Schulzii. 16.
ſcladonicus. 132.
ſemipunctatus. 25.
ſexpunctatus. 11. (126.)
ſignatus. 4. (127).
ſilphoides. 24.
ſmaragdulus. 114.
ſphacelatus. 156.
Spinidens. 77.
ſpinipes. 173.
ſpirans. S.
Stockerus. 1.
ſtolidus. 47.
Tarandus. 53.
Taurus. 48.
torquatus. 107.
trilineatus. 21.
tripterus. 139.
tripunctatus. 122.
triſtis. 172.
triſtriatus. 125.
tuberculatus. 44.
Vacca. 51.
Vahlii. 41.
varius. 63.
velox. 98.
verſicolor. 155.
victor. 91.

duatus. 145.
ttatus. 96.
viridulus. 110.
Ypſilon. 72.

50. CISTELA. Tom. I. b. pag. 42—47.

ruginea. 27. (Gallerucа.)
alis. 12.
guttata. 25.
lica. 29.
color. A. 447.
amboides. 4.
rvina. 1.
erea. 2.
rulea. 10.
onymi. 20.
ruginea. 17.
tiva. 28.
vipes. 19.
vipes. 14.
icata. 8.
rta. 31.
meralis. 21.
turoides. 5.
livida. 3.
Maura. 22.
Morio. 24.
murina. 16.
nigripennis. 11.
Nigrita. A. 447.
pallida. 26.
pallipes. 23.
picipes. 7.
pubeſcens. 32.
ruficollis. 9.
rufipes. 13.
ſexlineata. 33.
ſulphurea. 8.
teſtacea. 6.
thoracica. 18.
varians. 15.
vittata. 30.

27. CLERUS. Tom. I. a. pag. 206—209.

earius. 15.
mios. 13.
arius. 14.
faſciatus. 11.
broniformis. 17.
aneus. 16.
bius. 2.
micarius. 5.
neumoneus. 3.
mutillarius. 1.
8 punctatus. 9.
4-maculatus. 7.
ſexguttatus. 6.
ſphegeus. 4.
Sipylus. 12.
tricolor. 10.
unifaſciatus. 8.

43. COC-

43. COCCINELLA. Tom. I. a. pag. 266—29

abbreviata. 19.
analis. 96.
annulata. 14.
arctica. A. 446.
arcuata. 26.
bifaſciata. 33.
biguttata. 80.
bipunctata. 21.
bipuſtulata. 106.
bisbipuſtulata. 105.
(bis-5-puſtulata). 110.
bis-7-guttata. 86.
bis-6-guttata. 83.
borealis. 58.
Cacti. 99.
canina. 119.
caſſidea. 59.
chryſomelina. 57.
cincta. S.
cingulata. 29.
conglobata. 76.
conglomerata. 75.
10-guttata. 82.
10-maculata. 50.
10-punctata. 49.
10-puſtulata. 109.
10-puſtulata. (bis-5-puſtulata.) 110.
detrita. 79.
diaphana. S.
dilatata. 52.
dimidiata. 10.
diſcolor. S.
diſpar. A. (variegata. A.) 446.
12 guttata. 84.
12-punctata. 51.
12-puſtulata. S.
erythrocephala. 106.
felina. 113.
flexuoſa. 28.
frontalis. 102.
glacialis. 39.
guttatopuſtulata. 112.
haemorrhoidalis. 97.
hieroglyphica. 23.
immaculata. 5.
impunctata. 9.
impuſtulata. 92.
inaequalis. 30.
innuba. 51.
interrupta. 32.
leonina. 117.
limbata. 2.
lineola. 12. (77.)
lunata. 108.
marginata. 1.
marginella. 3.
margine punctata. 11.
M. nigrum. 7.
nitidula. 93.
9-maculata. 47.
9-punctata. 48.
19-punctata. 67.
oblongoguttata. 91.
oblongopunctata. 18.
ocellata. 64.
18-guttata. 89.
18-punctata. 66.
8-guttata. 89.

8-maculata. 46.
8-punctata. 44.
oculata. 98.
parvula. 94.
pantherina. 114.
pardalina. 115.
pubeſcens. S.
4-maculata. 35.
4-notata. 34.
4-puſtulata. 103.
4-verrucata. 104.
14-guttata. 85.
14-maculata. 63.
14-puſtulata. 14.
15-guttata. 87.
5-maculata. 37.
5-punctata. 36.
rivularis. 24.
ſanguinea. 8.
16-guttata. 88.
16-punctata. 65.
7-maculata. 42.
7-notata. 43.
7-punctata. 41.
ſexlineata. 20.
ſexmaculata. 40.
ſexpunctata. 38.
ſexpuſtulata. 107.
ſtriata. 17.
Surinamenſis. 4.
ſuturalis. S.
tigrina. 118.
transverſalis. 45.
13-maculata. 60.
13-punctata. 61.
tricincta. 25.
tricolor. 78.
triſaſciata. 31.
trilineata. 15.
tripunctata. 22.
11-maculata. 54.
11-punctata. 53.
uniſaſciata. 13.
urſina. 116.
variabilis. 101.
{variegata. A. vid. diſpar.
{variegata. 56.
22-maculata. 70.
22-punctata. 69.
20-guttata. 90.
28-punctata. 74.
20-punctata. 68.
24-maculata. 73.
24-punctata. 72.
23-punctata. 71.
villoſa. 95.
vittata. 16.
verſicolor. 62.

---

221. COCCUS. Tom. IV. pag. 224—228.

Aceris. 9.
Adonidum. 4.
Aonidum. 2.
Arbuti. 19.
Betulae. 12.
Cacti. 26.
Capenſis. 3.
Capreae. 17.
Caricae. 8.
Carpini. 13.
Coryli. 11.
Crataegi. 21.

dubius. 27.
Ficus. 7.
Heſperidum. 1.
Ilicis. 6.
Myricae. 16.
Phalaridis. 20.
Piloſellae. 18.
Polonicus. 25.
Quercus. 5.
Ruſci. 15.
Serratulae. 22.
Tiliae. 14.
Ulmi. 10.
Vitis. 23.
Zoſterae. 24.

104. COLYDIUM. Tom. I. b. pag. 495 — 496.

elongatum. 2.
filiforme. 3.
frumentarium. 4.
ſulcatum. 1.

237. CONOPS. Tom. IV. pag. 390 — 393.

aculeata. 2.
erythrocephala. 6.
flavipes. 8.
macrocephala. 7.
picta. 3.
rufipes. 5.
veſicularis. 1.
vittata. 4.

213. COREUS. Tom. IV. pag. 126 — 133.

armiger. 6.
Bellator. 5.
biguttatus. 10.
Calumniator. 16.
Defenſor. 12.
Delirator. 11.
faſciculatus. 14.
Gravidator. 22.
Haſtator. 8.
haſtatus. 21.
hirticornis. 17.
Inſidiator. 15.
Laneiger. 7.
marginatus. 1.
Pugnator. 13.
quadratus. 20.
rhombeus. 19.
Scapha. 2.
ſcorbuticus. 9.
ſpiniger. 3.
ſulcicornis. 18.
venator. 4.

192.

192. COSSUS. Tom. III. b. pag. 3 — 5.

Aeſculi. 4.
Ligniperda. 1.
Pyrinus. 6.
ſcalaris. 5.
Terebra. 3.
unguiculatus. 2.

67. COSSYPHUS. Tom. I. b. pag. 97.

depreſſus. 1.

155. CRABRO. Tom. II. pag. 293 — 302.

albilabris. 31.
bicinctus. 21.
clypeatus. 15.
cornutus. 2.
cribrarius. 14.
dimidiatus. 19.
foſſorius. 3.
geniculatus. 28.
interruptus. 10.
labiatus. 11.
Leucoſtoma. 27.
lineatus. 24.
lugubris. 30.
maculatus. 8.
minutus. 32.
mucronatus. 25.
nitidulus. 6.
peltatus. 13.
pictus. 20.
4-cinctus. 12.
4-maculatus. 4.
4-punctatus. 29.
repandus. 5.
ſcutatus. 16.
ſexcinctus. 9.
ſpinoſus. 1.
ſubterraneus. 7.
tricinctus. 22.
tridens. 18.
triſpinoſus. 26.
uniglumis. 23.
vagus. 17.

C R A N G O N. S.

46. CRIOCERIS. Tom. I. b. pag. 3 — 12.

aulica. 34.
Aſparagi. 41.
Betulae. 11.
bidentata. 2.
bicolor. S.
bifaſciata. 27.
(bimaculata.) 50.
bioculata. 31.

bituberculata. 1.
brunnea. 17.
campeſtris. 44.
cantharoides. 4.
cyanella. 35.
cyanocephala. 40.
12-punctata. 20.
Ebraea. 24.
elongata. 45.
equeſtris. 47.
erythrocephala. 14.
flavipes. 37.
fucata. 33.
fulvicollis. 12.
griſea. 29.
impreſſa. 16.
innuba. 49.
melanocephala. 3.
melanopa. 36.
merdigera. 36.
minuta. 13.
nigripes. 28.
ochreata. 10.
oculata. 30.
pallens. 32.
Phellandrii. 43.
praeuſta. 25.
pygmaea. 8.
{4-maculata. 5.
{4-maculata. (bimaculata.) 50.
4-puſtulata. 15.
14-punctata. 21.
5-punctata. 23.
ſexpunctata. 6.
retuſa. 18.
ruficollis. 22.
rufipes. 39.
ſubſpinoſa. 38.
teſtacea. 9.
trilineata. 46.
unifaſciata. 26.
variegata. 7.
{violacea. S.
{violacea. 42.
vittata. 48.

---

56. CRYPTOCEPHALUS. Tom. I. b. pag. 52—70.

Atraphaxidis. 9.
auritus. 20.
bifaſciatus. 75.
bimaculatus. 31.
bipunctatus. 29.
bipuſtulatus. 74.
Bothnicus. 33.
Bucephalus. 54.
calcaratus. 49.
cinctus. 53.
coerulans. 45.
collaris. 55.
coloratus. S.
concolor. 83.
cordiger. 32.
Coryli. 38.
cupreus. 47.
cyaneus. 52.

10-punctatus. 70.
didymus. 22.
12-maculatus. 11.
12-punctatus. 72.
flaveſcens. A. 448.
flavicollis. 24.
flavifrons. 65.
flavilabris. 63.
flavipes. 64.
frenatus. 34.
glabratus. 58.
Gorteriae. 17.
gracilis. 88.
haemorrhoidalis. 73.
hieroglyphus. 71.
Hiſtrio. 78.
Hordei. 82.
Hübneri. 66.
labiatus. 62.
lactus. 8.
lar. 26.
Lentiſci. 21.
limbatus. 60.
lineatus. 13.
Lineola. 30.
lobatus. 50.
longimanus. 25.
longipes. 1.
lunulatus. 10.
luridus. S.
Koenigii. 80.
marginatus. 27.
maxilloſus. 19.
minutus. 87.
Moraei. 67.
nigripes. 43.
nitens. 57.
nitidulus. 61.
notatus. 77.
obſcurus. 35.
obſitus. 12.
8-guttatus. 68.
8-punctatus. 18.
pallens. 39.
Paracentheſis. 81.
parvulus. S.
Pini. 84.
plagiocephalus. 37.
pubeſcens. 28.
puſillus. 86.
pygmaeus. 89.
4-maculatus. 23.
4-notatus. 7.
4-punctatus. 6.
4-puſtulatus. 76.
15-guttatus. 69.
rubrifrons. 48.
ruficollis. 42.
rufipes. 51.
reticulatus. 85.
Salicis. 3.
Scopolinus. 79.
Scheſtedii. S.
ſericeus. 56.
6-maculatus. 5.
6-notatus. 4.
6-punctatus. 44.
taxicornis. 15.
tridentatus. 14.
trifaſciatus. 41.
trilineatus. S.
trimaculatus. S.

tripunctatus. 2.
variabilis. 8.
variegatus. 40.
venuſtus. 16.
violaceus. 46.
Vitis. 36.
vittatus. 59.

66. CUCUJUS. Tom. I. b. pag. 93—97.

caſtaneus. 6.
coeruleus. 4.
depreſſus. 1.
dermeſtoides. 10.
dubius. 7.
feſtivus. 5.
flavipes. 8.
monilis. 13.
muticus. 12.
pallens. 9.
rufipes. 3.
ſulcatus. 2.
teſtaceus. 11.

240. CULEX. Tom. IV. pag. 400—402.

annulatus. 2.
ciliatus. 6.
equinus. 10.
haemorrhoidalis. 5.
luteſcens. 4.
Morio. 9.
pipiens. 1.
pulicarius. 7.
reptans. 8.
trifurcatus. 3.

102. CURCULIO. Tom. I. b. pag. 394—490.

Famil. 1. Longiroſtres femorib. ſimplicibus. 1—113.
Famil. 2. Longiroſtr. femorib. dentatis. 114—215.
Famil. 3. Longiroſtr. femorib. poſticis ſaltatoriis. 216—225.
Famil. 4. Breviroſtres femorib. muticis. 229—[illegible].
Famil. 5. Breviroſtres femorib. dentatis. 373—405.

Abietis. 144.
abbreviatulus. 175.
abbreviatus. 37.
acridulus. 75.
acuminatus. 358.
adſperſus. (Pollux.) 87.
adſperſus. 328.
aeneus. 46. (Attelabus aen. idem.)
aeſtuans. 213.
Aethiops. 48.
Alauda. 77.
albidus. 275.
albipes. 349.
albo

albolineatus. 403.
Alneti. 391.
Alni. 216.
amoenus. 201.
anguinus. 92.
anguſtatus. 106.
annulatus. 139.
araneus. 163.
Arboreti. 395.
argentatus. 398.
argyreus. 229.
Armeniacae. 51.
articulatus. 282.
Arundinis. 294.
Aſcanii. 108.
aſſimilis. 65.
aterrimus. 189.
Atriplicis. 112.
atriroſtris. 42.
attelaboides. 405.
aurifer. 258.
barbiroſtris. 105.
Bardanae. 107.
Beccabungae. 221.
bicornis. 203.
bidens. 115.
bifaſciatus. 74.
biguttatus. 32.
bilineatus. 33.
bimaculatus. 30.
binotatus. 379.
bipunctatus. 68.
biſulcatus. 387.
bituberculatus. 90.
bivittatus. 342.
Blattariae. 170.
Bombina. 127.
Borraginis. 180.
Braſſicae. 179.
brunneus. 153.
brunniroſtris. 43.
Bufo. 41.
Calcar. 219.
calcaratus. 114. (383).
caliginoſus. 140.
Cameleon. 339.
Camelus. 52.
Campanulae. 55.
canaliculatus. 324.
candidus. 240.
caninus. 304.
Capenſis. 354.
capiſtratus. 359.
Capreae. 67.
carbonarius. 188.
Carpini. 69.
Caſtor. 62.
Ceraſi. 190.
Ceraſorum. 200.
cervinus. 317.
Chimaris. 129.
Chryſis. 233.
cineraſcens. 246. (305).
clavus. 367.
cloropus. 323.
collaris. 388.
Colon. 29.
Coloſſus. 5.
cornutus. 117.
coronatus. 123.
Coryli. 301.
coſtatus. 283.

 craſſi-

craſſipes. 111.
crenulatus. 279.
cretaceus. 245.
cribrarius. S.
criſpatus. 362.
cruciatus. 13.
cruentatus. 3.
Crux. 81.
cultratus. 363.
curvicornis. 397.
curvipes. 263.
curviroſtris. 47.
cyanicollis. 119.
cyanipes. 259.
cylindricus. 103.
cylindriroſtris. 136.
Cynarae. 28.
decorus. 238.
dentifer. 396.
dentipes. 145.
depreſſiroſtris. 351.
depreſſus. 208.
Diadema. 299.
didymus. 177.
dimidiatus. 40.
diſpar. 276.
diſtinctus. 272.
dorſalis. 78.
dorſatus. S.
Druparum. 205.
dubius. 141.
Echii. 176.
elongatus. 215.
emarginatus. 270.
emeritus. 360.
Equiſeti. 39.
Eryſimi. 70.
eſuriens. 196.
Exclamationis. 83.
Fagi. 226.
faſciatus. 15.
faſcicularis. 131.
ferrugatus. 96.
ferrugineus. 8.
feſtivus. 44. (345).
filiformis. 102.
flaveſcens. 251.
floralis. 60.
Fragariae. 227.
Fraxini. 206.
frigidus. 156.
fulvicornis. 308.
fulvipes. 306.
fulvus. 256.
fuſcomaculatus. 376.
Gagates. 18.
Gages. 97.
geminatus. 297.
gemmatus. 384.
Germanus. 166.
gibber. 255.
gibbus. 157.
Gigas. 1.
glandifer. 372.
glaucus. 273.
globifer. 370.
gramineus. 298.
granarius. 88.
gravis. 172.
greſſorius. 296.
griſeus. 292.
guloſus. 194.

guttatus. 130.
Guttula. 174.
haemorrhoidalis. 181.
hauſtellatus. 198.
hebes. 138.
hemipterus. 9.
hirſutulus. 312.
hiſpidulus. 311.
hiſtrionicus. 346.
Hortorum. 218.
hyſtrix. 132.
Jacea. 24.
Jamaicenſis. 120.
Ilicis. 224.
imperialis. 231.
impreſſus. 348.
inaequalis. 357.
incanus. 281.
Indus. 6.
interruptus. 285.
Jota. 225.
Iris. 389.
irroratus. 150.
Lacerta. 319.
lacteus. 242.
laevigatus. 333.
Lamii. 178.
Lapathi. 149.
lateralis. 253.
Lemnae. 82.
lepidopterus. A. 454.
Liguſtici. 377.
{ limbatus. 12.
{ limbatus. 314.
linearis. 110.
lineatus. 202.
lineola. 109.
litura. 183.
lividus. 343.
longimanus. 287.
longipes. 4.
lunatus. 303.
luridus. 154.
Luſitanicus. 278.
Lymexylon. 113.
Lythri. 73.
Mali. 393.
Mangiferae. 161.
marginatus. 235.
marginellus. 352.
{ marmoratus. 133.
{ marmoratus. 267.
maxilloſus. 331.
meditabundus. 159.
melancholicus. 284.
melanocardius. 11.
melanocephalus. 207.
Meles. 300.
mendicus. 19.
metallicus. 202.
micans. 289.
miliaris. 118.
mixtus. 101.
modeſtus. 250.
moerens. 295.
morbilloſus. 264.
Morio. 386.
mucoreus. 124.
mucronatus. 95.
multiguttatus. 146.
multipunctatus. 325.
muricatus. 401.
murinus. 290.

naſutus. 197.
nebuloſus. 265.
niger. 332.
nigriroſtris. 56.
Nigrita. 381.
nitens. 38.
nitidulus. 239.
niveus. 241.
noduloſus. 368.
notatus. 104.
19-punctatus. 236.
nubilus. 380.
Nucum. 192.
obliquus. 274.
oblongus. 400.
obſcurus. 330.
ocellatus. 158.
8-lineatus. 98.
octotuberculatus. 248.
ocularis. 27.
Onopordi. 22.
Oryzae. 89.
ovatus. 402.
paganus. 7.
palliatus. 257.
pallidus. 394.
Palmarum. 2.
paraplecticus. 91.
Paraſita. 295.
parvulus. 315.
pericarpius. 63.
perlatus. 271.
picipes. 385.
piciroſtris. 58.
Picus. 404.
pillularius. 371.
piloſus. 217. (309).
Pineti. 20.
pinguis. 374.
Pini. 21.
Plantaginis. 85.
planus. 25.
pollinoſus. 252.
(Pollux. 87.)
Polygoni. 291.
Pomorum. 209.
Populi. 228.
Porculus. 269.
proboſcideus. 193.
Pruni. 50.
Pſeudacori. 61.
pulcher. 344.
pulverulentus. 243.
punctatulus. 280.
punctatus. 329.
punctulatus. 26.
punctum. 31.
Pupillator. 147.
Puſio. 125.
Pyri. 390.
4-dens. 365.
4-maculatus. 71.
4-puſtulatus. 100.
4-ſpinoſus. 366.
4-tuberculatus. 53.
Quercicola. 64.
Quercus. 79.
5-punctatus. 173.
Raphani. 185.
raucus. 327.
regalis. 234.
repandus. 260.

reticulatus. 148.
rivuloſus. 350.
Rohrii. 347.
roreus. 142.
roridus. 266.
rotundatus. 334.
Rubetra. 17.
rubifer. 369.
ruficollis. 307.
ruficornis. 322.
Rumicis. 86.
Salicariae. 59.
Saliceti. 220.
Salicis. 222.
ſanguinolentus. 14.
ſcaber. 134.
ſcabratus. 76.
ſcabriculus. 313.
Scirpi. 49.
Scorpio. 128.
Scrophulariae. 167.
ſcutellaris. 286.
16-punctatus. 237.
ſeminulum. 321.
ſemipunctatus. 99.
Senegallenſis. 121.
ſervus. 249.
6-guttatus. 153.
6-vittatus. 355.
Siſymbrii. 66.
ſmaragdulus. 246.
Solani 171.
ſordidus. 34.
ſpectabilis. 373.
Spengleri. 341.
ſpinifex. 288.
ſpinipes. 126.
ſplendidulus. 262.
ſplendidus. 230.
ſqualidus. 165.
ſquamoſus. 244.
Statua. 152.
ſticticus. 336.
Stigma. 137.
ſtolidus. 155.
ſtriatellus. 93.
ſtriatus. 16.
ſtriatus. 318.
Strix. 164.
ſtultus. 162.
ſtupidus. 160.
ſuccinctus. 338.
ſuillus. 35.
ſulcatus. 382.
ſulciroſtris. 268.
ſumptuoſus. 232.
ſuturalis. 71.
taeniatus. 214.
Tamariſci. 261.
Taurus. 116.
tenuiroſtris. 204.
teſſellatus. 36.
teter. 54.
Thapſus. 168.
Tortrix. 211.
Tragiae. 45.
Tremulae. 212.
Tribulus. 364.
tricinctus. 151.
tridens. 375.
trifaſciatus. 15.
triguttatus. 293.

trimaculatus. 182.
triſtis. 326.
Troglodytes. 187.
truncatulus. S.
tuberculatus. 361.
Umbellatarum. 94.
undatus. 310.
unifaſciatus. 72.
Urſus. 23.
valgus. 337.
validus. 122.
variabilis. 57.
varians. 186.
variegatus. 10.
varioloſus. 335.
varius. 199.
velox. 320.
venuſtus. 84.
Verbaſci. 169.
verrucoſus. 353.
veſpertinus. 392.
Vetula. 277.
villoſus. 184.
viminalis. 223.
violaceus. 191.
viridanus. 399.
viridicollis. 316.
viridis. 254.
vittatus. 340.
Vitulus. 356.
Volvulus. S.
vorax. 210.
Zebra. 378.

CYCHRUS. Append. 441.

attenuatus. 2.
roſtratus. 1.

183. CYMOTHOA. Tom. II. pag. 503

acuminata. 18.
Americana. 14.
albicornis. 20.
aquatica. 8.
Aſilus. 4.
aſſimilis. 24.
bicaudata. 12.
Ceti. 21.
chelipes. 11.
emarginata. 19.
Entomon. 7.
falcata. 3.
Guadeloupenſis. 5.
imbricata. 2.
linearis. 10.
marinus. 9.
oceanica. 22.
Oeſtrum. 6.
paradoxa. 1.
phyſodes. 16.
Pſora. 15.
Scopulorum. 13.
ſerrata. 23.
ſpinoſa. 17.

137. CYNIPS. Tom. II. pag. 100 — 104.

adſcendens. 1.
Americanae. 15.
aptera. 22.
Capreae. 13.
compreſſa. A. 455.
Fagi. 11.
Glecomae. 3.
Italica. 18.
longipennis. 21.
megacephala. 17.
pſenes. 19.
Quercus baccarum. 4.
Quercus folii. 5.
— inferus. 6.
— pedunculi. 8.
— petioli. 7.
— ramuli. 9.
— tojae. 10.
Roſae. 2.
ruficornis. 16.
Salicis ſtrobili. 14.
Sycomori. 20.
viminalis. 12.

244. CYTHEREA. Tom. IV. 413 — 414.

aurea. 2.
obſcura. 1.

32. DERMESTES. Tom. I. a. pag. 227 — 235.

bicolor. 10.
bidentatus. 29.
bipunctatus. 21.
brachypterus. 46.
cadaverinus. 3.
carnivorus. 2.
cellaris. 41.
Chinenſis. 35.
crenatus. 8.
felinus. 12.
feneſtralis. 38.
Fimetarii. 22.
fumatus. 23.
fuſcus. 25.
hirticollis. 13.
lardarius. 1.
limbatus. 37.
lunatus. 27.
Lycoperdi. 20.
macellarius. 4.
minutus. 42.
murinus. 14.
nigripes. 31.
obſcurus. 32.
pedicularius. 43.
pellio. 5.
picipes. 30.
ruficollis. 18.
rufipes. 17.
ſanguinicollis. 19.
ſcaber. 34.
Scanicus. 36.

Serra. 40.
6-dentatus. 26.
teſſellatus. 15.
teſtaceus. 33.
tigrinus. 9.
tomentoſus. 24.
trifaſciatus. 7.
undatus. 6.
unidentatus. 28.
Urticae. 45.
variabilis. 39.
20-guttatus. 8.
violaceus. 16.
vulpinus. 11.

113. DIAPERIS. Tom. I. b. pag. 516 — 517.

Boleti. 1.
violacea. 2.

74. DONACIA. Tom. I. b. pag. 115 — 118.

clavipes. 7.
craſſipes. 1.
dentipes. 3.
Equiſeti. 8.
Feſtucae. 2.
Hydrocharis. 10.
nigra. 6.
Nympheae. 4.
faſciculata. 8.
Sagittariae. 5.
ſimplex. 9.

D O R I P P E. S.

162. DORYLUS. Tom. II. pag. 365 — 366.

heluolus. 1.

D R O M I A. S.

58. DRYOPS. Tom. I. b. pag. 74 — 76.

aenea. 2.
cyanea. 5.
femorata. 1.
lineata. 4.
livida. 3.
marginata. 6.
rufifrons. 8.
vittata. 7.

24. DYTISCUS. Tom. I. pag. 187—202.

breviatus. 29.
ilis. 33.
color. 39.
punctatus. 22.
puſtulatus. 20.
lidus. 27.
ryſomelinus. 48.
curus. 13.
nctus. 21.
nereus. 15.
nfluens. 55.
ſtalis. 2.
ſſicornis. 66.
rux. 59.
-punctatus. 18.
preſſus. 41.
orſalis. 42.
2-puſtulatus. 50.
ythrocephalus. 35.
ciatus. 9.
neſtratus. 23.
vipes. 67.
iginoſus. 19.
leus. 11.
minus. 60.
bbus. 30.
anularis. 54.
iſeus. 16.
emorrhoidalis. S.
alenſis. 52.
ermanni. 28.
ybneri. 24.
marginatus. A. 444.
preſſus. 57.
aequalis. 62.
irroratus. 32.
Lanio. 12.
lateralis. S.
latiſſimus. 1.
limbatus. 6.
lineatus. 61.
lituratus. 47.
maculatus. 34.
marginatus. 3.
minutus. 63.
Nigrita. 69.
notatus. 38.
obliquus. 56.
8-puſtulatus. 51.
ovatus. 45.
paluſtris. 44.
parvulus. 71.
picipes. 46.
pictus. 68.
planus. 36.
punctulatus. 4.
puſillus. 70.
pygmaeus. 64.
reticulatus. 65.
Roeſelii. 5.
ruficollis. 7.
rufifrons. 53.
rufipes. 40.
ſemipunctatus. 58.
6-puſtulatus. 43.
ſignatus. 49.
ſtagnalis. 25.
ſticticus. 17.
ſtriatus. 10.
ſulcatus. 8.

trans-

tranſverſalis. 26.
uliginoſus. 31.
varius. 37.
vittatus. 14.

21. ELAPHRUS. Tom. I. a. pag. 178 — 18

aquaticus. 5.
biguttatus. 7.
flavipes. 4.
riparius. 2.
ſemipunctatus. 6.
ſtriatus. 3.
uliginoſus. 1.

79. ELATER. Tom. I. b. pag. 216 — 235

Advena. 75.
aeneus. 31.
analis. 63.
aterrimus. 24.
atomarius. S.
balteatus. 59.
biguttatus. 78.
bimaculatus. 79.
bipuſtulatus. 88.
brunneus. 53.
bupreſtoides. 84.
{ caſtaneus. 40.
{ caſtaneus. (caſtanipes). 46.
(caſtanipes). 46.
coccus. 8.
cruciatus. 38.
cupreus. 37.
denticollis. A. 451.
elegans. 64.
elongatulus. 60.
Ephippium. 56.
equeſtris. S.
faſciatus. 29.
faſcicularis. 2.
ferrugineus. 18.
feſtivus. 87.
filiformis. 48.
flabellicornis. 1.
flavipes. 45.
foveatus. 5.
fulgens. 22.
furcatus. 34.
fuſcipes. 13.
haematodes. 54.
holoſericeus. 27.
ignitus. 12.
impreſſus. 32.
inaequalis. 23.
lateralis. A. 452.
ligneus. 16.
limbatus. 73.
linearis. 43.
lineatus. 9.
livens. 41.
longicollis. 67.
luridus. 4.
luſcus. 7.
maculatus. 47.
marginatus. 50.
melanocephalus. 61. melc

meſomelus. 42.
minutus. 71.
murinus. 26.
niger. 25.
nitidulus. 76.
noctilucus. 10.
notatus. 86.
obſcurus. 44.
oculatus. 6.
pallens. 72.
pallipes. 68.
pectinicornis. 33.
phoſphoreus. 11.
piloſus. 66.
politus. 82.
porcatus. 19.
praeuſtus. 57.
pulchellus. 77.
pygmaeus. 85.
4-maculatus. 14.
4 maculatus. 81.
4-puſtulatus. 89.
riparius. 74.
rubiginoſus. 15.
ruficollis. 52.
rufipes. 70.
rufus. 17.
ſanguineus. 55.
6-guttatus. 83.
ſpecioſus. 3.
Sputator. 62.
ſtriatus. 69.
ſulcatus. 20.
ſuturalis. 35.
Syriacus. 39.
teſſelatus. 28.
teſtaceus. 58.
thoracicus. 51.
trimaculatus. 80.
triſtis. 49.
variabilis. 65.
varius. 30.
virens. 21.
vittatus. 36.

25. ELOPHORUS. Tom. I. a. pag. 204—205.

aquaticus. 1.
crenatus. 6.
elongatus. 3.
flavipes. 5.
humeralis. 4.
minimus. 8.
nubilus. 2.
pygmaeus. 7.

241. EMPIS. Tom. IV. pag. 403—407.

Borealis. 1.
ciliata. 9.
cinerea. 12.
clavipes. 4.
cylindrica. 2.
flavipes. 19.
forcipata. 6.
fuſcipes. 14.

livida. 8.
maculata. 15.
marginata. 3.
Maura. 7.
melanocephala. 21.
minuta. 18.
Morio. 11.
nigripennis. 20.
nigripes. 13.
pennipes. 5.
plumbea. 17.
ſtercorea. 16.
teſſelata. 10.

128. EPHEMERA. Tom. II. pag. 68 — 71.

Fam. 1. cauda triſeta. 1 — 7.
Fam. 2. cauda biſeta. 8 — 16.

albipennis. 12.
bioculata. 9.
brevicauda. 7.
culiciformis. 14.
diptera. 16.
fuſcata. 11.
halterata. 6.
horaria. 13.
lutea. 2.
marginata. 4.
Maroccana. 3.
nigra. 10.
ſtriata. 15.
venoſa. 8.
veſpertina. 5.
vulgata. 1.

9. ERODIUS. Tom. I. a. pag. 92 — 93.

gibbus. 2.
minutus. 4.
planus. 3.
teſtudinarius. 1.

48. EROTYLUS. Tom. I. b. pag. 35 — 40.

abdominalis. 14.
alternans. 17.
amethyſtinus. 25.
bicolor. 26.
cupreus. 21.
concatenatus. 8.
dilatatus. 23.
faſciatus. 15.
gemmatus. 12.
gibboſus. 6.
giganteus. 1.
Hiſtrio. 4.
limbatus. 20.
longimanus. 13. Morio.

Morio. 19.
nebuloſus. 22.
notatus. 7.
punctatiſſimus. 10.
5 punctatus. 9.
reticulatus. 2.
rufipes. 27.
6-faſciatus. 3.
ſmaragdulus. 24.
Surinamenſis. 18.
teſtaceus. 5.
variegatus. 11.
Zebra. 16.

---

159. EUCERA. Tom. II. pag. 343—345.

antennata. 7.
atricornis. 2.
glauca. 4.
griſea. 6.
linguaria. 5.
longicornis. 1.
Tumulorum. 3.

---

141. EVANIA. Tom. II. pag. 192—194.

Appendigaſter. 1.
faſciata. 3.
maculata. 2.
minuta. 5.
Punctum. 6.
ſeſſilis. 4.

---

118. FORFICULA. Tom. II. pag. 1—5.

albipes. 6.
annulata. 11.
auricularia. 1.
biguttata. 4.
bipunctata. 3.
dentata. 10.
elongata. 13.
erythrocephala. 12.
flavipennis. 17.
flavipes. 5.
flexuoſa. 9.
gigantea. 2.
Herculanea. S.
minor. 7.
Morio. 15.
pallipes. 16.
paralella. 14.
pygmaea. 8.

---

161. FORMICA. Tom. II. pag. 349—365.

acervorum. 38.
Aegyptiaca. 29.
albipennis. 19.
Ammon. 48.
Antiguenſis. 30.
arenaria. 46.
attelaboides. 45.
atrata. 54.
Auſtralis. 41.
Barbara. 26.
bicolor. 5.
bidens. 42.
bihamata. 49.
binodis. 32.
biſcutata. 43.
caeſpitum. 35.
cephalotes. 52.
clavata. 44.
cineraſcens. 15.
compreſſa. 2.
conica. S.
didyma. 7.
elongata. 16.
erythrocephala. 6.
ferruginea. S.
flava. 34.
flaveſcens. 12.
foetens. 18.
forficata. 56.
fuſca. 11.
groſſa. 40.
Guineenſis. 31.
guloſa. 55.
haemadota. 59.
hamata. 58.
Herculeana. 1.
maculata. 25.
maxilloſa. 60.
megacephala. 47.
melanocephala. 13.
militaris. 50.
nigra. 10.
obſoleta. 21.
omnivora. 33.
pallipes. 28.
pubeſcens. 9.
4-dens. 51.
4-punctata. 22.
roſtrata. 57.
rubra. 14.
rufa. 8.
rufibarbis. 20.
rufipes. 4.
ſaccharivora. 24.
6-dens. 53.
6-guttata. 17.
ſmaragdina. 3.
Tuberum. 36.
uniſpinoſa. 39.
vagans. 37.
viatica. 27.
vireſcens. 23.

201. FULGORA. Tom. IV. pag. 1—8.

aſcendens. 11.
candelaria. 4.
Diadema. 3.
Europaea. 19.
faſciata. 12.
feneſtrata. 18.
feſtiva. 17.
flammea. 8.
flaveſcens. 23.
hyalinata. 16.
laternaria. 1.
limbata. 21.
lucernea. 7.
marginata. 25.
minuta. 20.
noctivida. 6.
obſcurata. 10.
pallipes. 15.
pellucida. 22.
phosphorea. 5.
plana. 14.
ſerrata. 2.
ſtriata. 24.
tenebroſa. 9.
truncata. 13.

177. GALATHEA. Tom. II. pag. 471—473.

amplectens. 4.
gregaria. 3.
ſtrigoſa. 1.
rugoſa. 2.

47. GALLERUCA. Tom. I. b. pag. 12—35.

abdominalis. 47.
Abſinthii. 15.
advena. 98.
aequinoctialis. 73.
aeruginea. S. nec Ciſtela aer.
aeſtuans. 70.
{albicollis. 66.
{albicollis. 76.
Alni. 13.
Anglica. 92.
atra. 105.
atricilla. 89.
Avicenniae. 24.
(Baſſiae). 14.
Betulae. 19.
bicolor. 69.
bifaſciata. 67.
biguttata. 59.
bimaculata. 1.
Boviſtae. 34.
Braſſicae. 103.
Cajennenſis. 8.
calcarata. 27.
calida. 72.
Calmarienſis. 46.
Capreae. 40.
Caroliniana. 55.

Cerasi. 43.
{ cincta. 41.
{ cincta. 62.
coccinea. 31.
concolor. 16.
crenata. 6.
cruciata. 32.
cruenta. 30.
denticornis. 52.
diſcoidea. 56.
dorſalis. 91.
12-punctata. 12.
elongata. S.
equeſtris. 61.
Erucae. 75.
erythrocephala. 87.
Euphorbiae. 106.
exoleta. 100.
famelica. 68.
faſciata. 3.
flavicornis. 5.
fulvicollis. 77.
fulvicornis. 83.
fuſcipes. 95.
glabrata. 57.
Guadelupenſis. 17.
hemiſphaerica. 107.
Helxines. 82.
Holſatica. 101.
Hortorum. 111.
Hyoſcyami. 79.
Jamaicenſis. 14. (vid. Baſſiae).
Lactucae. 25.
Lauſoniae. S.
Lineola. 38.
littoralis. 7.
{ livida. 21.
{ livida. 44.
melanura. 45.
Mercurialis. 97.
Modeeri. 85.
morbilloſa. 29.
Morio. 48.
Napi. 78.
Naſturtii. 90.
Nemorum. 104.
nigricornis. 53.
nigripennis. 9.
nigripes. 80.
nitidula. 81.
nobilitata. 64.
Nympheae. 39.
oleracea. 74.
pallens. 58.
palliata. 42.
picea. 18.
{ picta. 51.
{ picta. 63.
punctulata. 28.
quadrifaſciata. 65.
quadriguttata. 60.
— maculata. 35. (Criocer. bimaculata.)
— { puſtulata. 33.
— { puſtulata. 93.
Raphani. 26. (Chryſom.)
ruficauda. 23.
ruficollis. 4.
ruficornis. 96.
rufipes. 94.
ruſtica. 11.

ſanguinea. 49.
ſemiaenea. 86.
ſericea. S.
Siſymbrii. 88.
S. littera. 109.
St. Crucis. 110.
Surinamenſis. 108.
tabida. 102.
Tanaceti. 10.
tenella. 50.
teſtacea. 2.
teſtacea. 99.
thoracica. 54.
Tranquebarica. S.
tricolor. 20.
triloba. 37.
trifaſciata. 84.
20-punctata. 36.
Vitellinae. 22.
Volkameriae. 71.

185. GAMMARUS. Tom. II. pag. 514—519.

Ampulla. 1.
Cancellus. 4.
carinatus. 3.
corniger. 8.
Eſca. 13.
gibboſus. 12.
linearis. 9.
Locuſta. 6.
longicornis. 5.
Meduſarum. 14.
nugax. 2.
Pulex. 7.
ſalinus. 10.
ſtagnalis. 11.

216. GERRIS. Tom. IV. pag. 187—193.

anguſtatus. 14.
apterus. 21.
clavipes. 20.
culiciformis. 7.
currens. 22.
curſitans. 17.
filiformis. 12.
Filum. 15.
Foſſarum. 3.
lacuſtris. 1.
longipes. 16.
Mantis. 8.
oratorius. 13.
pallipes. 6.
Paludum. 2.
pedeſtris. 11.
precatorius. 10.
Rivulorum. 5.
Stagnorum. 4.
tipularius. 18.
tipuliformis. 9.
vagabundus. 19.

125. GRYLLUS. Tom. II. pag. 46—62.

Banian. S.
biguttatus. 58.
captivus. 61.
carinatus. 5.
Carolinus. 46.
ciliatus. S.
cinctus. 17.
cineraſcens. 51.
Ciſti. 36.
clavicornis. 62.
coerulans. 45.
coeruleſcens. 50.
criſtatus. 3.
cyanipes. 54.
dorſalis. S.
Dux. 4.
Ælephas. 1.
faſciatus. 48.
ferrugineus. 39.
flaveſcens. 24.
flavicornis. 23.
flavus. 53.
gallinaceus. 8.
Germanicus. 42.
groſſus. 60.
haematopus. 22.
inanis. 12.
Italicus. 41.
lateralis. 56.
leproſus. 18.
Lineola. 29.
Lunus. 6.
luridus. 32.
migratorius. 27.
miliaris. 15.
morbilloſus. 16.
Morio. 38.
muſicus. 34.
nervoſus. 33.
obſcurus. 47.
papilloſus. 13.
pedeſtris. 64.
perſpicillatus. 65.
pictus. 25.
punctatus. 19.
reticulatus. 7.
ruficornis. 28.
rufus. 63.
ruſticus. 55.
ſanguineus. S.
ſcaber. S.
ſcabioſus. 20.
ſerratus. 10.
ſerripes. 9.
Sibiricus. 49.
ſquarroſus. 21.
ſtridulus. 37.
ſuccinctus. 2.
ſulphureus. 52.
Surinamenſis. 40.
Tamulus. S.
Tartaricus. 26.
thalaſſinus. 43.
tuberculatus. 35.
Turcicus. 11.
variegatus. 30.
varioloſus. 14.
velox. 57.

Virginianus. 44.
viridulus. 59.
vocans. 31.

25. GYRINUS. Tom. I. a. pag. 202—203.

Americanus. 4.
Auſtralis. 3.
bicolor. 2.
micans. 5.
Natator. 1.
ſpinoſus. 6.
ſtriatus. 7.

17. HELOPS. Tom. I. a. pag. 117—123.

aeruginoſus. 6.
ater. 21.
barbatus. 9.
bicolor. 7.
canaliculatus. 10.
Capenſis. A. 440.
coeruleus. 3.
cyaneus. 29.
dentipes. 24.
equeſtris. 14.
femoratus. S.
flavipes. 27.
haemorrhoidalis. 11.
Hottentotta. 23.
laevis. 13.
laminatus. 1.
lanipes. 4.
longipes. 20.
luridus. 12.
{marginatus. 5.
{marginatus. A. 440.
Maurus. 15.
micans. S.
Morio. 16.
Nigrita. 17.
picicornis. 18.
Pimelia. 22.
punctulatus. 2.
quisquilius. 26.
ruficollis. 28.
rufipes. 19.
ſerratus. 8.
undatus. 25.

131. HEMEROBIUS. Tom. II. pag. 81—87.

abdominalis. 25.
albus. 4.
bipunctatus. 23.
candidus. S.
capitatus. 5.
chryſops. 6.
cornutus. 1.
faſciatus. 17.

fatidicus. 27.
flavicans. 22.
filoſus. 3.
fuſcatus. 11.
hirtus. 10.
Humuli. 13.
longicornis. 14.
luteſcens. 12.
maculatus. 7.
nebuloſus. 8.
nervoſus. 19.
nitidulus. 9.
8-punctatus. 16.
Perla. 2.
phalaenoides. 8.
picicornis. 21.
pulſatorius. 26.
4-punctatus. 24.
6-punctatus. 20.
ſtriatulus. 15.
variegatus. 18.

193. HEPIALUS. Tom. III. b. pag. 5 — 8.

Aſellus. 9.
Bufo. 10.
carnus. 6.
crux. 7.
hectus. 4.
Humuli. 1.
Jodutta. 2.
lupulinus. 3.
obliquus. 5.
Teſtudo. 8.

187. HESPERIA. Tom. III. a. pag. 258 — 354.

Fam. 1. Rurales. 1 — 231.
Fam. 2. Urbicolae. 232 — 349.

Acaciae. 75.
Acanthus. 143.
Acaſtus. 272.
Achaeus. 53.
Acis. 124.
Acmon. 93.
Acreon. 140.
Actoris. 196.
Adonis. 134.
Aegon. 231.
Aelianus. 79.
Aemulius. 219.
Aeolus. 90.
Aeſculapus. 321.
Aeſopus. 164.
Agrippa. 3.
Alceae. 334.
Alcides. 86.
Alcon. 120.
Alexis. 277.
Alphaeus. 265.
Alphonſus. 171.
Alſarius. 303.
Alſus. 125.

Amica

Amicatus. 320.
Amor. 7.
Amphion. 139.
Amyntas. 95.
Amyntor. 109.
Anacreon. 34.
Anaphus. 304.
Apelles. 111.
Apidanus. 78.
Aracinthus. 309.
Arcas. 179.
Archimedes. 210.
A·giades. 138.
Argiolus. 123.
Argus. 128.
Arion. 118.
Arinus. 276.
Artaxerxes. 129.
Athemon. 204.
Atticus. 288.
Atymnus. 88.
Atys. 30.
Augias. 239.
Auguſtus. 62.
Aunus. 18.
Avius. 142.
Ballus. 180.
Bathis. 49.
Battus. 137.
Betulae. 69.
Bias. 166.
Bibulus. 163.
Bion. S.
Bixae. 307.
Boetica. 77.
Brontes. 275.
Buſiris. 310.
Cachrys. 158.
Caeſar. 294.
Cajus. 126.
Caricae. 155.
Caſſander. 280.
Caſſius. 197.
Catilina. 150.
Catullus. 323.
Cecrops. 41.
Celerio. 25.
Celſus. 316.
Ceneus. 144.
Centaurus. 63.
Cephus. 192.
Ceranus. 66.
Ceraſi. 74.
Ceraunus. 149.
Chemnis. 257.
Chiton. 16.
Chryſeus. 174.
Cicero. 287.
Cippus. S.
Cleon. 84.
Clericus. 289.
Clito. 342.
Clonias. 271.
Cnecius. S.
Coenus. 169.
Colon. 241.
Columella. 83.
Comma. 233.
Coriolanus. 91.
Corydon. 133.
Cremius. S.
Cupido. 1.

Curtius.

Curtius. 344.
Cyanus. 50.
Cyllarus. 122.
Damoetes. 148.
Damon. 121.
Dan. 297.
Democritus. 94.
Didymaon. 27.
(Dimas.) 160.
Dindus. 40.
Dioſcorides. 250.
Domitianus. 193.
Dorylas. 135.
Echion. 38.
Eudoxus. 255.
Electron. 214.
Eleus. 8.
Ematheon. 26.
Emylius. 154.
Endymion. 36.
Ennius. 283.
Epictetus. 252.
Epitus. 261.
Epulus. 117.
Erebus. 119.
Ericus. 81.
Erinus. 145.
Eroſine. 28.
Eryx. 89.
Etolus. 20.
Eumilus. 313.
Euripides. 32.
Euritheus. 216.
Evadrus. 306.
Exclamationis. 232.
Faunus. 11.
Fidias. 319.
Fleſus. 286.
Florus. 176.
Formoſus. 55.
Freja. 19.
Fritillum. 336.
Gabrielis. 14.
Galba. 337.
Galenus. 332.
Ganymedes. 23.
Garbas. 183.
Gemellus. 208.
Geminus. 220.
Gentius. 330.
Gerontes. 64.
Gnetus. 302.
Gnidus. 2.
Gyas. 230.
Haleſus. 52.
Haraldus. 201.
Harpax. 59.
Hebrus. 141.
Helirius. 243.
Helius. R. 4.
Helius. U. 248.
Helle. 181.
Hemes. 312.
Hemon. 42.
Heraclitus. 112.
Herodotus. 100.
Heſiodus. 8.
Hiera. 177.
Hippocrates. 105.
Hippothoe. 172.
Hisbon. 206.
Hyacinthus. 51.

Hylax. 152.
Hylus. 136.
Hymen. 13.
Jacchus. 301.
Janias. 5.
Jarbas. 65.
Icarus. 146.
Jovianus. 324.
Iſarchus. 198.
Iſocrates. 29.
Juba. 190.
Jupiter. 279.
Juvenalis. 291.
Laches. 199.
Lagus. 159.
Lamis. 157.
Lara. 191.
Lav.terae. 339.
Liger. 58.
Lineurs. 73.
Lincus. 107.
Linea. 236.
Liſias. 12.
Livius. 194.
Longinus. S.
Lucanus. 221.
Lucas. 290.
Lucianus. 185.
Lucius. 211.
Lycagus. 322.
Lyſippus. 218.
Maecenas. 45.
Maecenas. (vid. Dimas.) 160.
Maenas. 318.
Maevius. 338.
Maimon. 327.
Malvae. 333.
Mantus. 161.
Marcus. 285.
Maro. S.
Mars. 24.
Marſyas. 48.
Mathias. S.
Meleager. 116.
Meliboeus. 44.
Menalcas. 340.
Menippus. 341.
Mercatus. 260.
Mercurius. 263.
Metis. 249.
Meton. 56.
Midas. 162.
Mimas. 329.
Minereus. 151.
Mithridates. 278.
Momus. 268.
Monous. 10.
Muretus. 259.
Nais. 115.
Narciſſus. 110.
Neleus. 203.
Nepos. 292.
Nero. S.
Nerva. 293.
Nicius. 262.
Niſo. 347.
Noſtrodamus. 246.
Nothus. 298.
Numitor. 228.
Optilite. 131.
Orcus. 296.

Orige-

Origenes. 24.
Orion. 254.
Otis. 127.
Ouranus. 200.
Ovidius. 212.
Palemon. 273.
Pane. 67.
Paniſcus. 242.
Parrhaſius. 168.
Parſimon. 147.
Pelion. 17.
Pelopidas. 331.
Pelops. 156.
Pentheus. 186.
Perditus. 222.
Pericles. 54.
Perion. 61.
Petronius. 227.
Petus. 21.
Phaedrus. 165.
Phareus. 167.
Phereclus. 217.
Phidias. 99.
Phidias. 219.
Philemon. 314.
Philiaſus. 229.
Philippus. 87.
Phinaeus. 247.
Phlaeas. 178.
Phocas. 267.
Phocides. 85.
Phocion. 274.
Phocion. 345.
Phocion. S.
Pholeus. 33.
Phorbas. 68.
Pindarus. 15.
Piſiſtratus. 311.
Plato. 103.
Plautus. 113.
Plinius. 92.
Plutarchus. 251.
Polybius. 281.
Polycletus. 308.
Pretus. 266.
Priaſſus. 224.
Procas. 170.
Propertius. 234.
Proteus. 256.
Pruni. 70.
Ptolomaeus. 209.
Pygmaeus. 349.
Pyramis. 223.
Pythagoras. 6.
Quercus. 72.
Regulus. 205.
Rhetus. 270.
Romulus. 195.
Roſimon. 104.
Rubi. 102.
Sagaris. 215.
Salus. 300.
Saluſtius. 175.
Salvianus. 325.
Saturnus. 244.
Scipio. 284.
Sebaldus. 305.
Sedi. 98.
Sidae. 335.
Silenus. 253.
Silvius. 299.
Simaethis. 97.
Sophocles. 31.

Sphinx. 43.
Spini. 71.
Spio. 348.
Strabo. 101.
Strephon. 80.
Suetonius. 213.
Sylvanus. 237.
Symethus. 76.
Syrichtus. 326.
Tacitus. 168.
Tages. 346.
Talaus. 328.
Talus. 202.
Tarquinius. 207.
Telemus. 39.
Telephus. 153.
Tertullianus. 295.
Thales. 35.
Thaumas. 238.
Theocritus. 106.
Theophraſtus. 82.
Thero. 57.
Therſamon. 184.
Thrax. 282.
Thucydides. 225.
Thyra. 188.
Thyrſis. 264.
Thysbe. 114.
Tibullus. 235.
Timaeus. 96.
Timon. 9.
Titus. 130.
Tityrus. 258.
Traſibulus. 315.
Triton. 132.
Tyrtaeus. 46.
Ulricus. 187.
Valens. 60.
Venus. 37.
Veſpaſius. 269.
Virgaureae. 173.
Virbius. 343.
Virgilius. 226.
Vitellius. 240.
Vulcanus. 22.
Xanthe. 182.
Xenophon. 47.
Zeleucus. 317.
Zeuxo. 189.

---

41. HETEROCERUS. Tom. I. a. pag. 262—263.

marginatus. 1.

---

3. HEXODORE. Tom. I. a. pag. 71—72.

reticulatum. 1.
unicolor. 2.

178.

178. HIPPA. Tom. II. pag. 474—476.

adactyla. 1.
dentata. 4.
dorſipes. 5.
ſcabra. 6.
ſcutellata. 3.
ſymniſta. 2.
variolosa. 7.

---

243. HIPPOBOSCA. Tom. IV. pag. 415—416.

avicularia. 2.
equina. 1.
Hirundinis. 3.
ovina. 4.

---

57. HISPA. Tom. I. b. pag. 70—73.

angulata. 8.
atra. 1.
bidens. 11.
bipuſtulata. 3.
dentata. 7.
emarginata. 9.
Hyſtrix. S.
mutica. 4. (Ptilinus mutic.)
nigricornis. 12.
ſanguinicollis. 5.
ſerrata. 6.
ſerraticornis. 10.
ſpinipes. A. 448.
ſulcata. A. ib.
teſtacea. 2.

---

4. HISTER. Tom. I. a. pag. 72—77.

abbreviatus. 14.
aeneus. 19.
bimaculatus. 17.
bipuſtulatus. S.
brunneus. 8.
caeſus. 22.
cruciatus. 16.
cyaneus. 6.
depreſſus. 10.
detritus. 20.
glabratus. 3.
impreſſus. S.
major. 1.
maxilloſus. A. 437.
oblongus. 13.
planus. 7.
picipes. 21.
pygmaeus. 9.
4-dentatus. 11.
4-maculatus. 18.
ſcaber. 5.
ſemipunctatus. 4.

ſinuatus. 15.
ſulcatus. 12.
unicolor. 2.

HOMARUS. S.

64. HORIA. Tom. I. b. pag. 90—91.

maculata. 1.
teſtacea. 2.

195. HYBLAEA. Tom. III. b. pag. 127—128.

deflorata. 3.
gemina. 6.
Lagopus. 1.
roſtrata. 2.
Saga. 4.
Sagitta. 5.
ſcabra. S.

23. HYDROPHILUS. Tom. I. a. pag. 182—186.

ater. 3.
bicolor. 12.
bipunctatus. 22.
caraboides. 4.
collaris. 13.
emarginatus. 7.
erythrocephalus. 15.
griſeus. 21.
haemorrhoidalis. 16.
lateralis. 5.
luridus. 19.
marginellus. 17.
minutus. 20.
obſcurus. 18.
olivaceus. 2.
orbicularis. 10.
piceus. 1.
picipes. 9.
Pygmaeus. 23.
rufipes. 6.
ſcarabaeoides. 8.
ſubrotundus. 11.
undatus. 14.

156. HYLAEUS. Tom. II. pag. 302—307.

albilabris. 10.
albipes. 13.
alternans. 2.
annulatus. 12.
cylindricus. 1.
flavilabris. 8.

flavipes. 11.
floriſomnis. 5.
maxilloſus. 4.
Morio. 16.
quadricinctus. 3.
6-cinctus. 6.
ſimilis. 14.
thoracicus. 7.
Triangulum. 15.
Truncorum. 9.

106. HYPOPHLOEUS. Tom. I. b. pag. 500—502.

bicolor. 5.
bicornis. 6.
caſtaneus. 1.
depreſſus. 4.
faſciatus. 3.
linearis. 2.

140. ICHNEUMON. Tom. II. pag. 132—192.

Fam. 1. Scutello albido, antennis albo-annulatis. 1—32.
Fam. 2. — — antennis nigris totis. 33—67.
Fam. 3. Scut. thoraci concolore, antennis faſcia annulatis. 68—89.
Fam. 4. Scut. thoraci concolore, antennis nigris totis. 90—185.
Fam. 5. Antennis luteis. 186.
Fam. 6. Minuti, antennis filiformibus, abdomine ovato ſeſſili. 210—246.

Abbreviator. 83.
abbreviatus. A. 456.
abdominalis. 207.
Acarorum. 243.
Accuſator. 161.
Aculeator. 105.
Acuminator. 165.
affinis. 206.
agilis. 239.
albatorius. 21.
ambulatorius. 26.
amictus. 197.
Anator. 149.
Annulator. 72.
annulatorius. 43.
annulatus. 190.
Antennator. 103.
Aphidum. 233.
Approximator. 118.
armatorius. 11.
Ariolator. 96.
Arrogator. 107.
Affectator. 184.
aſſertorius. 31.

Atra-

Atrator. 131.
atratorius. 8.
atratus. 191.
Barbator. 159.
Bedeguaris. 215.
bidentorius. 47.
bimaculatus. 220.
Capitator. 109.
Caſtigator. 135.
Caudator. 77.
Chryſis. 213.
cinctorius. 66.
cinctus. 208.
circumflexus. 199.
Clavator. 74.
Coccorum. 225.
(Coerulator.) 128.
Comitator. 71.
Compenſator. 176.
compreſſus. 195.
Compunctor. 121.
conicus. 229.
Corruſcator. 115.
(Coſtator.) 102.
criſpatorius. 9.
culpatorius. 5.
Cultellator. 142.
Cunctator. 179.
curſitans. 240.
Curvator. 182.
Cuſtodiator. 136.
Cylindrator. 160.
Cynipedis. 223.
Debellator. 78.
decoratorius. 67.
Defenſor. 104.
deliratorius. 58.
Deluſor. 129.
Denigrator. 112.
Denunciator. 101.
dentatus. 192.
Deſertor. 92.
deſignatorius. 51.
deſtructorius. 13.
Dimidiator. 82.
dubitorius. 53.
edictorius. 52.
Elongator. 130.
Enervator. 125.
Erigator. 174.
Exhortator. 88.
exſpectorius. A. 455.
Extenſor. 146.
extenſorius. 10.
Fabricator. 138.
Falcator. 170.
falcatorius. 59.
faſciatorius. 39.
faſciatus. 242.
Faſtidiator. 95.
Femorator. 106.
Ferrugator. 89.
ferrugatorius. 32.
ferrugineus. A. 456.
Flagellator. 178.
Flavator. 113.
flavatorius. A. 456.
flavicans. 202.
flavus. 188.
Fomentator. 154.
formicarius. 246.
Formicator. 144.

formicatus. 204.
foſſorius. 64.
frontatorius. 46.
fulvus. 189.
Fuſcator. 123.
fuſcatus. 209.
fuſorius. 55.
Gallarum. 217.
glaucatorius. 16.
glaucopterus. 198.
globatus. 230.
glomeratus. 231.
Gravidator. 168.
groſſorius. 17.
Haſtator. 141.
hemipterus. 238.
Hiſtrio. 201.
Hoſpitator. 98.
Jaculator. 183.
ignitus. 212.
Incitator. 163.
Incubitor. 86.
Inculcator. 169.
Initiator. 114.
infractorius. 25.
Inſidiator. 108.
Inſtigator. 126.
Inſtructor. 87.
Itinerator. 90.
intratorius. 2.
Jocator. 175.
Irrigator. 79.
Irritator. 127.
Irrorator. 180.
irroratorius. 23.
Juniperi. 218.
laboratorius. 36.
laetatorius. 54.
Lapidator. 111.
Lapidator. (vid. Cocrulator.) 128.
Larvarum. 222.
Latrator. 139.
Lineator. 145.
lotatorius. 34.
Lucidator. 152.
luctatorius. 33.
Lunator. 120.
luteus. 186.
lutorius. 57.
Maculator. 147.
maculatorius. 44.
Mandator. 132.
Manifeſtator. 117.
marginatorius. 48.
melioratorius. 56.
Menſurator. 155.
Mercator. 177.
mercatorius. 41.
Migrator. 80.
minutus. 235.
Moderator. 172.
molitorius. 3.
Morio. 194.
Moſchator. 134.
moratorius. 12.
Muſcarum. 214.
Mutator. 110.
mutillarius. 205.
Necator. 185.
necatorius. 45.
negatorius. 35.

Nigrator. 68.
nigricornis. 216.
nitidulus. 211.
{Nominator. 93.
{Nominator. vid. Coſtator. 102.
nugatorius. A. 455.
Nunciator. 137.
nuptatorius. 62.
nutatorius. 19.
Objurgator. 70.
obſoletorius. 29.
occiſorius. 37.
Oculator. 151.
olitorius. 20.
oratorius. 24.
Ornator. 99.
oſculatorius. 38.
Ovator. 122.
Ovulorum. 234.
pectinicornis. 236.
Pedator. 100.
pedatorius. 4.
pedeſtris. 245.
Pedicularius. 244.
{Pennator. 91.
{Pennator. 156.
perſuaſorius. 49.
piſorius. 30.
Polyccrator. 119.
porrectorius. 22.
praecatorius. 27.
Praerogator. 158.
Proficiſcator. 97.
Profligator. 85.
Pugillator. 171.
pulicarius. 241.
punctatorius. 65.
punctatus. 200.
Puparum. 221.
Purgator. 94.
Quadrum. 219.
quaeſitorius. 18.
ramicornis. 237.
ramidulus. 187.
raptorius. 6.
Regulator. S.
Relictor. S.
Reluctator. 69.
Reſinellae. 157.
{Reſtaurator. 76.
{Reſtaurator. 133.
Roborator. 153.
Ruſpator. 181.
Rutilator. 116.
Saltator. 173.
ſarcitorius. 7.
ſaturatorius. 15.
Scabrator. 167.
Secalis. 226.
ſeductorius. 28.
Segmentator. 124.
ſegmentorius. 63.
Semiauratus. 210.
ſericeus. 232.
ſignatorius. 14.
ſollicitorius. 61.
Sphegum. 224.
ſplendidus. A. 457.
ſponſorius. 60.
Sponſor. 84.
Sputator. 81.

Stercorator. 162.
Stigma. 228.
Strigator. 166.
Strobilellae. 150.
ſubcutaneus. 227.
ſugillatorius. 1.
teſtaceus. S.
Titillator. 140.
tricolor. 203.
Turionellae. 148.
vagatorius. 50.
vaginatorius. 42.
varicornis. 193.
Variegator. 164.
varius. 196.
Venator. 143.
Vigilator. 75.
volutatorius. 40.
Zonator. 73.

IDOTHEA. S.

INACHUS. S.

111. IPS. Tom. I. b. pag. 511—514.

aenea. 13.
bipunctata. 3.
bipuſtulata. 4.
dorſalis. 5.
faſciata. 1.
ferruginea. 9.
grandis. 2.
haemorrhoidalis. 11.
humeralis. 14.
lunata. 15.
nigripennis. 10.
4-guttata. 8.
4-notata. S.
4-puſtulata. 6.
rufifrons. 16.
rufipes. 12.
6-puſtulata. 7.
teſtacea. S.

168. JULUS. Tom. II. pag. 393—396.

carnifex. 9.
complanatus. 2.
craſſus. 7.
depreſſus. 3.
fuſcus. 12.
Indus. 10.
maximus. 13.
ovatus. 1.
ſabuloſus. 11.
Stigma. 4.

terreſtris. 8.
tridentatus. 5.
varius. 6.

60. LAGRIA. Tom. I. b. pag. 78 — 81.

abdominalis. 5.
atra. 10.
coerulea. 14.
flavipes. 13.
hirta. 4.
lineata. 12.
lugubris. 8.
metallica. 15.
minuta. 17.
nigra. 11.
nigricornis. 16.
obſcura. 7.
pubeſcens. 3.
ſcutellaris. 9.
tomentoſa. 6.
tuberculata. 1.
villoſa. 2.

84. LAMIA. Tom. I. b. pag. 265 — 292.

Aedificator. 33.
aedilis. 16.
Aethiops. 58.
Ambulator. 7.
Amputator. 34.
araneiformis. 19.
atomaria. 17.
Bankii. 78.
bidens. 95.
bidentata. 28.
bifaſciata. 56.
caneriformis. 22.
Cantor. 96.
Capenſis. 50.
carinata. 74.
cineraria. 73.
Coquus. 75.
Cornutor. 98.
criſpa. 67.
Criſta. 6.
cruciata. 71.
crucifera. 10.
curculionoides. 60.
Dentator. 43.
faſciculata. 68.
Ferrugator. 52.
fronticornis. 3.
Fuliginator. 72.
funeſta. 65.
Fuſcator. 94.
Gigas. 1.
glauca. 27.
Glycyrrhizae. 70.
Griſator. 32.
Guttator. 37.
Hebraea. 24.
Hiſtrio. 80.
horrida. 25.

Hottentotta. 51.
humeralis. 53.
Hyſtrix. 5.
irrorata. 14.
leproſa. 99.
lineata. 85.
lugubris. 63.
luſca. 61.
Molator. 46.
Molitor. 86.
Morio. 84.
nebuloſa. 38.
nigricornis. 15.
nobilis. 57.
nodoſa. 21.
notata. 62.
Nutator. 88.
8-maculata. 90.
Oculator. 49.
pedeſtris. 82.
pedicornis. 4.
praemorſa. 30.
pulchra. 11.
punctata. 20.
Punctator. 66.
5-faſciata. 54.
regalis. 12.
Repandator. 39.
Reticulator. 44.
Rotator. 69.
Rubus. 89.
rufipes. 83.
Ruſpator. 76.
Saltator. 79.
Sartor. 42.
ſcabra. 29.
Scabrator. 92.
Scalator. 45.
Scorpio. 26.
Solandri. 97.
Spengleri. 93.
Spinator. 36.
ſpinicornis. 91.
ſpinifera. 31.
Sternutator. 35.
Sutor. 41.
Teſtator. 81.
Textor. 8.
Titillator. 47.
Tornator. 77.
Tribulus. 2.
trifaſciata. 55.
triſtis. 64.
tuberculata. 23.
Tuberculator. 87.
undata. 13.
Vaginator. 9.
varia. 18.
Variegator. 59.
Variolator. 40.
Vittator. 48.

68

68. LAMPYRIS. Tom. I. b. pag. 98 — 103.

atra. 17.
Auſtralis. 19.
Capenſis. 18.
cincta. 7.
corruſca. 3.
flabellicornis. 10.
hemiptera. 23.
Heſpera. 11.
Japonica. 16.
ignita. 12.
Italica. 20.
lucida. 13.
luteicornis. 5.
maculata. S.
marginata. 8.
Mauritanica. 22.
nitidula. 14.
noctiluca. 1.
obſcura. 4.
pectinata. 9.
phosphorca. 15.
Pyralis. 6.
ſplendida. 2.
verſicolor. S.
veſpertina. S.
vittata. 21.

144. LARRA. Tom. II. pag. 220 — 222.

cincta. 3.
craſſicornis. 5.
erythrocephala. 2.
ichneumoniformis. 4.
4 puſtulata. 6.
rufifrons. 7.
ungulata. S.
veſpiformis. 1.

126. LEPISMA. Tom. II. pag. 63 — 64.

collaris. 5.
lineata. 3.
Polypoda. 2.
ſaccharina. 1.
villoſa. 4.

90. LEPTURA. Tom. I. b. pag. 339 — 349.

atra. 18.
attenuata. 40.
aurulenta. 45.
bipunctata. 3.
calcarata. 41.
collaris. 51.
dubia. 46.
12 maculata. 39.
emarginata. 9.
Exclamationis. 20.
femorata. 24.
haſtata. 2.

humeralis. 19.
Interrogationis. 35.
laevis. 6.
livida. 7.
lurida. 23.
luteicornis. 31.
marginata. 26.
marginella. 36.
melanura. 5.
meridiana. 11.
Morio. 50.
nigra. 27.
8-maculata. 34.
práeuſta. 28.
pubeſcens. 15.
4-faſciata. 44.
4-guttata. 29.
4-maculata. 32.
4-puſtulata. 33.
reticulata. A. 453.
roſtrata. 30.
rubra. 13.
ruficornis. 25.
ſanguinolenta. 10.
ſcutellata. 22.
7-punctata. 38.
ſericea. 49.
6-guttata. 47.
6 maculata. 37.
ſinuata. 43.
ſmaragdula. 17.
ſtrigilata. 8.
ſubſpinoſa. 42.
ſuturalis. 21.
teſtacea. 14.
tomentoſa. 4.
trifaſciata. 48.
unipunctata. 1.
villica. 12.
virens. 16.
Virginea. 52.

1. LETHRUS. Tom. I. a. pag. 1 — 2.

aeneus. 2.
Cephalotes. 1.

L E U C O S I A. S.

149. LEUCOSPIS. Tom. II. pag. 245—247.

atra. S.
dorſigera. 2.
Gigas. 1.
petiolata. 3.

164. LIBELLULA. Tom. II. pag. 373 — 383.

aenea. 35.
Americana. 31.
Aſiatica. S.
bifaſciata. 4.
cancellata. 18.
Capenſis. 42.
carnatica. S.
Carolina. 41.
Chinenſis. 28.
conſpurcata. S.
contaminata. 38.
cyanea. 36.
depreſſa. 2.
dimidiata. 24.
Eponina. 39.
equeſtris. 25.
faſciata. 20.
ferruginea. 33.
flaveola. 6.
flaveſcens. S.
fluctuans. 26.
gibba. S.
Indica. 10.
lineata. 7.
marginata. 32.
Murcia. 11.
nebuloſa. 27.
notata. 23.
obſcura. 15.
oculata. 9.
Pedemontana. 19.
4-maculata. 1.
4-punctata. 5.
rubicunda. 13.
Serva. 22.
6-maculata. 37.
ſinuata. 17.
ſtigmatizans. 8.
Tillarga. S.
tomentoſa. 34.
trimaculata. 3.
umbrata. 21.
variegata. 40.
verſicolor. 29.
verſiculoſa. 12.
vibrans. 30.
vulgata. 16.
vulgatiſſima. 14.

L I G I A. S.

---

181. LIMULUS. Tom. II. pag. 487 — 488.

Cyclops. 2.
Polyphemus. 1.

---

124. LOCUSTA. Tom. II. pag. 33—46.

acuminata. 22.
albifrons. 29.
aptera. 43.
brachyptera. 36.
Camellifolia. 5.
Citriſolia. 1.
conocephala. 23.
coriacea. 27.
coronata. 25.
elongata. 14.
ephippiger. 42.
Falx. 30.
femorata. 15.
feneſtrata. 4.
fuſca. 38.
Gladiator. 34.
graminifolia. 8.
griſea. 31.
Italica. 16.
lanceolata. 20.
lauriſolia. 2.
Laxmanni. 45.
lilifolia. 9.
maxilloſa. 13.
melanoptera. 26.
myrthifolia. 3.
ocellata. 19.
oleifolia. 6.
Onos. 41.
pallens. 21.
pedeſtris. 44.
perforata. 18.
perſpicillata. 10.
Pupa. 39.
reticulata. 28.
ſerrata. 37.
ſerricauda. A. 455.
ſerripes. 11.
ſpecularis. 17.
ſpinipes. 12.
ſpinuloſa. 40.
thymifolia. 7.
triops. 24.
varia. 35.
verrucivora. 33.
viridiſſima. 32.

80. LUCANUS. Tom. I. b. pag. 236—239.

Alces. 1.
Biſon. 7.
cancroides. 12.
Capreolus. 4.
caraboides. 14.
Cervus. 2.
Dama. 5.
Elaphus. 3.
femoratus. 6.
Gazella. 8.
Giraffa. A. 452.
Lama. 9.
paralelepipedus. 11.
Saiga. A. 452.
ſuturalis. 10.
tenebrioides. 13.

107

107. LYCTUS. Tom. I. b. pag. 502—505.

bipuſtulatus. 3.
brunneus. 5.
canaliculatus. 11.
contractus. 13.
crenatus. 9.
dentatus. 4.
depreſſus. 2.
hiſteroides. 8.
Juglandis. 7.
navalis. 10.
nitidulus. 8.
nitidus. 12.
politus. 1.
terebrans. 6.

---

71. LYCUS. Tom. I. b. pag. 106—109.

Aurora. 11.
bicolor. 9.
faſciatus. 7.
flabellicornis. 14.
latiſſimus. 1.
minutus. 13.
nigripes. 12.
palliatus. 2.
praeuſtus. 6.
proboſcideus. 4.
reticulatus. 8.
roſtratus. 3.
ruficollis. 15.
ſanguineus. 10.
ſerraticornis. 5.

---

214. LYGAEUS. Tom. IV. pag. 133—183.

Fam. 1. Thorace ſpinoſo. 1—34.
Fam. 2. Thorace mutico. 35—173.

abbreviatus. 51.
Aegyptius. 69.
agilis. 170.
albofaſciatus. 62.
albomarginatus. 164.
Alni. 143.
apterus. 90.
Arbuſtorum. 141.
arenarius. 119.
armipes. 102.
ater. 149.
auctus. 18.
Augur. 88.
aulicus. 54.
Auſtralis. 21.
Balteatus. 27.
bellicoſus. 36.
bifaſciatus. 152.
biguttatus. 78.
binotatus. 130.
bipunctatus. 129.
bis-3-guttatus. 135.

Boer-

Boerhaviae. 57.
calcaratus. 94.
campeſtris. 125.
capillàris. 161.
capitatus. 118.
Carnifex. 87.
Chiragra. 113.
cingulatus. 60.
civilis. 44.
clavicornis. 117.
clavimanus. 104.
clavipes. 12.
compreſſicornis. 15.
Coryli. 123.
craſſicornis. 15.
crenulatus. 33.
cruciger. 22.
crudelis. 45.
cruentus. 81.
curvipes. 11.
Danicus. 165.
Dentator. 13.
dentipes. 31.
elatus. 26.
elatus. 148.
equeſtris. 43.
errans. 59.
erraticus. 109.
excavatus. 85.
Faber. 39.
famelicus. 73.
familiaris. 48.
femoratus. 10.
ferrugatus. 132.
flavicollis. 156.
flavomaculatus. 169.
flavovarius. 154.
floralis. 127.
Forſteri. 100.
Fraxini. 131.
fulvicornis. 7.
furcatus. 86.
Gallus. 38.
Gonagra. 19.
Gothicus. 162.
groſſipes. 4.
Guttula. 92.
Harpagon. 40.
Heros. 9.
Hoſpes. 50.
hyalinatus. 172.
hyalinus. 115.
Hyoſcyami. 47.
Incubitor. 8.
Indus. 41.
inquinatus. 134.
Kermeſinus. 20.
Koenigii. 67.
laetus. 24.
leproſus. 65.
leucocephalus. 140.
leucurus. 66.
linearis. 32.
lineatus. 5.
Lineola. 95.
lunatus. 25.
lunatus. 110.
luſcus. 103.
lynceus. 107.
mactans. 89.
màgnicornis. 112.
Malabaricus. 53.

Maroccanus. 96.
Meleagris. 37.
membranaceus. 16.
mendicus. 71.
Merianae. 3.
militaris. 42.
naſſatus. 136.
nemoralis. 124.
nugax. 93.
olivaceus. 159.
pallens. 58.
palliatus. 166.
Phaſianus. 35.
Phyllopus. 17.
Pictor. 14.
Pini. 97.
podagricus. 111.
Populi. 138.
pratenſis. 126.
pubicornis. 122.
pulchellus. 83.
punctatoguttatus. 77.
Punctum. 75.
4-guttatus. 76.
4-punctatus. 128.
4-ſpinoſus. 34.
Rolandri. 99.
(roſeus.) 144.
roſtratus. 52.
rubiginoſus. 84.
ruficollis. 63.
ruficollis. 157.
rufomarginatus. 56.
ſaltatorius. 147.
ſanctus. 23.
ſanguineus. 70.
ſanguineus. *vid.* roſeus. 144.
ſanguinolentus. 79.
ſaxatilis. 46.
ſcabroſus. 64.
Schach. 151.
ſcriptus. 171.
ſcutellaris. 163.
ſerratus. 2.
ſerripes. 30.
Servus. 72.
ſeticornis. 160.
6-guttatus. 139.
6-punctatus. 80.
6-puſtulatus. 105.
Sidae. 116.
ſinuatus. 29.
Slanbuſchii. 68.
ſordidus. 101.
ſpiſſicornis. 168.
ſtriatellus. 133.
ſtriatulus. 91.
ſuccinctus. 120.
ſuperſtitioſus. 61.
ſuturalis. 82.
ſylvaticus. 98.
ſylveſtris. 108.
tenebroſus. 6.
Tiliae. 137.
Tragus. 5.
transverſalis. 142.
tricolor. 167.
trifaſciatus. 158.
triguttatus. 146.
trilineatus. 74.
tripuſtulatus. 145.
tunicatus. 121.

Tyrannus. 150.
umbratilis. 155.
unifaſciatus. 153.
Urticae. 106.
valgus. 1.
varicolor. 49.
varicornis. 55.
varius. 173.
venoſus. 28.

65. LYMEXYLON. Tom. I. b. pag. 91 — 93.

abbreviatum. 2.
barbatum. 4.
dermeſtoides. 1.
flavipes. 6.
Morio. 7.
navale. 5.
proboſcideum. 3.
ruficolle. 8.

62. LYTTA. Tom. I. b. pag. 83 — 87.

Afra. 16.
atrata. 12.
collaris. 4.
dubia. 15.
erythrocephala. 13.
feſtiva. 9.
Gigas. 5.
haemorrhoidalis. 17.
marginata. 10.
nitidula. 3.
oculata. 14.
ruficollis. 7.
Segetum. 2.
Syriaca. 6.
teſtacea. 8.
veſicatoria. 1.
vittata. 11.

30. MALACHIUS. Tom. I. a. pag. 221 — 226.

aeneus. 1.
albifrons. 16.
angulatus. 9.
bipuſtulatus. 2.
cyaneus. 8.
equeſtris. 14.
faſciatus. 13.
flavipes. 15.
marginellus. 4.
nitidulus. 17.
pedicularius. 11.
praeuſtus. 10.
pulicarius. 12.
ruficollis. 7.
rufus. 3.
ſanguinolentus. 6.
viridipennis. A. 444.
viridis. 5.

18. MANTICORA. Tom. I. a. pag. 123.

maxilloſa. 1.

---

120. MANTIS. Tom. II. pag. 12 — 25.

angulata. 5.
atrophica. 8.
aurita. 13.
bidens. 39.
biſpinoſa. 10.
Calamus. 3.
cancellata. 23.
fauſta. 47.
feneſtrata. 38.
Ferula. 2.
filiformis. 1.
flabellicornis. 16.
Gigas. 6.
Gongylodes. 17.
griſea. 40.
hyalina. 37.
Jamaicenſis. 11.
irrorata. 29.
lateralis. 12.
linearis. 14.
lobata. 45.
mendica. 19.
miniſtralis. 41.
minuta. 50.
monacha. 35.
naſuta. 44.
necydaloides. 7.
oculata. 26.
obſcura. 36.
oratoria. 31.
pagana. 49.
pauperata. 18.
pectinicornis. 25.
perſpicua. 48.
precaria. 32.
pulchra. 46.
puſilla. 51.
roſea. 15.
Roſſia. 4.
ruſtica. 43.
ſancta. 33.
ſiccifolia. 24.
Simulacrum. 34.
ſpinocula. 8.
ſpinoſa. 9.
ſtriata. 30.
ſtrumaria. 21.
ſuperſtitioſa. 27.
tricolor. 22.
truncata. 20.
undata. 28.
urbana. 42.

---

152. MASARIS. Tom. II. pag. 283—285.

apiformis. 2.
veſpiformis. 1.

M A T U T A. S.

36. MELASIS. Tom. I. a. pag. 244—245.

flabellicornis. 1.
myſtacina. A. 445.

153. MELLINUS. Tom. II. pag. 285—288.

arvenſis. 7.
bipunctatus. 4.
campeſtris. 6.
myſtaceus. 1.
5-cinctus. 8.
ruficornis. 3.
ſabuloſus. 2.
tricinctus. 5.

114. MELOE. Tom. I. b. pag. 517—518.

maialis. 2.
marginata. 3.
proſcarabaeus. 1.
punctata. 4.

77. MELOLONTHA. Tom. I. b. pag. 154—184.

abbreviata. 98.
abdominalis. 69.
aenea. 24.
aequinoctialis. 14.
agricola. 74.
Alopex. 9.
araneoides. 104.
arbicola. 67.
argentea. 80.
arthritica. 88.
arvicola. 71.
atomaria. 76.
atra. 13.
atrata. 8.
Atriplicis. 17.
aulica. 66.
barbata. 27.
bicolor. 26.
bimaculata. 16.
Bombylius. 115.
brunnea. 42.
cancroides. 91.
candida. 12.
Cardui. 55.

chryſomelina. 82.
cincta. 83.
coeruleocephala. 41.
craſſipes. 90.
crinita. 111.
dentipes. 86.
dorſalis. 29.
elata. 28.
elongata. 62.
errans. 58.
erythrocephala. 44.
farinoſa. 77.
faſtuoſa. 57.
ferruginea. 64.
fervida. 7.
feſtiva. 48.
floricola. 70.
Friſhii. 53.
fruticola. 73.
Fullo. 1.
gibba. 106.
glacialis. 30.
Gonagra. 89.
graminicola. 81.
hirta. 112.
hirticollis. 35.
holoſericea. 50.
horticola. 68.
humeralis. 108.
innuba. 61.
Julii. 51.
laeta. 49.
lanigera. 20.
lineata. 105.
longicornis. 21.
longipes. 97.
lucicola. 8.
lurida. 31.
Lynx. 110.
marginata. 40.
marginella. 92.
melanocephala. 43.
Meles. 114.
minuta. 99.
mixta. 45.
monticola. 107.
Morio. 94.
mutabilis. 100.
Nigrita. 52.
oblonga. 18.
obſcura. 46.
occidentalis. 6.
pallida. 36.
picea. 103.
piloſa. 5.
Pini. 15.
podagrica. 87.
praticola. 72.
proboſcidea. 84.
pulverulenta. 93.
punctata. 22.
rauca. 63.
reflexa. 8.
regia. 79.
ruſa. 47.
ruficollis. 37.
ruficornis. 19.
rupicola. 60.
ruricola. 75.
ſerrata. 2.
Serratulae. 56.
ſignata. 39.

ſolſtitialis. 11.
ſpinipes. 85.
ſplendida. 65.
ſquamoſa. 78.
Stigma. A. 450.
ſtriata. 32.
ſubſpinoſa. 96.
ſuturalis. 25.
ſylvicola. 95.
teſtacea. 34.
tomentoſa. 10.
triſtis. 33.
umbroſa. 59.
Urſus. 109.
variabilis. 101.
varioloſa. 38.
verſicolor. 102.
villoſa. 4.
viridis. 23.
Vitis. 54.
vittata. 116.
vulgaris. 3.
Vulpes. 113.

31. MELYRIS. Tom. I. a. pag. 226.

lineatus. 3.
niger. 2.
viridis. 1.

202. MEMBRACIS. Tom. IV. pag. 8—16.

acuminata. 13.
aurita. 15.
bimaculata. 11.
bipunctata. 26.
Bonaſia. 27.
bracteata. 7.
Bubalus. 23.
Capra. S.
clavata. 20.
convoluta. 28.
cornuta. 22.
faſciata. 6.
flexuoſa. 16.
foliata. 4.
fronditia. 3.
Geniſtae. 31.
haſtata. 9.
horrida. 18.
inermis. 30.
inflata. 1.
lanceolata. 10.
lunata. 5.
marginata. 17.
mutica. 29.
planata. 14.
punctata. 21.
rhombea. 2.
Rupicapra. S.
ſpinoſa. 12.
ſquamigera. 9.

Tarandus. 5.
Taurus. 24.
trifida. 19.
Vitulus. 25.

215. MIRIS. Tom. IV. pag. 183—187.

Abietis. 15.
calens. 8.
cingulatus. 12.
dolabratus. 1.
ferus. 10.
Gronovii. 9.
Holſatus. 4.
laevigatus. 2.
lateralis. 3.
marginellus. 13.
pabulinus. 5.
pallens. 7.
ſtriatus. 14.
Ulmi. 16.
vagans. 11.
virens. 6.

92. MOLORCHUS. Tom. I. b. pag. 356—357.

abbreviata. 1.
dimidiata. 3.
Umbellatarum. 4.
variegata. 2.

182. MONOCULUS. Tom. II. pag. 489—502.

Fam. 1. Teſta univalvi, ocul. duob. 1—4.
Fam. 2. — — — unico. 5—10.
Fam. 3. Teſta bivalvi, ocul. unico, antenn. ramoſis. 11—19.
Fam. 4. — — — — — ſimplicib. 20—24.
Fam. 5. — — — — — apice floccoſis. 25—35.
Fam. 6. — — ocul. duob., ant. capillac. 36—44.
Fam. 7. Corpore cruſtaceo, ocul. unic., ant. ſimplic. 45—52.
Fam. 8. Teſta nulla, oculo unico. 53—54.

Apus. 1.
Argulus. 3.
Bachus. 8.
biſpinoſus. 17.
brachyurus. 36.
bracteatus. 9.
candidus. 35.
captivus. 53.
chelifer. 51.
claviger. 48.

coarctatus. 24.
coeruleus. 46.
conchaceus. 31.
craſſicornis. 50.
craſſus. 34.
cryſtallinus. 18.
curviroſtris. 16.
detectus. 25.
faſciatus. 28.
Faunus. 7.
flavidus. 22.
gibbus. 23.
laevigatus. 27.
laevis. 14.
lamellatus. 39.
longicornis. 52.
longiroſtris. 42.
longiſpinus. 12.
luteus. 21.
macrourus. 43.
minutus. 45.
Monachus. 33.
ornatus. 26.
Pediculus. 54.
piloſus. 32.
piſcinus. 2.
Pulex. 11.
quadrangularis. 38.
quadrangulus. 13.
quadricornis. 49.
rectiroſtris. 15.
rubens. 47.
ſalmoneus. 4.
ſaltatorius. 10.
Satyrus. 5.
ſetiferus. 19.
Silenus. 6.
Socors. 44.
ſphaericus. 37.
ſtrigatus. 29.
trigonellus. 40.
truncatus. 41.
viduatus. 30.
viridis. 20.

73. MORDELLA. Tom. I. b. pag. 113 — 115.

abdominalis. 6.
aculeata. 1.
atra. 10.
faſciata. 2.
flava. 13.
frontalis. 9.
humeralis. 7.
lateralis. 8.
8-punctata. 3.
ruficollis. 12.
teſtacea. 4.
thoracica. 11.
ventralis. 5.

233. MUSCA. Tom. IV. pag. 312—361.

Fam. 1. Anten. ſeta plumata. 1—48.
Fam. 2. — — nuda. 49—202.

aenea. 98.
aeſtuans. 179.
albifrons. 69.
Americana. 14.
Annonae. 189.
annulata. 111.
arcuata. 170.
Arnicae. 166.
arrogans. 123.
Artemiſiae. 162.
aterrima. 93.
atrata. 89.
Augur. 37.
aurata. 97.
bifaſciata. 53.
braſſicaria. 63.
cadaverina. 21.
Caeſar. 17.
canicularis. 70.
canina. 38.
Cardui. 191.
carnaria. 3.
carnivora. 4.
cellaris. 85.
Centaureae. 199.
Ceraſi. 188.
chorea. 73.
ciliata. 87.
cimicoides. 115.
cincta. 144.
cinerea. 82.
clavata. 153.
combinata. 168.
compreſſa. 64.
compreſſa. 107.
connexa. 156.
contigua. 146.
cornicena. 20.
cornuta. 186.
corrigiolata. 113.
corvina. 31.
coſtalis. 196.
craſſicornis. 65.
craſſipennis. 185.
criſtata. 112.
Crux. 190.
cucularia. 136.
cupraria. 96.
curſitans. 114.
cyanea. 27.
cylindrica. 104.
cylindricornis. 86.
cynipſea. 160.
Dauci. 187.
diſcoidea. 155.
diſcolor. 34.
domeſtica. 11.
dorſalis. 173.
elata. 44.
elongata. 109.
Ephippium. 108.
equeſtris. 119.
Erinaceus. 66.
erythrocephala. 165.

faſciata. 102.
felina. 19.
feneſtralis. 77.
fera. 49.
ferruginea. 127.
filiformis. 105.
fimetaria. 140.
flava. 177.
flaveola. 130.
Florum. 164.
Frit. 90.
fucata. 194.
funebris. 48.
furcata. 131.
Germinationis. 183.
glabrata. 121.
Graminum. 143.
groſſa. 54.
Groſſificationis. 161.
Heraclei. 172.
Hieracii. 201.
hiſtrionica. 128.
Hyſtrix. 55.
iejuna. 1.
labiata. 74.
lardaria. 5.
Larvarum. 59.
lateralis. 68.
leonina. 24.
Leprae. 91.
lineata. 180.
livens. 135.
longicornis. 124.
longipennis. 47.
longipes. 110.
ludifica. 46.
lugens. 150.
lupulina. 45.
lurida. 52.
lutaria. 134.
Lychnidis. 197.
macellaria. 28.
maculata. 8.
mactans. 36.
manicata. 94.
marginata. 139.
meditabunda. 43.
megacephala. 18.
merdaria. 133.
meridiana. 2.
meteorica. 88.
minuta. 202.
moerens. 151.
Mortuorum. 23.
Nebulo. 35.
nigricornis. 81.
nigripennis. 141.
nigripes. 30.
nigripes. 122.
nobilitata. 118.
notata. 120.
obſcura. 10.
occidua. 12.
Oleae. 152.
Onopordinis. 198.
oratoria. 132.
pagana. 61.
pallida. 33.
pallipes. 116.
parietina. 154.
pennipes. 149.
petronella. 103.

picta.

picta. 175.
plebeja. 40.
pluvialis. 71.
polita. 99.
pubera. 101.
pulchella. 167.
punctata. 147.
Punctum. 159.
Puparum. 58.
putrida. 16.
putris. 92.
4-faſciata. 126.
4-maculata. 84.
4-punctata. 178.
4-puſtulata. 50.
Radicum. 60.
reticulata. 145.
retuſa. 15.
rotalis. 76.
Roſae. 181.
roſtrata. 125.
rotundata. 57.
rudis. 9.
ruficauda. 169.
ruficornis. 6.
rufifrons. 142.
rugoſa. 78.
ruſtica. 41.
rutilans. 7.
Scabioſae. 200.
ſcalaris. 83.
ſcybalaria. 137.
Seminationis. 174.
ſenilis. 79.
ſerrata. 80.
Serratulae. 182.
ſolſtitialis. 195.
ſtercoraria. 138.
ſtriata. 13.
ſtrigoſa. 39.
ſtrigula. 95.
ſtygia. 22.
ſtylata. 168.
ſubſultans. 72.
ſuilla. 129.
Syngeneſiae. 192.
teſſellata. 51.
teſtacea. 32.
tigrina. 42.
tipularia. 106.
tremula. 56.
Tuſſilaginis. 193.
Umbellatarum. 171.
umbraculata. 148.
Umbrarum. 157.
ungulata. 117.
Urticae. 184.
varia. 62.
verna. 75.
Veſpillo. 26.
vibrans. 158.
viduata. 100.
vittata. 176.
Volvulus. 67.
vomitoria. 25.
vulpina. 29.

163. MUTILLA. Tom. II. pag. 366 — 372.

Americana. 5.
Antiguenſis. 2.
arenaria. 16.
atrata. 11.
aurata. 8.
Barbara. 17.
ciliata. 23.
coccinea. 1.
coronata. 14.
Diadema. 4.
Ephippium. 18.
erythrocephala. 24.
Europaea. 9.
exſulans. 7.
formicaria. 6.
glabrata. 25.
Guineenſis. 3.
Halenſis. 15.
Hungarica. 13.
Italica. 19.
Maura. 12.
melanocephala. 27.
nigripes. 28.
Pedemontana. A. 461.
regalis. 21.
ruficollis. 22.
ruficornis. 10.
rufipes. 26.
vagans. S.
verſicolor. 20.

---

105. MYCETOPHAGUS. Tom. I. b. pag. 497 — 500.

atomarius. 4.
bicolor. 2.
bifaſciatus. 15.
caſtaneus. 12.
dermeſtoides. 3.
faſciatus. S.
fulvicollis. 8.
metallicus. 13.
multipunctatus. 5.
nigricornis. 11.
piceus. 9.
picicornis. 6.
punctatus. 10.
4-maculatus. 1.
ſanguinicollis. 7.
teſtaceus. 14.

---

225. MYDAS. Tom. IV. pag. 252 — 253.

bilineatus. 3.
filatus. 1.
illucens. 2.

---

63. MY.

63. MYLABRIS. Tom. I. b. pag. 87—90.

Algirica. 5.
argentata. 12.
Capenſis. 6.
Cichorei. 2.
10 punctata. 9.
faſciata. 1.
Hermanniae. 7.
marginata. 4.
praeuſta. 3.
Punctum. 8.
4-punctata. 10.
trimaculata. 11.

239. MYOPA. Tom. IV. pag. 397—399.

annulata. 10.
atra. 3.
buccata. 5.
cincta. 7.
cinerea. 9.
cingulata. 8.
dorſalis. 1.
ferruginea. 2.
punctata. 6.
teſtacea. 4.

133. MYRMELEON. Tom. II. pag. 92—95.

caninum. 10.
Catta. 6.
Ermineum. S.
Formicalynx. 8.
formicarium. 5.
libelluloides. 1.
lynceum. 4.
muſtelinum. S.
pantherinum. 3.
Pardalis. 2.
punctatum. 7.
tigrinum. 9.
urſinum. S.

210. NAUCORIS. Tom. IV. pag. 66—67.

aeſtivalis. 2.
cimicoides. 1.
curſitans. 4.
nepaeformis. 3.

91. NECYDALIS. Tom. I. b. pag. 350—355.

atra. 11.
Barbara. 7.
bicolor. 21.
clavipes. 22.

coeru-

coerulea. 19.
coeruleſcens. 3.
cyanea. 5.
fulvicollis. 16.
glauceſcens. 24.
humeralis. 12.
melanocephala. A. 453.
melanura. 14.
notata. 15.
Podagrariae. 20.
praeuſta. 18.
Quercus. 26.
rufa. 17.
ruficollis. 9.
Sanguinicollis. 6.
ſeladonia. 8.
ſimplex. 25.
teſtacea. 23.
thalaſſina. 1.
triſtis. 10.
uſtulata. 13.
vireſcens. 4.
viridiſſima. 2.

229. NEMOTELUS. Tom. IV. pag. 269—271.

marginatus. 3.
punctatus. 4.
puſillus. 5.
uliginoſus. 1.
villoſus. 2.

208. NEPA. Tom. IV. pag. 61—63.

annulata. 2.
cinerea. 7.
fuſca. 4.
grandis. 1.
groſſa. 5.
maculata. 8.
rubra. 6.
ruſtica. 3.

38. NICROPHORUS. Tom. I. a. pag. 246—248.

Germanicus. 1.
grandis. 3.
Humator. 2.
Mortuorum. 5.
Veſpillo. 4.

40. NITIDULA. Tom. I. a. pag. 255—262.

abbreviata. 4.
aenea. 24.
aeſtiva. 6.
bicolor. 15.
bipuſtu[lata]

bipuſtulata. 1.
Colon. 16.
10-guttata. 11.
dimidiata. 27.
diſcoides. 19.
faſciata. S.
ferruginea. 8.
flexuoſa. 14.
floralis. 23.
haemorrhoidalis. 18.
hemiptera. 26.
imperialis. 10.
limbata. 17.
litura. 22.
marginata. 5.
obſcura. 3.
obſoleta. 7.
pedicularia. 20.
4-puſtulata. 2.
rufipes. 29.
6-puſtulata. 21.
ſordida. 13.
ſtrigata. 9.
teſtacea. A. 446.
truncata. 28.
varia. 12.
virideſcens. 25.

---

194. NOCTUA. Tom. III. b. pag. 8 — 126.

Fam. 1. Alis patulis. 1 — 25.
Fam. 2. Thorace levi, alis planis incumbentibus. 26 — 61.
Fam. 3. Thorace levi, alis deflexis. 62 — 146.
Fam. 4. Thorace criſtato, alis incumbentib. 147 — 207.
Fam. 5. Thorace criſtato, alis deflexis. 208 — 380.

Abrotani. 262.
Abſinthii. 261.
Aceris. 322.
Acetoſellae. 338.
achatina. 24.
advena. 375.
aemula. 230.
affinis. 258.
Albago. 210.
albicollis. 94.
albipes. 265.
albipuncta. 342.
Algae. 313.
alienata. 168.
Alni. 266.
Aluco. 6.
ambigua. 131.
ambuſta. 172.
Ancilla. 29.
annulata. 128.
aprilina. 306.
Arbuti. 380.
arcuata. 101.
argentina. 232.
Arnicae. 323.
Artemiſiae. 227.
Arundinis. 71.
Aſclepiades. 355.

Aſte-

Aſteris. 364.
Aſtrea. 35.
Atriplicis. 282.
Augur. 170.
Aurago. 211.
auricoma. 316.
aurita. 349.
avida. 89.
Baja. 329.
bajularia. 38.
Barbara. 334.
barbata. 96.
baſilinea. 376.
Batis. 73.
bicolora. 55.
bimaculoſa. 197.
blanda. 130.
Boleti. 61.
Bractea. 224.
Braſſicae. 189.
braſſicaria. 287.
brunnea. 278.
Bubo. 4.
caecimacula. 204.
calvaria. 353.
canina. 116.
Capreae. 58.
Caprimulgus. 7.
Caricae. 63.
centralis. 121.
Cerago. 213.
Ceraſi. 118.
Ceſpitis. 191.
Chalcis. 15.
Chamomillae. 365.
Chenopodii. 192.
Chi. 321.
Chione. 34.
~~Chenopodii. 192.~~
Chryſitis. 220.
ciliata. 243.
cincta. 186.
cinerea. 142.
circumflexa. 216.
Citrago. 215.
C. nigrum. 183.
Comma. 318.
complana. 53.
compta. 280.
Concha. 221.
conformis. 374.
conigera. 341.
conſona. 244.
contigua. 194.
convergens. 298.
convoluta. 59.
Corchori. 135.
coronata. 64.
Craccae. 180.
crepuſcularis. 17.
cribraria. 56.
Croceago. 209.
Crucis. 92.
culta. 279.
Cytherea. 157.
Dama. 69.
Delia. 57.
Delphinii. 267.
dentina. 196.
deperdita. 362.
depreſſa. 52.
depuncta. 327.
deraſa. 250.

deſtr

deſtituta. 104.
diffinis. 257.
diluta. 254.
dimidiata. 156.
Dioſcoreae. 26.
dipſacea. 83.
diſcolor. 136.
diſtincta. 199.
divergens. 231.
dotata. 153.
Dolichos. 283.
domeſtica. 48.
dorſalis. 141.
elata. 145.
electrica. 125.
emarginata. 240.
Epione. 163.
Eremita. 345.
erythrocephala. 331.
Eugenia. 36.
Euphorbiae. 324.
Exclamationis. 198.
exoleta. 361.
Ferrago. 217.
Feſtucae. 225.
Ficus. 62.
fimbria. 165.
fixa. 123.
Flammatra. 190.
flammea. 248.
flava. 139.
flavicornis. 352.
flavocincta. 344.
formoſa. 154.
fortificata. 144.
Fraxini. 152.
frugalis. 138.
Fulvago. 208.
fulminans. 311.
Fulvia. 80.
fumoſa. 348.
Gamma. 228.
geographica. 271.
gemina. S.
geometrica. 107.
Geryon. 67.
Giluago. 219.
glyphica. 82.
Goſſypii. 286.
Gothica. 249.
gracilis. 132.
griſea. 193.
griſeſcens. 332.
hecta. 359.
hepatica. 337.
hieroglyphica. 10.
Hircus. 66.
hiſtrionica. 285.
humilis. 120.
hymenaea. 161.
Hypatia. 98.
Hyperici. 272.
Janthina. 166.
illibata. 25.
illuſtris. 245.
~~Itynx. 13.~~
imbecilla. 340.
inclyta. 113.
inquinata. 93.
inſtabilis. 119.
Interrogationis. 233.
Jota. 237.

Joviana. 111.
Iphianaſſe. 5.
irrorata. 43.
Italica. 95.
ilunx. 13.
lactea. 369.
lacera. 246.
Lactucae. 367.
laeta. 39.
L. album. 205.
Lamda. 317.
lamina. 223.
lanceolata. 146.
leonina. 68.
Leucomelas. 297.
libatrix. 181.
Lichenes. 312.
Liguſtri. 303.
Linariae. 274.
Linea. 319.
linogriſea. 160.
lithoxylea. 371.
litura. 326.
livida. 42.
lucipara. 294.
lucipeta. 291.
ludifica. 309.
lunaris. 178.
lunata. 239.
luſca. 320.
luſoria. 179.
Luteago. 216.
Lychnidis. 122.
lyncea. 106.
Manlia. 65.
martia. 78.
marginata. 260.
marginella. 70.
materna. 27.
Maura. 177.
megacephala. 325.
mendica. 276.
mercatoria. 175.
Meretrix. 167.
meticuloſa. 242.
Mezenteria. 108.
Mi. 85.
microrhoea. 30.
minioſa. 114.
mixta. 91.
mixta. 356.
Moneta. 229.
monilis. 124.
munda. 129.
mutabilis. 12.
Mycerina. 9.
myopa. 351.
Myrtilli. 379.
Narbonea. 60.
Narciſſus. 37.
nervoſa. 49.
nigricans. 346.
nitida. 75.
nivea. 210.
Noctilio. 14.
notacula. 45.
notata. 103.
Nun atrum. 185.
nupta. 148.
occulta. 263.
oculea. 350.
odora. 8.
oleracea. 295.

Ononis. 54.
Oo. 247.
Or. 253.
orbona. 158.
orichalcea. 222.
Oxyacanthae. 277.
Pacta. 149.
Pagana. 207.
Pallens. 47.
Palliata. 97.
Palmata. 100.
Pandroſa. 21.
Panthea. 8.
Paphia. 169.
Paphos. 33.
Paranympha. 164.
Partita. 176.
Patibulum. 264.
Patroclus. 2.
Pauperata. 241.
Peponis. 236.
Perflua. 347.
Perla. 310.
Perſicariae. 335.
Perſpicillaris. 273.
Petrificata. 372.
Picta. 270.
Pinaſtri. 302.
Piſi. 275.
Piſtacina. 328.
Plecta. 182.
Polita. 40.
Polygona. 333.
Polymita. 188.
Polyodon. 343.
Praecox. 289.
praſina. 281.
promiſſa. 150.
pronuba. 155.
Pſi. 315.
Pteridis. 269.
pulcra. 88.
Punctum. 87.
Pupilla. 195.
purpurina. 268.
putris. 370.
pyramidea. 290.
pyrophila. 292.
quadra. 54.
4-punctata. 46.
Quaeſtionis. 235.
Quercus. 44.
radicea. 377.
rapta. 162.
rectangula. 187.
rejecta. 143.
renata. 251.
repanda. 133.
retuſa. 174.
rhizolitha. 373.
ridens. 360.
rivularis. 300.
Roboris. 90.
rubiginea. 76.
rubricoſa. 330.
ruficollis. 255.
rufina. 77.
Rumicis. 358.
runica. 305.
rurea. 378.
Rutilago. 214.
Salaminia. 28.

ſatellitia. 256.
ſcutoſa. 81.
Segetis. 171.
ſeladonica. 308.
ſerena. 301.
Serici. 252.
ſerva. 31.
ſetoſa. 288.
Sidae. 50.
ſignata. 234.
ſignifera. 202.
Signum. 184.
Silene. 74.
ſinuata. 284.
Solani. 159.
ſordida. 137.
Spectrum. 151.
ſpiralis. 16.
Sponſa. 147.
ſqualida. 20.
ſtigmatizans. 140.
ſtolida. 109.
ſtrigilis. 304.
ſtrigoſa. 79.
Strix. 3.
ſtupoſa. 112.
ſubterranea. 200.
ſubtuſa. 173.
ſuffuſa. 201.
Sulphurago. 212.
Tanaceti. 366.
tetra. 41.
tigrina. 105.
Tirrhaea. 32.
Tragopoginis. 336.
trapezina. 117.
Triangulum. 99.
tridens. 314.
triplaſia. 354.
triptera. 259.
triquetra. 86.
triſtis. 357.
troglodyta. 18.
Turca. 339.
typica. 293.
Ulula. 11.
umbratica. 368.
umminea. 22.
undata. 126.
urſina. 115.
Vaccinii. 51.
valligera. 203.
Vampyrus. 19.
Verbaſci. 363.
verſicolor. 134.
Verruca. 238.
Veſpertilio. 23.
viminalis. 206.
virens. 307.
vireſcens. 72.
vittata. 127.
vulpina. 102.
Xanthographa. 296.
Zenobia. 1.

160. NOMADA. Tom. II. pag. 345 — 349.

agreſtis. 6.
albilabris. 13.
cingulata. 15.
Fabriciana. 10.
fulvicornis. 11.
gibba. 12.
Hattorfiana. 14.
Hiſtrio. 1.
punctata. 3.
ruficornis. 7.
rufipes. 8.
ſcutellaris. 2.
ſtriata. 9.
tibialis. 4.
variegata. 5.

206. NOTONECTA. Tom. IV. pag. 57 — 59.

Americana. 4.
furcata. 2.
glauca. 1.
maculata. 3.
minutiſſima. 6.
nivea. 5.

28. NOTOXUS. Tom. I. a. pag. 210 — 212.

antherinus. 9.
bifaſciatus. 3.
bipunctatus. 8.
Chinenſis. A. 444.
cornutus. 7.
dubius. 4.
floralis. 10.
Indicus. A. 444.
minutus. 11.
mollis. 5.
monoceros. 6.
porcatus. 1.
violaceus. 2.

247. NYMPHON. Tom. IV. pag. 417.

groſſipes. 1.
hirtum. 2.

O C Y P O D E. S.

223. OESTRUS. Tom. IV. pag. 230 — 232.

Bovis. 3.
buccatus. 1.
Equi. 7.
Ovis. 8.

Pecorum. 2.
Tarandi. 5.
Trompe. 6.
Vituli. 4.

69. OMALYSUS. Tom. I. b. pag. 103—104.

ſuturalis. 1.

169. ONISCUS. Tom. II. pag. 396—397.

Armadillo. 5.
Aſellus. 3.
maculatus. 1.
puſtulatus. 2.
ſylveſtris. 4.

8. OPATRUM. Tom. I. a. pag. 88—91.

Agricola. 14.
arenarium. 8.
clathratum. 9.
crenatum. 6.
depreſſum. S.
gibbum. 4.
glabratum. 7.
granulatum. 11.
griſeum. 1.
laevigatum. 5.
minutum. 15.
orientale. 12.
planum. 10.
porcatum. 2.
puſillum. 16.
ſabuloſum. 3.
ſtrigatum. S.
tibiae. 13.

O R I T H Y I A. S.

116. OXYPORUS. Tom. I. b. pag. 531—536.

abdominalis. 17.
analis. 10.
bimaculatus. 8.
bipuſtulatus. 9.
brunneus. 19.
cellaris. 5.
chryſomelinus. 15.
dimidiatus. S.
flavipes. 14.
Hypnorum. 22.
lunulatus. 3.
marginatus. 6.
marginellus. 23.
maxilloſus. 2.
melanocephalus. 16.
merdarius. 11.

minutus. 20.
pygmaeus. 13.
rufipes. 21.
rufus. 14
ſubterraneus. 4.
teſtaceus. 18.
thoracicus. 12.
trimaculatus. 7.

117. PAEDERUS. Tom. I. b. pag. 536 — 538.

brunnipes. 5.
elongatus. 3.
filiformis. 8.
fulgidus. 6.
fulvipennis. 4.
melanocephalus. 10.
orbiculatus. 9.
riparius. 1.
ruficollis. 2.
tricolor. 7.

176. PAGURUS. Tom. II. pag. 468 — 471.

alatus. 11.
aniculus. 2.
araneiformis. 12.
Bernhardus. 3.
clypeatus. 7.
Diogenes. 5.
Eremita. 8.
Hungarus. 4.
Latro. 1.
Miles. 6.
oculatus. 10.
tubularis. 9.

P A L A E M O N. S.

P A L I N U R U S. S.

135. PANORPA. Tom. II. pag. 97 — 98.

Coa. 7.
communis. 1.
faſciata. 4.
Germanica. 2.
hyemalis. 5.
Scorpio. 3.
tipularia. 6.

18 **1. PAPILIO. Tom. III. a. pag. 1 — 258.**

Fam. 1. Equites Troiani (T) 1 — 63.
Fam. 2. Equites Achivi (A) 64 — 114.
Fam. 3. Feſtivi (F) 115 — 190.
Fam. 4. Nymphales (N) 191 — 490.
Fam. 5. Heliconii (H) 491 — 559.
Fam. 6. Parnaſſii (P) 560 — 573.
Fam. 7. Danai (D) 574 — 667.
Fam. 8. Satyri (S) 668 — 798.

Abſalon. F. 174.
Acamas. T. 22.
Aceris. S. 763.
Aceſte. S. 764.
Achates. T. 24.
Acheronta. N. 239.
Achilles. N. 253.
Actaea. S. 705.
Adippe. N. 448.
Aeclus. N. 198.
Aedea. H. 536.
aegeria. N. 293.
Aegle. H. 527.
Aegiſtus. N. 215.
Aeneas. T. 50.
Aenippe. D. 639.
Aeropus. N. 473.
Aethiopa. N. 420.
Afra. S. 738.
affinis. F. 181.
Agamemnon. A. 98.
Agapenor. A. 76.
Agatha. N. 414.
Agave. D. 599.
Agenor. T. 5.
Aglaia. N. 442.
Ajax. A. 97.
Alcibiades. A. 72.
Alcippus. F. 155.
Alcmeone. D. 611.
Alcyone. S. 724.
Alimena. N. 312.
Allica. S. 761.
Allionia. N. 322.
Almana. N. 278.
Alope. S. 715.
Althea. N. 347.
Amalia. N. 398.
Amaryllis. D. 586.
Amaſia. N. 419.
Amata. D. 633.
Amathea. N. 392.
Amathonte. D. 589.
Amathuſia. S. 791.
Ameſtris. N. 360.
Amphiceda. N. 348.
Amphimachus. A. 110.
amphimedon. T. 45
Amphinome. N. 404.
Amphitrion. A. 111.
Amphriſius. T. 35.
~~Amphimedon. T. 45.~~
Anacardii. P. 567.

Ancaeus. N. 474.
Anchiſes. T. 40.
Androgeus. T. 43.
Andromacha. P. 564.
Andromeda. P. 569.
Antenor. T. 7.
Antheus. A. 105.
Antilochus. A. 70.
Antimachus. T. 31.
Antiocha. H. 538.
Antiochus. F. 134.
Antiopa. N. 355.
Antiphates. A. 72.
Antiphus. T. 28.
Aphrodita. N. 443.
Apollo. P. 560.
Aranea. N. 299.
Arachne. S. 740.
Arcadius. N. 463.
Arcanius. S. 692.
Arcas. N. 483.
Arceſilaus. N. 470.
Archeſia. N. 363.
Archippus. F. 150.
Arctous. S. 696.
Arduinna. S. 788.
Arete. S. 743.
Arethuſa. S. 726.
Arethuſus. F. 130.
Argante. D. 584.
Arge. S. 746.
Argenthona. D. 624.
Argia. D. 587.
Ariadne. N. 383.
Ariſtides. N. 268.
Arminius. N. 478.
Arſinoe. N. 233.
Artemis. S. 790.
Artemiſia. N. 313.
Aſcanius. T. 8.
Aſius. T. 21.
Aſpaſia. H. 526.
aſſimilis. A. 114.
Aſtenous. T. 58.
Aſterias. T. 16.
Aſterie. N. 279.
Aſtina. N. 251.
Aſtyanax. T. 37.
Atalanta. N. 362.
Athulia. S. 783.
Atlita. N. 300.
Auge. S. 773.
Aurelius. N. 222.
Aurora. D. 650.
Aurota. D. 614.
Automedon. N. 272.
Autonoe. S. 723.
Avia. N. 342.
Bankia. N. 327.
Baldus. S. 699.
Bathſeba. S. 733.
Belia. D. 645.
Bella. N. 245.
Belladonna. H. 557.
Bellona. N. 454.
Belus. T. 53.
Berecynthus. N. 462.
Berenice. N. 350.
Bernardus. N. 223.
Beroe. N. 341.
Bianor. T. 2.
Biblis. N. 365.

Biſaltide. N. 232.
Braſſalis. H. 520.
Braſſicae. D. 574.
Briſeis. S. 721.
Brutus. A. 65.
Blandina. N. 397.
Blandina. S. 736.
Blomfildia. N. 326.
Bolina. N. 384.
Bonaſia. H. 551.
Cacta. N. 356.
Cadma. S. 751.
Caecilia. H. 550.
C. album. N. 380.
Calirrhoe. D. S.
Calliope. H. 493.
Calliſto. N. 338.
Calypſo. D. 592.
Camilla. S. 767.
Camillus. N. 193.
Camoena. H. 539.
Canthus. N. 484.
Caon. T. 27.
Cardamines. D; 600.
Cardui. N. 320.
Carinenta. N. 428.
Caſſiae. N. 461.
Caſſiope. S. 742.
Caſtalia. D. 580.
Caſtor. N. 196.
Catilla. D. 656.
Cato. N. 258.
C. aureum. N. 243.
Cenaeus. F. 143.
Cepha. H. 524.
Ceres. N. 256.
Cethis. N. 430.
Cethoſia. N. 440.
Chalcas. A. 90.
Charitonia. H. 528.
Charmione. D. 641.
Charonia. N. 364.
Chebys. N. 249.
Chiron. A. 78.
Chloris. D. 608.
Chorinaeus. N. 225.
Chremes. F. 144.
Chrethon. A. 79.
Chryſippe. N. 344.
Chryſippus. F. 154.
Cinxia. S. 779.
Cipris. D. 663.
Circe. S. 728.
Clara. H. 499.
Claudia. N. 325.
Claudius. F. 119.
Clelia. N. 285.
Cleopatra. D. 667.
Clerimon. S. 678.
Clio. H. 531.
Clueria. S. 716.
Clymene. S. 753.
Clymenus. F. 131.
Clytemneſtra. N. 375.
Clytia. N. 387.
Clytus. S. 671.
Cneora. D. 594. (626).
Cocalia. S. 777.
Cochrus. F. 125.
Cocles. N. 204.
Cocyta. N. 388.
Cocytus. F. 171.

Codo-

Codomannus. F. 165.
Codrus. A. 89.
Coenobita. S. 769.
Columbina. N. 453.
Conſtantius. N. 468.
Cordula. S. 708.
Cornelius. S. 689.
Coronea. D. 628.
Corounis. D. 619.
Corus. F. 122.
Crataegi. P. 563.
Crantor. N. 489.
Creſpontes. A. 95.
Creſſida. T. 62.
Crino. T. 13.
Criſia. H. 515.
Crithea. N. 406.
Croeſus. S. 676.
Cupavius. N. 467.
Curius. A. 81.
Cybele. N. 445.
Cydippe. N. 345.
Cymodoce. N. 231.
Cynara. N. 439.
Cynorta. A. 109.
Cyntheus. F. 129.
Cynthia. S. 786.
Cyone. N. 352.
Cypraea. D. 634.
Cypariſſias. F. 115.
Cyrus. T. 19.
Cytherea. N. 441.
Daedalus. F. 162.
Damocles. F. 121.
Danae. D. 635.
Daphne. S. 798.
Daplicide. D. 593.
Dardanus. T. 29.
Dardus. N. 482.
Darius. F. 161.
Davus. S. 690.
Decius. N. 210.
Deiphobus. T. 14.
Dejanira. S. 719.
Delila. (Celline Cram.) F. 176.) S. 731.
Demoleus. A. 101.
Demophile. D. 596.
Demophon. N. 265.
Dia. S. 792.
Diana. N. 447.
diaphanus. P. 570.
Dictynna. S. 785.
Dido. F. 177.
didyma. S. 781.
Dimas. T. 47.
Diocletianus. F. 118.
Diomedes. A. 68.
Diocippus. F. 158.
Dirce. N. 376.
Dirtea. F. 184.
diſſimilis. A. 113.
Dolicaon. A. 66.
Dorcus. N. 212.
Doriclea. S. 772.
(Dorimene. N.) 314.
{Doris. N. (Dorimene.) 314.
{Doris. H. 513.
Dorothea. D. 602.
Dromus. S. 701.
Druſius. F. 172.
Drya. D. 659.

Dryaſis. F. 117.
Dryope. S. 793.
Dyndimene. N. 335.
Echo. N. 368.
Eduſa. D. 643.
Egaea. N. 309.
Egena. H. 500.
Elathea. D. 610.
Elea. N. 434.
Eleus. F. 156.
Elorea. D. 603.
Empedocles. N. 217.
Enothrea. F. 183.
Ephynes. S. 703.
Epius. A. 102.
Epiphron. S. 735.
(Epiſtrophus. N.) 262.
Erato. H. 557.
Ereſimus. F. 152.
Eribotes. N. 229.
Erina. S. 739.
Erippus. F. 152.
Erithonius. N. 255.
Erota. N. 237.
Erymanthis. N. 427.
Etheocles. N. 200.
Etheſia. S. 774.
Ethus. S. 680.
Eubule. D. 655.
Eucharis. D. 605.
Eudora. S. 755.
Eudoxia. D. 620.
Eudoxus. N. 203.
Eumenus. S. 703.
Eumeus. N. 481.
Eupalus. F. 148.
Eupheno. D. 644.
Euphroſine. N. 450.
Eurinome. F. 178.
Eurita. H. 534.
Eurithris. N. 485.
Euritrea. H. 556.
Eurocilia. N. 247.
Europa. N. 238.
Euryalus. N. 218.
Eurypylus. F. 61.
Euterpe. H. 552.
Eva. H. 501.
Evalthe. F. 136.
Evippe. D. 640.
Fabius. N. 201.
F. album. N. 431.
Faſcelis. S. 782.
Fatima. N. 252.
Fauna. S. 709.
Feronia. S. 710.
Ferula. S. 707.
Fidia. S. 706.
Flegia. S. 760.
Flippantha. D. 631.
Flirtea. N. 281.
Florella. D. 666.
Florimel. S. 673.
Fortunatus. S. 670.
Furcula. N. 246.
Galanthis. F. 142.
Galathea. S. 745.
Gambriſius. N. 264.
Gea. H. 543.
Genutia. D. 601.
Gerdrudtus. N. 224.
Gilippus. F. 159.

Glaucippe. D. 618.
Glaucus. T. 11.
Glycerie. N. 291.
Gnidia. N. 422.
Gnoma. D. 658.
Gonerilla. N. 317.
Griela. S. 737.
Gripus. N. 457.
Haguinus. F. 169.
Halyma. S. 758.
Harmonia. T. 63.
Harpyja. N. 432.
Hecabe. D. 598.
Hecale. H. 516.
Hecate. S. 789.
Hector. T. 7.
Hecuba. N. 273.
Hedonia. N. 304.
Hegeſippus. F. 160.
Helena. T. 59.
Helenus. T. 3.
Heliacon. T. 60.
Heliodore. N. 401.
Hermes. N. 486.
Hermione. S. 727.
Hero. S. 695.
Herſe. S. 718.
Herſilia. S. 770.
Heſione. N. 308.
Heſperus. F. 145.
Hiarba. N. 391.
Hippia. F. 185.
Hippocoon. A. 112.
Hippodamia. H. 509.
Hippona. H. 559.
Homerus. A. 85.
Honorius N. 464.
Horatius. N. 202.
Horta. H. 491.
Hoſtilia. N. 399.
Huntera. N. 321.
Hyale. D. 649.
hyalinus. P. 571.
Hydaſpes. F. 167.
Hylla. S. 784.
Hyparete. H. 554.
Hypatia. H. 504.
Hyperanthus. S. 677.
Hyperbius. S. 672.
Hyperia. N. 366.
Hypheus. S. 698.
Hypſipyle. S. 668.
Jacinthae. F. 187.
Jairus. F. 168.
Janaſſia. N. 371.
Janira. S. 752.
Janthe. N. 315.
Jaſius. N. 191.
Jatrophae. N. 301.
Ida. S. 749.
Idaeus. T. 48.
Idalia. N. 446.
Idea. P. 573.
Idomeneus. N. 275.
Ilia. N. 340.
Ilithyia. N. 403.
Ilus. T. 51.
Interrogationis. N. S.
Io. N. 276.
Iodutta. H. 544.
Iole. N. 307.
Iphicla. N. 417.

Iphidamas. T. 52.
Iphigenia. D. 621.
Iphita. N. 337.
Irene. H. 510.
Iris. N. 339.
Irius. N. 487.
Iſidore. N. 244.
Iſis. N. 377.
Itea. N. 318.
Itys. N. 230.
Judith. D. 632.
Julia. H. 558.
Juliana. N. 332.
Juno. F. 190.
Lacedaemon. A. 107.
Laches. S. 717.
Laertes. N. 226.
Laertes. N. (Epiſtrophus.) 262.
Lais. F. 182.
Lamedia. N. 302.
Laminia. N. 361.
Lampetia. N. 290.
Laodice. N. 289.
Laodocus. T. 23.
Laomedon. T. 35.
Laothoe. N. 316.
Larra. D. S.
Laſinaſſa. N. 386.
Laſſus. F. 133.
Lathonia. N. 449.
Laura. N. 415.
Lavinia. A. 64.
Leander. S. 693.
Leda. N. 333.
Leilus. A. 63.
Lemonias. N. 282.
Lena. N. 334.
Leonidas. A. 103.
Lesbia. D. 652.
Lethe. N. 250.
Leucippe. D. 617.
Leucothoe. N. 395.
Levana. S. 794.
Liberia. N. 418.
Liberius. F. 126.
Libye. N. 303.
Libythea. D. 591.
Libythea. D. S.
Licas. F. 137.
Licarſis. A. 83.
Licinia. D. 613.
Ligea. S. 732.
Liria. N. 385.
Liria. S. (Thecla.) 747.
Liriope. N. 477.
Lubentia. N. 370.
Lucilla. S. 768.
Lucindus. N. 476.
Lucina. S. 778.
Lucretius. N. 261.
Luna. N. 336.
Lybia. H. 502.
Lycaon. S. 714.
Lycaſte. H. 497.
Lycia. H. 546.
Lycurgus. N. 209.
Lydia. N. 416.
Lyſander. T. 25.
Lyſidice. N. 480.
Lyſimnia. H. 498.
Macaria. H. 540.

Machaon. A. 87.
Maera. S. 711.
Maerula. D. 664.
Magus. S. 700.
Maja. N. 426.
Mandane. P. 565.
Manto. S. 722.
Marcellina. D. 638.
Marcia. H. 549.
Mardania. S. 776.
Marica. N. 346.
Martha. N. 429.
Martheſius. N. 469.
Martius. S. 686.
Maturna. S. 787.
Medea. N. 396.
Medon. N. 254.
Meduſa. S. 734.
Megaera. N. 292.
Melania. D. 629.
Melanthra. N. 394.
Meleagris. N. 393.
Meliboeus. A. 84.
Melicerta. S. 762.
Meliſſa. N. 433.
Melite. H. 494.
Melpomene. H. 529.
Meluſina. S. 750.
Memnon. T. 36.
Menelaus. N. 270.
Meneſtheus. A. 91.
Menetho. N. 260.
Mergus. N. 490.
Merione. N. 382.
Merope. N. 306.
Meſenteria. N. 435.
Meſſalina. D. 638.
Metellus. N. 274.
Midamus. F. 116.
Miltiades. N. 205.
Minerva. N. 295.
Mineus. N. 488.
Miriam. S. 754.
Mirus. F. 146.
Miſippus. F. 153.
Mizalia. F. 188.
Mneme. H. 496.
Mnemoſine. P. 562.
Monina. N. 390.
Monuſta. D. 585.
Mopſa. H. 495.
Morna. N. 331.
Morpheus. N. 479.
Morvus. N. 227.
Muſa. D. 607.
Muſca. H. 519.
Mutius. T. 6.
Mylitta. N. 312.
Myrina. N. 444.
Myrti. H. 522.
Myſis. D. 623.
Napi. D. 576.
Narica. D. 578.
Narva. S. 775.
Naſica. H. 523.
Nauplia. N. 400.
Neaerea. N. 424.
Nephte. D. 588.
Nerina. N. 410.
Neriſſa. D. 595.
Nerius. P. 568.
Nero. N. 471.

Neſtor.

Neſtor. N. 266.
Niavius. F. 120.
Nicaeus. F. 163.
Nicippe. D. 651.
Nigrina. D. 625.
Nina. D. 604.
Niobe. N. 452.
Niphe. N. 436.
Nircus. A. 106.
Niſus. N. 219.
Numilius. F. 164.
Nyſa. D. 606.
Obrinus. N. 475.
obſcuratus. P. 572.
Ocyrrhoe. N. 297.
Octavia. N. 369.
{Octavius. A. 82.
{Octavius. N. 228.
Ocypete. N. 296.
Odin. F. 175.
Oedippus. S. 681.
Oenone. N. 280.
Oethon. N. 465.
Oiſis. N. 378.
Olympia. H. 514.
Ophione. N. 402.
Opis. N. 405.
Oreſtes. A. 99.
Orion. F. 170.
Orontes. N. 214.
Orſilochus. A. 50.
Orythia. N. 284.
Palamedes. N. 213.
Palaeno. D. 648.
Pales. S. 797.
Palinurus. T. 12.
Pammon. T. 20.
Pamphilus. S. 691.
Pandarus. T. 57.
Pandora. S. 796.
Panope. F. 186.
Panthera. N. 234.
Panthous. T. 56.
Paphia. N. 438.
Paris. T. 1.
Parrhaſia. H. 549.
Paſiphae. H. 548.
Paſithoe. H. 555.
Paſſiflorae. F. 189.
Paullina. D. 583.
Paullus. N. 199.
Pelaga. S. 720.
Pelasgus. F. 139.
Pelaus. T. 15.
Pelea. N. 409.
Penelea. N. 286.
Penelope. N. 298.
Pentheſilea. N. 349.
Peranthus. T. 44.
Periander. N. 208.
Periboea. S. 730.
Perſea. N. 423.
Perſeus. N. 267. (S. 685.)
Perſiphone. H. 542.
Phaedra. S. 729.
Phaeruſa. N. 413.
Phaeton. F. 140.
Phalantha. N. 455.
Phalaris. F. 138.
Phegea. N. 407.
Phidippus. N. 220.
Philea. D. 662.

Philenor. T. 18.
Phileta. D. 590.
Philippa. D. 660.
Philocles. S. 674.
Philoctetes. N. 259.
Philomela. F. 179.
Phocion. S. 683.
Phoebe. S. 780.
Phoebus. P. 561.
Phorbanta. T. 17.
Phorcys. N. 248.
Phronima. D. 646.
Phryne. D. 612.
Phryneus. S. 697.
Phyllis. H. 530.
Piera. P. 566.
Piloſellae. S. 748.
Pinthaeus. F. 149.
Pipleis. N. 324.
Plexippus. F. 151.
Podalirius. A. 71.
Polixenes. N. 406.
Pollux. N. 197.
Polycaon. A. 96.
Polycarmes. N. 472.
Polychloros. N. 372.
Polydamas. T. 42.
Polydecta. N. 329.
Polydorus. T. 26.
Polymenus. F. 166.
Polymneſtor. T. 55.
Polymnia. H. 508.
Polynice. N. 277.
Polytes. T. 5.
Pomona. D. 665.
Pompejus. T. 54.
Pompilius. A. 74.
Poppea. D. 581.
Populi. N. 334.
Portia. N. 242.
Portlandia. N. 319.
Poſthumus. N. 458.
Priamus. T. 32.
Procris. N. 425.
Progne. N. 379.
Prorſa. S. 795.
Proſerpina. S. 713.
Proſope. N. 367.
Protenor. T. 38.
Proterpia. D. 657.
Proteſilaus. A. 69.
Protogenia. N. 359.
Pſamathe. D. 647.
Pſidii. H. 525.
Pylades. A. 100.
Pyranthe. D. 616.
Pyrrha. H. 547.
Pyrrha. S. 741.
Pyrrhus. N. 192.
Pythia. N. 357.
Quirina. H. 492.
Radamanthus. F. 127.
Rahel. D. 637.
Rapae. D. 575.
Raphani. D. 579.
Rebecca. N. 236.
Remus. T. 34.
Renatus. S. 675.
Rhamni. D. 661.
Rhodope. D. 609.
Ricini. H. 517.
Ripheus. A. 62.

Roh-

Rohria. N. 235.
Roſalia. H. 533.
Roxillana. S. 712.
Rumina. S. 759.
Saba. D. 627.
Sabaeus. S. 694.
Sabinus. N. 211.
Salamiſis. N. 408.
Salome. S. 744.
Saperdon. T. 41.
Sappho. H. 511.
Sara. H. 518.
Scylla. D. 630.
Selene. N. 451.
Semele. S. 725.
Semire. N. 351.
Sempronius. N. 194.
Sennae. D. 653.
Serena. H. 507.
Serina. N. 310.
Seſia. D. 636.
Sibilla. S. 766.
ſimilis. F. 180.
Sinapis. D. 577.
Sinon. A. 75.
Sirius. S. 688.
Siſamnus. F. 132.
Solandra. N. 328.
Solon. N. 216.
Sophia. S. 771.
Sophorae. N. 459.
Sophus. F. 141.
Soſybius. S. 684.
Stelenes. N. 263.
Sulpitia. S. 763.
Suſanna. H. 553.
Sylveſter. F. 124.
Sylvia. D. 582.
Syphax. F. 135.
Tabitha. S. 756.
Tarpeius. S. 669.
Telemachus. N. 269.
Terea. N. 288.
Terminus. S. 687.
Terpſichore. H. 506.
Teucer. N. 271.
Teutonia. D. 622.
Thais. N. 456.
Thales. H. 521.
Thalia. H. 532.
Thallo. H. 537.
(Thecla. S.) 746.
Themiſtocles. N. 207.
Therſander. A. 93.
Therſites. A. 88.
Theſeus. T. 4.
Thetys. N. 241.
Thoas. A. 94.
Thyaſtes. A. 77.
Thyelia. N. 437.
Thymetus. F. 173.
Tiridates. N. 195.
Tiſiphone. S. 757.
Titonia. D. S.
Tolumnia. N. 330.
Triangulum. N. 381.
Trite. D. 642.
Troglodyta. N. 240.
Troilus. T. 10.
Tros. T. 30.
Tulbaghia. N. 323.
Tullia. N. 305.

Tullius. S. 704.
Tulliolus. F. 123.
Turnus. A. 86.
Tynderaeus. A. 104.
Tytius. F. 147.
Ulyſſes. A. 67.
Umbra. H. 535.
undularis. N. 389.
Urania. H. 512.
Urſula. N. 257.
Urticae. N. 374.
V. album. N. 373.
Vaneſſa. D. 597.
Varanes. N. 206.
Vellida. N. 283.
Venilia. N. 411.
Veronica. N. 421.
Vertumnus. T. 49.
Veſta. H. 503.
Violac. H. 505.
Vitellia. N. 353.
Xanthus. N. 460.
Xiphares. N. 221.
Xiphia. N. 294.
Xuthus. A. 92.
Zachaeus. S. 679.
Zacynthus. T. 46.
Zangis. S. 682.
Zelima. N. 287.
Zelmira. D. 615.
Zenobia. A. 108.
Zenobia. N. 354.
Zetes. H. 541.
Zingha. N. 358.
Zoilus. F. 128.

---

87. PARNUS. Tom. I. a. pag. 245 — 246.

acuminatus. 2.
obſcurus. A. 445.
prolifericornis. 1.

P A R T H E N O P E. S.

---

81. PASSALUS. Tom. I. b. pag. 240 — 241.

dentatus. 2.
interruptus. 1.
minutus. 3.

---

248. PEDICULUS. Tom. IV. pag. 417 — 425.

Anſeris. 23.
Apis. 50.
Ardeae. 30.
Aſini. 11.
Bovis. 8.
Bufali. 7.

Buteonis. 14.
Cameli. 4.
Caponis. 41.
Cervi. 5.
Charadrii. 33.
Ciconiae. 32.
Columbae. 44.
Corvi. 16.
Cornicis. 17.
Cuculi. 21.
Cygni. 22.
Diomedeae. 27.
Embericae. 45.
Equi. 10.
Fulicae. 34.
Gallinae. 39.
Gruis. 31.
Gryllotalpae. 49.
Haematopi. 36.
Hirundinis. 48.
humanus. 1.
Infaufti. 18.
Lagopi. 43.
Meleagridis. 38.
Mergi. 24.
Motacillae. 47.
Orioli. 20.
Ovis. 6.
Pari. 46.
Pavonis. 37.
Phaſiani. 40.
Picae. 19.
Plataleae. 29.
Procellariae. 25.
Pubis. 2.
Recurviroſtrae. 35.
ricinoides. 3.
Sternae. 28.
Strigis. 15.
Tinnunculi. 13.
Tetraonis. 42.
Vanelli. 26.
Vituli. 9.
Vulturis. 12.

PENEUS. S.

196. PHALAENA. Tom. III. b. pag. 129—242.

Fam. 1. Antennis pectinatis. 1 — 122.
Fam. 2. Antennis ſetaceis. 123 — 334.
Fam. 3. Alis forficatis 335 — 427.

adſperſaria. 54.
adultata. 210.
aenealis. 380.
aerata. S.
aeſtuata. 290.
albicillata. 190.
albidaria. 48.
albulata. 277.
alchemillata. 236.
alniaria. 24.
alp

alpeſtralis. 350.
alpinalis. 370.
amataria. 13.
angularia. 55.
angulata. 127.
annularia. 64.
annulata. 307.
antennalis. 339.
apicalis. 417.
areata. 155.
arenata. 129.
argentalis. 419.
argentata. 291.
arteſiaria. 114.
aſinata. 199.
atomaria. 56.
atomata. 221.
atralis. 422.
aurantiata. 177.
aurata. 174.
aureolaria. 115.
averſata. 196.
barbalis. 338.
berberata. 189.
betularia. 103.
bicolorata. 161.
bidentaria. 15.
bifidalis. 387.
bilineata. 206.
bimaculata. 207.
bipunctalis. 386.
bipunctaria. 58.
(biſtrigata). 143.
bombycalis. 341.
brumata. 223.
brunnearia. 119.
brunneata. 266.
bupleuraria. 4.
candidata. 321.
capitalis. 375.
capitata. 289.
capreolaria. 65.
carbonaria. 88.
carinata. 146.
catenaria. 41.
catilinaria. 91.
caudata. 124.
cenaria. 92.
centaureata. 209.
centralis. 390.
centrata. 258.
centumnotata. 228.
cerata. 294.
ceſpitalis. 410.
chaerophillata. 200.
chenopodiata. 227.
cineralis. 379.
cineraria. 60.
cinerata. 142. (259).
cingulata. 285.
clathrata. 194.
clavellata. 197.
coarctata. 261.
coerulata. 185.
colorata. 172.
comitata. 170.
conſortaria. 29.
conſperſaria. 49.
corneata. 304.
cornicalis. 374.
corrigata. 268.
corvaria. 87.

coſtalis. 420.
coſtaria. 93.
coſtata. 287.
craſſalis. 349.
craſſaria. 21.
crataegata. 176.
crenaria. 109.
cretaria. 78.
cribata. 322.
cultraria. 17.
curtalis. 409.
cynata. 128.
dealbata. 173.
decorata. 158.
defoliaria. 68.
demandata. 138.
dentalis. 424.
dentaria. 27.
derogata. 331.
diagonalis. 358.
diaphanata. 283.
dimidialis. 356.
{ dimidiata. (biſtrigata.) 143.
{ dimidiata. 179.
Dioraria. 12.
diſcata. 334.
ditaria. 82.
diverſaria. 101.
diverſata. 195.
dolabraria. 32.
dorſalis. 376.
dubitata. 151.
duplicalis. 361.
duplicata. 234.
ejectata. 332.
elatalis. 389.
elevata. 325.
elinguaria. 107.
elongalis. 345.
emarginaria. 22.
emarginata. 160.
enſalis. 344.
equeſtraria. 23.
equeſtrata. 178.
erigalis. 408.
eroſalis. 405.
euphorbiata. 246.
excremata. 270.
explanata. 139.
exſpectata. 225.
exſultata. S.
falcata. 131.
falcataria. 16.
farinalis. 336.
faſcialis. 401.
faſciaria. 100.
faſciata. 126.
feneſtraria. 95.
feneſtrata. 333.
ferrugalis. 384.
ferrugata. 242.
fervidaria. 35.
feſtivaria. 84.
fimbrialis. 402.
fimbriata. 212.
flabellaria. 42.
flammata. 237.
flavalis. 393.
flavaria. 38.
flavata. 145.
flaveolata. 167.

flexula

flexuia. 132.
fluctualis. 412.
fluctuata. 202.
fornicalis. 353.
fuliginaria. 120.
fulvaria. 112.
fulvata. 215.
funerata. 302.
furcaria. 44.
furvata. 148.
fuſcata. 260.
geminata. 310.
gilvaria. 117.
gilvata. 296.
glabralis. 367.
glaucata. 135.
glaucinalis. 337.
grataria. S.
gravidata. 163.
griſaria. 108.
griſealis. 381.
groſſulariata. 162.
harpiaria. S.
haſtata. 192.
herbaria. 118.
heſperata. 166.
hexapterata. 233.
hirſutaria. 69.
hirtaria. 72.
hirtata. 187.
hiſpidaria. 71.
hiſpidata. 301.
horridaria. 73.
hortaria. 31.
hyalinata. 311.
janata. 222.
iatropharia. 89.
illibata. 191.
illyraria. 33.
immacularia. 7.
immorata. 269.
immutata. 273.
indicata. 330.
innata. 251.
inundata. 318.
irrorata. 144.
lacertinaria. 20.
lactearia. 1.
laetata. 125.
laevigata. 247.
lanccalis. 346.
lateraria. 94.
laterata. 284.
lemnata. 319.
lichenaria. 59.
lignaria. 111.
limbaria. 46.
limbata. 305.
linariata. 224.
lineolata. 231.
liturata. 134.
lividata. 149.
lucidata. 180.
luctinaria. 90.
luctuata. 239.
lunaria. 26.
lunulata. 235.
luſcaria. 63.
luſcata. 157.
lutearia. 52.
luteata. 256.
lynceata. 217.

maculatia. 40.
maculata. 244.
mantata. 133.
margaritalis. 363.
margaritaria. 10.
marginalis. 335.
marginaria. 102.
marginata. 182.
marinata. 298.
marmoralis. 394.
marmorata. 229.
medialis. 360.
mediata. 252.
melanaria. 51.
melata. 292.
mellinata. 220.
meritalis. 396.
metallata. 306.
miata. 183.
mimalis. 416.
minutalis. 426.
minutaria. 121.
minutata. 280.
moeniaria. 97.
monilaria. 34.
moniliata. 245.
monitalis. 359.
murinaria. 67.
murinata. 250.
myopata. 232.
naſſata. 278.
nemoralis. 348.
netrata. 136.
nigralis. 421.
nitata. 154.
nitata. 281.
nitidalis. 372.
nitidaria. 104.
nivealis. 388.
nivearia. 2.
nivearia. 77.
niveata. 286.
notata. 152.
nympheata. 316.
obſcurata. 150.
obliqualis. 357.
obliquaria. 98.
obliquata. 203.
obſoletalis. 373.
obſtipata. 257.
ocellata. 216.
ochrealis. 383.
ochreata. 265.
ocularia. 62.
omicata. 255.
opicata. 8.
Orientalis. 395.
ornata. 262.
oſſeata. 276.
pagaria. 85.
palealis. 382.
palpalis. 351.
paludata. 312.
paluſtrata. 315.
papilionaria. 39.
pedaria. 70.
pennaria. 14.
perſpectata. 323.
perſpicata. 300.
phylirata. 137.
pictaria. 76.
pictoralis. 391.

pingui-

pinguinalis. 377.
piniaria. 45.
plumbaria. 110.
pluviaria. 79.
politalis. 403.
politata. 123.
pollinalis. 423.
polygonalis. 397.
populata. 168.
poralis. 400.
porata. 159.
porphyralis. 414.
porrectalis. 352.
pollicata. 243.
potamogata. 313.
praſinaria. 80.
pratana. 116.
proboſcidalis. 343.
procellata. 201.
prodromaria. 105.
propugnata. 214.
proſapiaria. 57.
proximaria. 66.
prunaria. 43.
prunata. 175.
pſittacata. 238.
pudoralis. 392.
pudorata. 181.
pulchellata. 153.
pulveraria. 99.
punctalis. 371.
punctaria. 11.
punctata. 248.
punicalis. 415.
purpuralis. 413.
purpuraria. 113.
purpurata. 263.
puſaria. 61.
puſillata. 279.
putatoria. 8.
pygmaria. 122.
pyraliata. 169.
quadrifaſciata. 213.
4-punctalis. 418.
ramalis. 378.
rectangulata. 240.
recurvalis. 407.
regenerata. 275.
regulata. 130.
remutata. 274.
repandalis. 404.
repandata. 308.
reticulata. 204.
revidata. 329.
rhamnata. 140.
rivulata. 219.
roboraria. 28.
rondelaria. 36.
roraria. 50.
roſalis. 425.
roſata. 164.
roſtralis. 347.
rotaria. 8.
rubidata. 184.
rubiginata. 208.
rubricata. 264.
rufata. 186.
ruſticata. 218.
ſacharalis. 411.
ſacraria. 106.
ſagittata. 257.
ſalicalis. 369.

ſambucaria. 19.
ſambucata. 320.
ſanguinalis. 398.
ſcutata. 271.
ſecalis. 385.
ſecurata. 303.
ſericealis. 364.
ſinuata. 295.
ſmaragdaria. 81.
ſociata. 253.
ſophialis. 354.
ſordidata. 205.
ſpartiata. 188.
ſponſata. 156.
ſtictiata. 288.
ſticticalis. 399.
ſtratiolata. 314.
ſtriataria. 9.
ſtrigalis. 406.
ſtrigalis. S.
ſtrigaria. 18.
ſtrigata. 151.
ſtrigulata. 230.
ſuccenturiata. 241.
ſulphuraria. 47.
ſulphurata. 293.
ſyerata. 198.
ſyringaria. 25.
tentacularis. 342.
teſtalis. 368.
teſtaria. 53.
teſtata. 267.
thymiaria. 5.
togoſa. S.
trinalis. 365.
tripunctaria. 86.
tripunctata. 327.
triſtalis. 354.
triſtata. 193.
triſtriaria. 6.
uliginata. 317.
ulmata. 171.
umbicillata. 272.
undalis. 362.
undaria. 30.
undulata. 165.
urticata. 299.
variegalis. 355.
variegata. 282.
velutalis. 427.
velutata. 326.
venaria. 96.
venoſata. 249.
ventilabris. 340.
ventilata. 226.
verbaſcata. 309.
vernaria. 3.
verticalis. 366.
veſpertaria. 74.
vibicaria. 37.
violata. 297.
viridaria. 83.
viridata. 147.
vitrata. 324.
vittata. 328.
volutata. 211.
Wawaria. 75.

172. PHALANGIUM. Tom. II. pag. 429—431.

araneoides. 9.
bicolor. 1.
bilineatum. 5.
bimaculatum. 8.
carinatum. 7.
cornutum. 4.
Diadema. 6.
Morio. 2.
Opilio. 3.

---

154. PHILANTHUS. Tom. II. pag. 288—292.

arenarius. 5.
ater. 13.
auritus. A. 459.
coronatus. 1.
Diadema. 3.
flavipes. 7.
laetus. 10.
ornatus. 6.
5-cinctus. 9.
5-maculatus. 12.
ruficornis. 11.
rufipes. 4.
6-punctatus. 8.
Triangulum. 2.

---

130. PHRYGANEA. Tom. II. pag. 75—81.

analis. 3.
atomaria. 15.
atrata. 17.
azurea. 21.
bilineata. 24.
bimaculata. 19.
diſcoidea. 5.
Fennica. 16.
filoſa. 30.
flavicornis. 12.
fuſca. 4.
grandis. 9.
griſea. 14.
hirta. 26.
interrupta. 25.
irrorata. 11.
longicornis. 27.
marginata. 22.
minuta. 32.
nigra. 20.
notata. 18.
pallipes. 7.
piloſa. 6.
punctata. 29.
puſilla. 33.
4-faſciata. 28.
reticulata. 1.
rhombica. 13.
ſignata. 8.
ſtriata. 2.
Tigurinenſis. S.
tripunctata. 31.

varia. 10.
variegata. 23.
vittata. 8.

13. PIMELIA. Tom. I. a. pag. 99 — 106.

acuminata. 23.
angulata. 13.
anguſtata. 32.
bipunctata. 10.
carinata. 27.
ciliata. 28.
collaris. 26.
dentata. 16.
dentipes. 15.
echinata. 14.
faſciata. 25.
flavicollis. A. 438.
gibba. 3.
glabra. 31.
glabrata. 5.
globoſa. A. 438.
groſſa. 12.
hiſpida. 6.
laevigata. 4.
leucographa. 30.
lineata. 29.
longipes. 7.
maculata. 18.
minuta. 20.
muricata. 8.
orbiculata. 33.
porcata. 17.
reflexa. 24.
rugoſa. 21.
ruſtica. A. 438.
ſcabra. 11.
ſerrata. 19.
ſpinoſa. 22.
ſtriata. 1.
tuberculata. 9.
unicolor. 2.
varioloſa. A. 438.

127. PODURA. Tom. II. pag. 65 — 68.

ambulans. 17.
annulata. 12.
aquatica. 15.
arborea. 9.
atra. 4.
cincta. 11.
fimetaria. 16.
Lignorum. 13.
minuta. 6.
nivalis. 7.
plumbea. 5.
polypoda. 3.
puſilla. 14.
ſignata. 1.
vaga. 8.
villoſa. 10.
viridis. 2.

POSIDON. S.

82. PRIONUS. Tom. I. b. pag. 241—251.

arcuatus. 10.
armillatus. 18.
barbatus. 32.
bifaſciatus. 22.
bilineatus. 24.
buphthalmus. 14.
canaliculatus. 28.
cervicornis. 12.
cinnamomeus. 29.
coriarius. 15.
cylindricus. 17.
damicornis. 21.
depſarius. 8.
Faber. 6.
fuliginoſus. 2.
giganteus. 16.
lineatus. 4.
longimanus. 1.
Luzonum. 19.
maculatus. 11.
maxilloſus. 27.
melanopus. 30.
mucronatus. 9.
nitidus. 5.
palmatus. 26.
pectinicornis. 33.
roſtratus. 26.
ſcabricornis. 7.
ſerripes. 20.
ſpinibarbis. 25.
ſpinicornis. 13.
ſpinoſus. 31.
Thomae. 23.

200. PTEROPHORUS. Tom. III. b. pag. 345—349.

Albodactylus. 10.
calodactylus. 4.
didactylus. 3.
hexadactylus. 13.
leucodactylus. 5.
megadactylus. 11.
monodactylus. 1.
ochrodactylus. 2.
pentadactylus. 12.
pterodactylus. 9.
rhododactylus. 7.
teſſeradactylus. 8.
tridactylus. 6.

35. PTILINUS. Tom. I. a. pag. 242 — 244.

flaveſcens. 3.
muticus. A. 445.
myſtacinus. 1.
pectinatus. 4.
pectinicornis. 2.

34. PTINUS. Tom. I. a. pag. 239 — 242.

crenatus. 6.
denticornis. 8.
Fur. 4.
Germanus. 2.
imperialis. 5.
Latro. 7.
longicornis. 3.
pubeſcens. 1.
Scotias. 12.
ſerricornis. 9.
ſpinicornis. 10.
ſtriatus. 13.
ſulcatus. 11.

218. PULEX. Tom. IV. pag. 209 — 210.

irritans. 1.
penetrans. 2.

246. PYCNOGONUM. Tom. IV. pag. 416.

Balaenarum. 1.

197. PYRALIS. Tom. III. b. pag. 242—287.

abbreviana. 157.
abietana. 159.
Abildgaardana. 138.
achatana. 173.
Allionana. 83.
Alſtroemiana. 141.
ameriana. 33.
applana. 174.
arcuana. 72.
aſperana. 114.
aurana. 21.
aurana. 154.
avellana. 77.
Badierana. 88.
Bankiana. 1.
Baumanniana. 81.
Bergmanniana. 134.
Bierkandrana. 150.
bipunctana. 32.
Boeberana. 176.
borana. 120.
Boſeana. 116.

Brün-

Brünnichana. 65.
Buoliana. 75.
Burmanniana. 23.
candidana. 11.
caprana. S.
caudana. 124.
centrana. 133.
Chriſtiernana. 74.
chlorana. 8.
cinerana. 59.
communana. 69.
conſperſana. 102.
Conwayana. 149.
corylana. 76.
coſtana. 40.
cretana. 29.
criſtana. 109.
cruciana. 56.
Cynosbana. 167.
Daldorfiana. 135.
decimana. 80.
decuſſana. 31.
depreſſana. 180.
Desfontainiana. 110.
dorſana. 164.
duplana. 117.
elevana. 115.
emargana. 123.
epiphana. S.
Fabriciana. 143.
fagana. 5.
faſciana. 78.
flavana. S.
Forskahliana. 130.
Forſterana. 37.
Francillana. 94.
fuſcana. 35.
Gerningana. 99.
gnomana. 97.
Govana. 107.
griſeana. 96.
Grotiana. 127.
Hartmanniana. 36.
Haſtiana. 79.
Hattorfiana. 16.
Heiſeana. 82.
Hellwigiana. 146.
Heracleana. 178.
Herrmanniana. 18.
Holmiana. 93.
Hybnerana. 17.
Jacquiniana. 66.
ilicana. 100.
inundana. 19.
Iſertana. 163.
Kaekritziana. 57.
Koenigana. 153.
lectana. 30.
laetana. 63.
laevigana. 45.
laterana. 90.
Lecheana. 73.
Lediana. 85.
Leeana. 2.
liberana. S.
Lipſiana. 157.
litterana. 122.
Loefflingiana. 131.
Logiana. 106.
{ lunana. 3.
{ lunana. S.
Lundiana. 166.

luſca-

luſcana. 52.
maculana. 34.
margana. 61.
mediana. 172.
miniſtrana. 42.
Mitterbachiana. 170.
mixtana. 139.
Modeeriana. 91.
Müllerana. 147.
Mygindana. 168.
nigricana. 145.
nitidana. 144.
niveana. 108.
obliquana. 62.
ocellana. 129.
operana. 98.
orbana. S.
pallidana. 27.
pariana. 148.
Pasquayana. 24.
pavonana. 142.
Paykulliana. 128.
Penkleriana. 140.
Pflugiana. 46.
Pillerana. 38.
plumbana. 14.
pomana. 155.
populana. 67.
poſticana. 105.
praſinaria. 4.
profanana. 111.
profundana. 64.
punctulana. 113.
pupillana. 53.
quercana. 126.
reſinana. 171.
rivagana. 101.
rivellana. 158.
roborana. 89.
Rohrana. S.
Rolandriana. 95.
Romanana. 119.
roſana. 20.
Roſſiana. 68.
ruſana. 87.
ruſticana. 49.
Rutana. 179.
Saldonana. 39.
ſcabrana. 125.
Schalleriana. 86.
Scheſtediana. 152.
Schreberiana. 92.
Schulziana. 156.
Schumacheriana. 137.
Scopoliana. 162.
ſervana. 44.
6-punctana. 12.
Smeathmaniana. 28.
Smidtiana. 43.
Solandrana. 48.
Sparmanniana. 175.
ſponſana. 15.
ſquamana. 118.
Steinkellnerana. 104.
ſtictiana. 121.
ſtrigana. 165.
ſtrigulana. 103.
Stroemiana. 54.
ſulphurana. 132.
ſylvana. 6.
Thunbergana. 112.
trapezana. 51.

Trauniana. 70.
triangulana. 60.
trifaſciana. 25.
tripunctana. 169.
triſtana. 22.
Udmanniana. 47.
umbellana. 177.
uncana. 13.
undana. 160.
unguicana. 161.
Vahliana. 10.
variana. 84.
variegana. 50.
vernana. 9.
vetana. 26.
viburnana. 58.
viridana. 7.
Woeberana. 71.
Xyloſteana. 41.
Yeateana. 136.
Zoegana. 55.

---

70. PYROCHROA. Tom. I. b. pag. 104—105.

coccinea. 1.
10-maculata. 5.
flabellata. 3.
pectinicornis. 4.
rubens. 2.

---

209. RANATRA. Tom. IV. pag. 64—65.

elongata. 3.
filiformis. 1.
linearis. 2.

---

136. RAPHIDIA. Tom. II. pag. 99.

Ophiopſis. 1.

---

217. REDUVIUS. Tom. IV. pag. 193—208.

Acantharis. 52.
Aegypticus. 44.
albipes. 43.
annulatus. 16.
attelaboides. 23.
barbicornis. 4.
bicolor. 21.
bifidus. 40.
biguttatus. 41.
bipunctatus. 36.
bipuſtulatus. 14.
cinctus. 20.
collaris. 31.
cruentus. 18.
Diadema. 46.
elongatus. 55.

faſcia-

faſciatus. 50.
fornicatus. 53.
fuſcipes. 39.
Gigas. 1.
Guttula. 54.
haemorrhoidalis. 28.
hamatus. 37.
hirtipes. 27.
iracundus. 38.
leucocephalus. 45.
Lineola. 29.
Litura. 22.
longipes. 9.
maculatus. 5.
marginatus. 12.
Maurus. 51.
minutus. 56.
moeſtus. 19.
nigripennis. 11.
nigripes. 26.
nitidulus. 7.
perſonatus. 2.
Phalangium. 10.
pilicornis. 24.
pilipes. 8.
Punctum. 35.
quadridens. 25.
quadriguttatus. 34.
4-ſpinoſus. 48.
5-ſpinoſus. 47.
rufipes. 13.
ſanctus. 15.
ſanguineus. 17.
ſcutellaris. 49.
ſervatus. 42.
ſexguttatus. 33.
Stria. 30.
ſtridulus. 6.
varius. 32.
villoſus. 3.

230. RHAGIO. Tom. IV. pag. 271 — 276.

Ardea. 4.
atratus. 21.
bicolor. 11.
cinctus. 15.
Colombaſchenſis. 22.
Diadema. 20.
faſciatus. 8.
flavipes. 10.
fuſcatus. 7.
lineatus. 6.
Lineola. 17.
longicornis. 14.
maculatus. 12.
Morio. 18.
Nigrita. 19.
punctatus. 13.
ſcolopaceus. 1.
tipuliformis. 9.
tomentoſus. 16.
tringarius. 2.
Vanellus. 3.
Vermileo. 5.

87. RHAGIUM. Tom. I. b. pag. 303—306.

biſaſciatum. 7.
cinctum. 5.
clathratum. 8.
Curſor. 4.
Indagator. 3.
Inquiſitor. 2.
minutum. 10.
mordax. 1.
muticum. 11.
Noctis. 6.
ornatum. 9.

235. RHINGIA. Tom. IV. pag. 374—375.

lineata. 2.
muſcaria. 3.
roſtrata. 1.

101. RHINOMACER. Tom. I. b. pag. 393.

attelaboides. 2.
curculionoides. 1.

72. RIPIPHORUS. Tom. I. b. pag. 109—113.

bimaculatus. 9.
dimidiatus. 10.
ferrugineus. 2.
flabellatus. 6.
limbatus. 11.
lituratus. S.
naſutus. 3.
paradoxus. 5.
pectinatus. 4.
populneus. 12.
punctatus. 7.
6-maculatus. 8.
ſpinoſus. S.
ſubdipterus. 1.

55. SAGRA. Tom. I. b. pag. 51—52.

dentipes. 2.
femorata. 1.

88. SAPERDA. Tom. I. b. pag. 307—318.

analis. 29.
annulata. 34.
atricornis. 7.
barbicornis. 18.
bidentata. 30.
brunnea. 45.

candida. 3.
Carcharias. 1.
Cardui. 31.
clavicornis. 22.
cylindrica. 14.
detrita. 4.
diſcoidea. S.
emarginata. S.
Ephippium. 49.
erythrocephala. 19.
faſciata. 21.
femorata. 42.
ferruginea. 44.
griſea. 28.
haemorrhoidalis. A. 453.
hirta. (villoſa.) 10.
hirta. 51.
irrorata. 5.
lateralis. 26.
latipes. 23.
linearis. 12.
lineata. 35.
Lineola. 53.
longicornis. 45.
lyncea. 27.
melanocephala. 16.
modeſta. 6.
nigricornis. 32.
nigripes. 13.
oculata. 8.
praeuſta. 48.
picea. 50.
pilicornis. 17.
populnea. 37.
punctata. 39.
ruficollis. 20.
ſcalaris. 2.
ſcutellata. 52.
6-punctata. 25.
ſuturalis. 33.
teſtacea. 46.
tremula. 38.
tricolor. 9.
tripunctata. 15.
triſtis. A. 453.
unicolor. 11.
(villoſa.) 10.
violacea. 47.
vireſcens. 40.
vittata. 24.
Volvulus. 43.

110. SCAPHIDIUM. Tom. I. b. pag. 509—510.

agaricinum. 3.
4-maculatum. 1.
4-puſtulatum. 2.

2. SCARABAEUS. Tom. I. a. pag. 2—70.

Fam. 1. Scutellati thorace cornuto. 1—45.
Fam. 2. Scut. thorace inermi, capite cornuto. 46—95.
Fam. 3.

Fam. 3. Scut. mutici, capite thoraceque inermi. 96—131.
Fam. 4. Exſcutellati thorace cornuto. 132—162.
Fam. 5. Exſcutellati thorace inermi, capite cornuto. 163—204.
Fam. 6. Exſcutellati mutici. 205—237.

Actaeon. 18.
Aegeon. 6.
aeneus. 195.
Aenobarbus. 37.
(Aeſon.) 161.
Alces. 182.
Alcides. 2.
Aloeus. 28.
Ammon. 147.
analis. 76.
Antaeus. 31.
Antenor. 162.
Apelles. 53.
Arator. 106.
arenarius. 130.
Aries. 55.
aſper. 128.
ater. 80.
aterrimus. S.
Atlas. 26.
Augias. 47.
Aygulus. 69.
Bacchus. 212.
Barbaroſſa. 48.
Belzebul. 152.
bicornis. 23.
bifaſciatus. 153.
bilobus. 14.
bimaculatus. 82.
bipunctatus. 109.
bipuſtulatus. 227.
Biſon. 164.
Blackburnii. 113.
Boas. 21.
Boas. (Aeſon.) 161.
Bonaſus. 163.
Bucephalus. 166.
caelatus. A. 435.
Camelus. 159.
candidus. 99.
Capra. 180.
capucinus. 157.
Carnifex. 186.
Carolinus. 170.
Castra. 145.
Centaurus. 5.
centricornis. S.
Chorinaeus. 8.
cinctus. 231.
claviger. 10.
Clinias. 56.
Coenobita. 191.
conflagratus. 85.
conſpurcatus. 87.
contaminatus. 114.
cordatus. 99.
Coryphaeus. 22.
coronatus. 58.
criſtatus. 204.
cupreus. 218.
Cyclops. 44.
Daedalus. 15.

depreſſus. A. 435.
Dichotomus. 9.
didymus. 61.
Dionyſius. 59.
diſcoideus. 235.
diſpar. 7.
Elephas. 20.
elevatus. 118.
emarginatus. 151.
Enema. 12.
erraticus. 86.
excavatus. 100.
farctus. 65.
faſciatus. 121.
Faunus. 155.
feſtivus. 139.
fimetarius. 84.
flagellatus. 219.
flavipes. 233.
foetens. 75.
foetidus. 131.
Foſſor. 72.
Fricator. 176.
furcatus. 198.
Furculus. S.
fuſcopunctatus. S.
Gazella. 183.
Geryon. 27.
gibboſus. 213.
Gideon. 3.
glabratus. 226.
Globator. 107.
granarius. 92.
granulatus. 217.
Guineenſis. 143.
haemorrhoidalis. 93.
Hamadryas. 149.
Haſtator. S.
haſtatus. 11.
Hercules. 1.
Hircus. 63.
Hiſpanus. 188.
Hollandiae. 214.
Hübneri. 203.
Hylax. 54.
Jachus. 135.
Jamaicenſis. 50.
Ibex. 181.
inquinatus. 88.
Inuus. 68.
Juvencus. 102.
Koenigii. 216.
Laborator. 105.
lancifer. 168.
laticollis. 206.
Lazarus. 40.
Leei. 215.
Lemur. 158.
longimanus. 96.
lunaris. 150.
luridus. 91.
lutarius. 112.
Maimon. 33.
marginellus. 120.
marianus. 95.
melanocephalus. S.
melanocephalus. 230.
Meliboeus. 60.
merdarius. A. 435.
metallicus. S.
Midas. 148.
miliaris. 209.

Milon.

Milon. 45.
Mimas. 177.
minutus. 236.
mobilicornis. 43.
Moloſſus. 167.
Momus. 35.
Monodon. 57.
Mopſus. 189.
morbilloſus. 210.
muricatus. A. 436.
nanus. 137.
naſicornis. 38.
nemeſtrinus. 134.
Nicanor. 175.
nigripes. 111.
Niſus. 171.
nitidulus. 94.
nuchicornis. 192.
nuchidens. S.
nutans. 194.
obliquus. 223.
obſcurus. 79.
Oedipus. 132.
Orientalis. 172.
Orion. 24.
Oromedon. 4.
Oryx. 184.
ovatus. 237.
Pactolus. 140.
pallipes. 228.
Pan. 13.
Paniſcus. 169.
Parvulus. S.
Pecari. 125.
Piceus. 67.
pillularius. 222.
Pithecius. 141.
Pirmal. S.
plagiatus. 119.
Plutus. A. 436.
politus. S.
porcatus. 126.
Porcus. 81.
profanus. 211.
punctatus. 64.
puſillus. S.
pygmaeus. 144.
quadridens. 42.
4-dentatus. S.
4-maculatus. 115.
(4-notatus.) 201.
{ 4-puſtulatus. 116.
{ 4-puſtulatus. (4-notatus.) 201.
quadriſpinoſus. 41.
quisquilius. 124.
reflexus. 202.
retuſus. 66.
Rhadamiſtus. 133.
Rhinoceros. 46.
Roſalius. 146.
ruſipes. 110.
rufus. 129.
Sabaeus. 136.
ſacer. 205.
ſagittarius. 165.
Satyrus. 49.
ſcabratus. A. 436.
ſcabroſus. 197.
Schaefferi. 220.
Schreberi. 225.
Scrofa. 123.

Scrutator. 73.
ſcybalarius. 77.
ſemipunctatus. 207.
Seniculus. 142.
7-maculatus. 108.
6-punctatus. 232.
Silenus. 51.
Simſon. 19.
Sinon. 154.
ſmaragdulus. 234.
ſordidus. 90.
Sorex. 71.
ſplendidulus. 138.
ſplendidus. 103.
Sphinx. 173.
ſpinifer. 190.
ſqualidus. 224.
ſtercorarius. 97.
Stercorator. 127.
ſubterraneus. 70.
Sulcator. 200.
ſulcatus. 74.
Sus. 117.
ſuturalis. 89.
Sylvanus. 39.
Syphax. 32.
Syrichtus. 52.
Talpa. 101.
Tarandus. 156.
Taurus. 178.
terreſtris. 78.
teſtaceus. 83.
teſtudinarius. 122.
thoracicus. 196.
Titanus. 36.
Tityus. 25.
Tragus. 185.
triangularis. 229.
tridens. 187.
truncatus. 16.
Typhoeus. 34.
Typhon. 29.
unguiculatus. 174.
unifaſciatus. 160.
Vacca. 179.
valgus. 62.
variegatus. 8.
varioloſus. 208.
vernalis. 98.
verticicornis. 199.
veter. 104.
volvens. 221.
Vulcanus. 30.
Xiphias. 193.
Zoilus. 17.

11. SCARITES. Tom. I. a. pag. 94—97.

Arabs. 12.
arenarius. 9.
crenatus. 6.
Curſor. 11.
cyaneus. 7.
depreſſus. 1.
gibbus. 10.
Gigas. 3.
laevigatus. 5.
marginatus. 2.

ſabu

ſabuloſus. 8.
ſubterraneus. 4.
teſtaceus. A. 437.

10. SCAURUS. Tom. I. a. pag. 93.

atratus. 1.
ſtriatus. 2.
ſulcatus. 3.

146. SCOLIA. Tom. II. pag. 228—238.

atrata. 1.
aurea. 13.
bicincta. 24.
bimaculata. 11.
ciliata. 12.
collaris. 21.
cylindrica. 38.
(12-guttata.) 28.
ferruginea. 14.
flavifrons. 5.
globularis. 37.
haemorrhoidalis. 7.
Hortorum. 8.
interrupta. 34.
Maura. 20.
nigrita. 3.
notata. A. 458.
8-guttata. (12-guttata.) 28.
Prisma. 31.
4-faſciata. S.
4-guttata. 29.
4-maculata. 4.
4-punctata. 32.
4-puſtulata. 26.
5-cincta. 23.
5-faſciata. 22.
5-punctata. 27.
radula. 16.
rubiginoſa. 8.
ruficornis. 9.
ſcutellata. 15.
ſenilis. 35.
7-cincta. 36.
6-cincta. 33.
6-guttata. 30.
6-maculata. 6.
tridens. 17.
unifaſciata. 19.
variegata. 10.
verticalis. 25.

167. SCOLOPENDRA. Tom. II. pag. 389—392.

clypeata. 9.
coleoptrata. 2.
dorſalis. 8.
electrica. 10.
ferruginea. 7.
forficata. 4.

Gabrielis. 13.
gigantea. 5.
lagura. 1.
longicornis. 3.
marina. 14.
morſitans. 6.
occidentalis. 12.
phosphorea. 11.

22. SCOLYTUS. Tom. I. a. pag. 180—181.

flexuoſus. 1.
limbatus. 2.

174. SCORPIO. Tom. II. pag. 433—437.

acaroides. 11.
Afer. 3.
Americanus. 4.
Auſtralaſiae. 1.
Auſtralis. 8.
cancroides. 10.
cimicoides. 9.
Europaeus. 5.
griſeus. 7.
Hottentotta. 6.
Maurus. 2.
mucronatus. S.
Tamulus. S.

179. SCYLLARUS. Tom. II. pag. 477.

Arctus. 1.
Auſtralis. 2.

129. SEMBLIS. Tom. II. pag. 72—74.

atrata. 3.
bicaudata. 8.
fuſcata. 5.
griſea. 2.
lutaria. 10.
marginata. 7.
nebuloſa. 9.
phalaenoides. 6.
pectinicornis. 1.
punctata. 4.
viridis. 11.

12. SEPIDIUM. Tom. I. a. pag. 97—98.

criſtatum. 3.
rugoſum. 5.
reticulatum. 4.
tricuſpidatum. 1.
vittatum. 6.

189. SESIA. Tom. III. a. pag. 379—385.

apiformis. 13.
aſiliformis. 16.
bombyliformis. 12.
brunnea. 7.
chalciformis. 14.
crabroniformis. 17.
culiciformis. 19.
Fadus. 4.
fuciformis. 11.
haemorrhoidalis. 18.
Hylas. 3.
ichneumoniformis. 22.
Marica. 9.
Melas. 2.
8-maculata. 8.
Pandora. 6.
ſphegiformis. 15.
Stellatarum. 5.
Tantalus. 1.
tenthrediniformis. 20.
Thysbe. 10.
tipuliformis. 21.
veſpiformis. 23.

207. SIGARA. Tom. IV. pag. 59—60.

coleoptrata. 3.
lineata. 1.
minuta. 4.
ſtriata. 2.

39. SILPHA. Tom. I. a. pag. 248—254.

Americana. 5.
atrata. 11.
dentata. 23.
ferruginea. 21.
groſſa. 6.
inaequalis. 12.
Indica. 4.
laevicollis. 8.
laevigata. 14.
limbata. 24.
littoralis. 2.
livida. 3.
lunata. 13.
marginalis. 9.
micans. A. 445.
minuta. 26.
oblonga. 22.
obſcura. 15.
opaca. 17.
pedemontana. 20.
4-punctata. 19.
reticulata. 16.
rugoſa. 10.
ſinuata. 18.
Surinamenſis. 1.
thoracica. 7.
undata. 25.

94. SINODENDRON. Tom. I. b. pag. 358—359

Capucinum. 3.
cylindricum. 1.
Dominicum. 4.
muricatum. 2.

---

139. SIREX. Tom. II. pag. 124—132.

albicornis. 12.
Camelus. 14.
Columba. 3.
compreſſus. 23.
cyaneus. 11.
Dromedarius. 16.
emarginatus. 15.
Phantoma. 10.
flavicornis. 6.
fuſcicornis. 7.
Gigas. 1.
Juvencus. 9.
macilentus. 25.
Magus. 4.
mariſcus. 20.
nigricornis. 5.
Nigrita. 13.
Noctilio. 22.
Pacca. 17.
pſyllius. 2.
pygmaeus. 24.
ſimilis. 18.
Spectrum. 8.
tabidus. 26.
troglodyta. 21.
Veſpertilio. 19.

---

5. SPHAERIDIUM. Tom. I. a. pag. 77—83.

abdominale. 10.
aeneum. 27.
atomarium. 13.
bicolor. 24.
bipuſtulatum. 3.
Colon. 4.
dytiſcoides. 7.
faſciculare. 17.
ferrugineum. 12.
fimetarium. 25.
flavipes. 19.
glabratum. 8.
Globus. 5.
haemorrhoidale. 18.
humerale. 9.
limbatum. 21.
lugubre. 15.
lunatum. 2.
luteum. 6.
marginatum. 11.
melanocephalum. 14.
minutum. 29.
nigripenne. 23.
pulicarium. 30.
5-maculatum. S.
ruficolle. 22.
ſcarabaeoides. 1.
ſeminulum. 28.
ſterco-

ſtercoreum. 16.
teſtaceum. 26.
unipunctatum. 20.

143. SPHEX. Tom. II. pag. 198 — 220.

Fam. 1. Abdomine petiolato. 1 — 38.
Fam. 2. Abdom. ſeſſili. 39 — 92.

abdominalis. 73.
affinis. 21.
albifrons. 36.
amethyſtina. 49.
analis. 42.
arenaria. 2.
argentata. 8.
aſſimilis. 44.
atra. A. 457.
aurata. 64.
aurulenta. 14.
bicolor. 81.
bifaſciata. 58.
bipunctata. 67.
brevipennis. 86.
Capenſis. 74.
ciliata. 31.
cincta. 29.
cinerea. 61.
cingulata. 50.
Clavus. 26.
coerulea. 90.
collaris. 40.
compreſſa. 32.
cyanea. 13.
cyanipennis. 6.
Diadema. 45.
diſcolor. 79.
erythrocephala. 23.
exaltata. 69.
faſciata. 60.
femorata. 16.
fervens. 5.
Figulus. 19.
flava. 80.
flavicornis. 82.
flavipennis. 10.
flavipes. 18.
frontalis. 41.
fugax. 63.
fulvipennis. 84.
fuſca. 46.
fuſcata. 57.
gibba. 59.
groſſa. S.
guttata. 72.
haemorrhoidalis. 7.
hirta. S.
hirtipes. 35.
holoſericea. 27.
hyalinata. 56.
Jamaicenſis. 22.
ichneumonea. 34.
labiata. 52.
lobata. 30.
lunata. 20.
lutaria. 3.
maculata. 70.

Madra-

Madraſpatana. 25.
Maura. 55.
maxilloſa. 37.
mixta. A.
Morio. 39.
nigra. 51.
nigricornis. 68.
nigripes. 77.
Nigrita. 75.
nitida. 65.
nobilis. 85.
ocellata. 87.
Penſylvanica. 11.
plumbea. 92.
pubeſcens. 28.
4-punctata. 89.
ruficornis. 88.
rufipennis. 9.
rufipes. 66.
ſabuloſa. 1.
ſanguinolenta. 54.
ſexpunctata. A. 457.
Sibirica. 33.
ſimilis. 43.
ſpecioſa. 83.
ſpinifex. 24.
ſtellata. 91.
Thomae. 4.
tibialis. 17.
tomentoſa. 15.
tricolor. 71.
tropica. 62.
Turcica. 76.
unicolor. 38.
Urſus. 48.
variegata. 53.
viatica. 47.
villoſa. 78.
violacea. 12.

---

188. SPHINX. Tom. III. a. pag. 355

Abadonna. S.
Alecto. 59.
Alope. 20.
Anubus. 62.
Apulus. 14.
aſiliformis. 7.
Atropos. 27.
Batus. 64.
Boerhaviae. 46.
Cacus. 18.
Caicus. 57.
Caricae. 67.
Carolina. 25.
Celerio. 43.
cingulata. 56.
Clio. 65.
Clotho. 60.
Convolvuli. 54.
Crantor. 58.
dentata. 19.
didyma. 48.
Ello. 21.
Elpenor. 51.
equeſtris. 29.
Erotus. 28.
Euphorbiae. 37.

feneſtrina. 8.
Ficus. 31.
funebris. 47.
Galii. 38.
Gnoma. 61.
Heſpera. 49.
Hylaeus. 53.
Jatrophae. 22.
Labruſcae. 66.
Lacheſis. S.
lineata. 39.
Liguſtri. 55.
lugubris. 5.
luſca. 6.
Lycetus. 45.
Medea. 23.
modeſta. 4.
Nechus. 63.
Nerii. 13.
Neſſus. 2.
obſcura. 17.
ocellata. 1.
Oenotherae. 12.
Oldenlandiae. 44.
pagana. 34.
Parce. 50.
Peneus. 15.
Pholus. 24.
Phorbus. 30.
Pinaſtri. 35.
plebeja. 36.
Populi. 9.
Porcellus. 52.
Pylas. 16.
Quercus. 3.
Rhadamiſtus. 11.
ruſtica. 33.
ſatellitia. 42.
ſtrigilis. 26.
terſa. 69.
Tetrio. 32.
Tiliae. 10.
Thyelia. 70.
velox. 68.
Veſpertilio. 40.
Vitis. 41.

93. SPONDYLIS. Tom. I. b. pag. 358.

bupreſtoides. 1.

184. SQUILLA. Tom. II. pag. 511—513.

Chiragra. 5.
ciliata. 4.
maculata. 1.
Mantis. 2.
Scyllarus. 3.
vitrea. 6.

115. STAPHYLINUS. Tom. I. b. pag. 519—53

aeneocephalus. 15.
alpinus. 33.
analis. 35.
anguſtatus. 41.
atricapillus. 40.
aureus. 1.
bicolor. 47.
biguttatus. 26.
bipuſtulatus. 34.
brunnipes. 23.
canaliculatus. 42.
caraboides. 53.
clavicornis. 37.
craſſicornis. 50.
crenatus. 26.
cyaneus. 11.
cyanipennis. 29.
dilatatus. 12.
emarginatus. 46.
erythrocephalus. 17.
erythropterus. 14.
flavipes. 39.
flaveſcens. 32.
floralis. 52.
Foſſor. 16.
fulgens. 13.
fulgidus. 25.
fulvipes. 31.
fuſcipes. 38.
gracilis. 44.
guttatus. 36.
hirtus. 2.
marginatus. 30.
maxilloſus. 9.
melanocephalus. 49.
murinus. 4.
nebuloſus. 3.
nitidus. 24.
oculatus. 10.
olens. 6.
piceus. 55.
picipennis. 8.
piloſus. 18.
politus. 20.
porcatus. 56.
pubeſcens. 5.
punctulatus. 45.
rufipes. 48.
rugoſus. 54.
ſanguineus. 51.
ſimilis. 7.
ſplendens. 19.
ſtriatulus. 27.
ſtrumoſus. 28.
tenuis. 43.
triſtis. 21.
tuberculatus. S.
varians. 22.

---

85. STENOCORUS. Tom. I. b. pag. 293—302

annulatus. 22.
bidens. 7.
circumflexus. 20.
cyaneus. 1.
cylindricollis. S.
10-maculatus. 23.

Drurii

Drurii. 28.
farinoſus. 11.
faſciculatus. 19.
feſtivus. 4.
Garganicus. 3.
geminatus. 16.
glabratus. 10.
irroratus. 9.
Lamed. 2.
Lineola. 24.
maculoſus. 15.
Marylandicus. 5.
nanus. 21.
pallens. 17.
pubeſcens. 26.
4-maculatus. 14.
5-maculatus. 13.
ruſticus. 30.
ſemipunctatus. 8.
6-maculatus. 12.
ſpinicornis. 6.
ſtrepens. 18.
undatus. 29.
varius. 25.
villoſus. 27.

---

238. STOMOXYS. Tom. IV. pag. 393—396.

aſiliformis. 10.
calcitrans. 5.
dorſalis. 12.
griſea. 2.
irritans. 7.
Morio. 1.
muſcaria. 8.
paraſita. 3.
pungens. 9.
ſiberita. 4.
Stylata. 11.
teſſellata. 6.

---

228. STRATIOMYS. Tom. IV. pag. 262—269.

argentata. 15.
bicolor. S.
Chamaeleon. 3.
clavipes. 24.
Crucis. 7.
cyanea. 11.
Ephippium. 6.
errans. 2.
faſciata. 14.
flaviſſima. 8.
furcata. 5.
Hydroleon. 17.
Hypoleon. 20.
Microleon. 9.
minuta. 22.
muſcaria. 21.
mutabilis. 13.
pallipes. 12.
4 lineata. 23.
ſexdentata. 25.
ſplendens. 4.
ſtrigata. 10.

teſta-

teſtacea. 1.
tigrina. 16.
trilineata. 19.
viridula. 18.

SYMETHIS. S.

232. SYRPHUS. Tom. IV. pag. 278 — 312.

Fam. 1. Antennis ſeta plumata. 1 — 15.
Fam. 2. Antenn. ſeta nuda. 16 — 122.

abdominalis. 108.
aeneus. 88.
affinis. 24.
Agrorum. 27.
albimanus. 117.
annulatus. 67.
apiarius. 9.
apiformis. 80.
Arbuſtorum. 30.
arcuatus. 55.
Arvorum. 28.
aſiliformis. 45.
bicinctus. 54.
bicolor. 71.
bifaſciatus. 101.
bombylans. 4.
bombyliformis. 13.
calcaratus. 86.
cinereus. 53.
cingulatus. 56.
clavatus. 73.
clavipes. 50.
Coemeteriorum. 94.
conopſeus. 69.
Corollae. 106.
crabroniformis. 78.
craſſipennis. 23.
craſſus. 12.
Cryptarum. 26.
cylindricus. 74.
dentipes. 68.
devius. 60.
dimidiatus. 118.
diophtalmus. 79.
diſpar. 115.
elongatus. 76.
equeſtris. 51.
Ericetorum. 34.
errans. 58.
eſuriens. 10.
fallax. 47.
femoratus. 65.
feſtivus. 82.
flavicans. 52.
flavicornis. 87.
floreus. 20.
Frutetorum. 33.
fuciformis. 43.
funeſtus. 89.
gibbus. 120.
gibboſus. 121.
glaucius. 97.

globoſus. 99.
hemipterus. 22.
Hortorum. 29.
ichneumoneus. 70.
inanis. 1.
inflatus. S.
intricarius. 11.
laetus. 83.
Lapponum. 7.
Lucorum. 46.
lugubris. 93.
lunatus. 64.
melancholicus. 90.
mellinus. 110.
Menthaſtri. 111.
metallicus. 95.
micans. 2.
Murorum. 35.
muſſitans. 6.
mutabilis. 59.
myſtaceus. 5.
natans. 18.
nectareus. 116.
Nemorum. 25.
Nigrita. 49.
noctilucus. 98.
obeſus. 15.
Ocymi. 114.
oeſtraceus. 44.
orbiculus. 122.
pellucens. 3.
Pendulus. 17.
Piger. 63.
Pinguis. 16.
pipiens. 119.
podagricus. 77.
Pratorum. 31.
Pyraſtri. 102.
quadrilineatus. 40.
quinquelineatus. 42.
quinqueſtriatus. 41.
Ribeſii. 100.
Roſarum. 109.
ruficornis. 84.
Salviae. 105.
Saltuum. 32.
ſcalaris. 112.
ſcriptus. 113.
Segetum. 38.
ſegnis. 61.
ſemirufus. 85.
ſepulchralis. 91.
ſetoſus. 37.
ſphegeus. 72.
ſpinipes. 66.
ſubcoleoptratus. 21.
ſubſultans. 96.
Sylvarum. 48.
tenax. 36.
Thymaſtri. 103.
Transfuga. 104.
tricolor. S.
trilineatus. 39.
triſtis. 92.
Umbellatarum. 107.
vacuus. 14.
verſicolor. 19.
veſiculoſus. 75.
veſpiformis. 81.
Vinetorum. S.
Volvulus. 62.
zonalis. 57.

234. TABANUS. Tom. IV. pag. 362 — 374.

albipes. 11.
antarcticus. 31.
atratus. 16.
autumnalis. 7.
bidentatus. 40.
biſpinoſus. 41.
borealis. 30.
bovinus. 4.
bromius. 17.
caecutiens. 42.
Cajennenſis. 19.
calens. 9.
cinctus. 18.
coſtatus. 45.
Equorum. 35.
exaeſtuans. 13.
faſciatus. 8.
feneſtratus. 44.
fervens. 12.
Graecus. 29.
hauſtellatus. 2.
inanis. 26.
Italicus. 21.
lineatus. 5.
Lineola. 33.
longicornis. 38.
lugubris. 46.
lunatus. 34.
macularis. 36.
Mexicanus. 22.
moerens. 43.
Morio. 6.
Nigrita. 20.
occidentalis. 27.
paganus. 24.
pellucens. 15.
pluvialis. 32.
proboſcideus. 3.
punctatus. 25.
roſtratus. 1.
ruficornis. 14.
ruſticus. 23.
ſepulcralis. 48.
ſtriatus. 39.
tarandinus. 10.
tropicus. 28.
viduatus. 47.
vittatus. 37.

173. TARANTULA. Tom. II. pag. 432 — 433.

caudata. 2.
lunata. 3.
reniformis. 1.

15. TENEBRIO. Tom. I. a. pag. 110 — 114.

abbreviatus. 10.
brunneus. 5.
cadaverinus. 18.
chalybaeus. 8.
cornutus. 13.
culinaris. 16.
cupre-

cupreus. 1.
curvipes. 3.
cyaneus. A. 439.
depreſſus. 11.
filiformis. 20.
Foſſor. 12.
laevigatus. 7.
Mauritanicus. 15.
Molitor. 6.
obſcurus. 5.
pallens. 17.
ſanguinipes. 14.
ſerratus. 4.
ſulcatus. 2.
variegatus. 9.
villoſus. 19.

---

138. TENTHREDO. Tom. II. pag. 104—123.

Fam. 1. Antennis clavatis. 1 — 11.
Fam. 2. Antennis inarticulatis extrorſum craſſioribus. 12 — 22.
Fam. 3. Antennis pectinatis. 23 — 28.
Fam. 4. Antennis filiformibus articulis. 7 — 9. 29—65.
Fam. 5. Antennis filiformibus, articulis plurimis. 66 — 78.

Abietis. 41.
Aethiops. 65.
albicornis. 47.
Alni. 39.
Americana. 16.
Amerinae. 5.
analis. 42.
annulata. 22.
Arbuſtorum. 78.
atra. 49.
Betulae. 72.
blanda. 59.
campeſtris. 73.
Capreae. 54.
carbonaria. 63.
Cephalotes. 23.
Ceraſi. 36.
cincta. 51.
cingulata. 34.
clavicornis. 14.
coeruleſcens. 15.
coſtalis. 17.
Cynosbati. 68.
dorſata. 26.
Eglanteriae. 59.
enodis. 13.
erythrocephala. 66.
faſciata. 9.
femorata. 1.
flava. 77.
flavicornis. 31.
Frutetorum. 25.
Germanica. 43.
Gonagra. 48.
haemorrhoidalis. 76.
Juniperi. 27.
lateralis. 53.
livida. 46.

Lucorum. 2.
lutea. 3.
luteicornis. 32.
maculata. 60.
marginella. 50.
marginata. 6.
Maura. 44.
Morio. 55.
naſſata. 37.
Nemorum. 24.
nigra. 64.
obſcura. 11.
opaca. 62.
ovata. 38.
pavida. 40.
Pini. 28.
Populi. 70.
pratenſis. 74.
punctata. 57.
Punctum. 58.
Rapae. 35.
Roſae. 18.
rufipennis. 45.
(rufiventris. A.)
ruſtica. 52.
Salicis. 30.
Saltuum. 75.
Scrophulariae. 29.
ſeptentrionalis. 56.
ſericea. 10.
ſerva. 21.
ſignata. 69.
Spinarum. 20.
Sylvarum. 4.
ſylvatica. 67.
triſtis. 7.
uſtulata. 12.
vafra. 71.
vaga. 61.
viridis. 33.
Vitellinae. 8.

132. TERMES. Tom. II. pag. 87—91.

Arda. 4.
Deſtructor. 2.
fatale. 1.
flavicolle. 6.
mordax. 5.
Morio. 3.

109. TETRUTOMA. Tom. I. b. pag. 507—

Ancora. 2.
Fungorum. 1.
Gazella. 3.

203. TETTIGONIA. Tom. IV. pag. 16 — 26.

aeſtuans. 14.
atrata. 28.
cantans. 13.
Catena. 11.
cingulata. 17.
conſparcata. 20.
cruentata. 19.
dilatata. 5.
Ephemera. 34.
faſciata. 2.
flaveſcens. 30.
griſea. 1.
groſſa. 3.
haematodes. 21.
Kaempferi. 25.
limbata. 4.
maculata. 12.
minuta. 37.
muta. 35.
olivacea. 31.
Orni. 23.
picta. 27.
plebeja. 22.
puſtulata. 15.
repanda. 24.
reticulata. 26.
ſanguinolenta. 32.
Septemdecim. 9.
ſpinoſa. 6.
ſplendida. 33.
ſtridula. 16.
Tibicen. 8.
teſtacea. 29.
vaginata. 7.
variegata. 10.
villoſa. 18.
violacea. 36.

222. THRIPS. Tom. IV. pag. 228 — 229.

faſciata. 5.
juniperina. 2.
minutiſſima. 6.
Phyſapus. 1.
Ulmi. 3.
Urticae. 4.

148. THYNNUS. Tom. II. pag. 244 — 245.

abdominalis. 3.
dentatus. 1.
emarginatus. 2.
integer. 4.

59. TILLUS. Tom. I. b. pag. 77—78.

ambulans. 2.
damicornis. S.
elongatus. 1.
ſerraticornis. 3.
Weberi. S.

198. TINEA. Tom. III. b. pag. 287—329.

abietella. 68.
Albinella. 143.
aleella. 136.
Allionella. 148.
anella. 56.
antennella. 110.
arbutella. 83.
arbuſtella. 24.
arcella. 81.
argentella. 38.
argyrella. 30.
atrella. 52.
aurella. 180.
auricella. 60.
barbella. 45.
Bergſtraeſſella. 151.
bicoſtella. 86.
bifaſciella. 100.
bipunctella. 104.
Blancardella. 175.
boletella. 1.
Bonnetella. 154.
bractella. 118.
capitella. 125.
carnella. 41.
centuriella. 8.
cerella. 2.
cinctella. 97.
cinerella. 117.
circulella. 61.
clematella. 85.
Clerkella. 181.
colonella. 5.
Combrella. 111.
compoſitella. 129.
conchella. 36.
cornella. 17.
Cramerella. 173.
crataegella. 66.
cryptella. 58.
cucullatella. 80.
culmella. 34.
cuſpidella. 119.
cydoniella. 159.
cylindrella. 92.
daphnella. 42.
Deniſella. 141.
10-guttella. 106.
dimidiella. 120.
dodecella. 108.
dorſella. 63.
Drurella. 172.
elongella. 89.
Eſperella. 145.
evonymella. 12.
exiguella. 179.
Fabricella. 140.
fagella. 57.

faſſel-

falſella. 37.
fibulella. 178.
flavifrontella. 78.
foenella. 65.
Forſterella. 176.
fulvella. 134.
funerella. 98.
fuſcella. 113.
Fyeſlella. 138.
gelatella. 11.
gemella. 124.
Geoffroyella. 139.
gigantella. 3.
Gleichella. 158.
Goedartella. 146.
gramella. 59.
grandella. 7.
griſella. 10.
guttella. 26.
Harriſella. 171.
hemedactinella. 90.
Hermannella. 162.
hortella. 43.
hortella. 174.
infectella. 72.
irrorella. 18.
Klemannella. 169.
Knochella. 157.
lactella. 116.
leucatella. 99.
Leuwenhoekella. 164.
lichenella. 182.
limbella. 77.
linetella. 22.
Linneella. 166.
Liſterella. 135.
lugubrella. 54.
lutarella. 23.
Lyonetella. 153.
maculella. 82.
magnella. 4.
margaritella. 35.
marginella. 46.
maurella. 50.
melonella. 79.
Merianella. 147.
meſomella. 25.
Mouffetella. 142.
minutella. 130.
(monachella). 93.
mucronella. 47.
muſcalella. 122.
Müllerella. 165.
nigrella. 49.
nitidella. 16.
nivella. 39.
obſcurella. 112.
8-punctella. 107.
oleella. 91.
Oliviella. 132.
oxyacantella. 28.
padella. 13.
palumbella. 67.
parentheſella. 87.
paſcuella. 33.
pectinella. 103.
pellionella. 73.
perlella. 21.
Petiverella. 133.
pinetella. 31.
plumbella. 14.
praelatella. 127.

pratella. 32.
pulchella. 71.
punctella. 95.
puſiella. 64.
puſtulatella. 20.
quadrella. 51.
4-punctella. 105.
Rajella. 167.
Rhediella. 161.
rhomboidella. 123.
Roeſella. 163.
roſcidella. 19.
rupella. 126.
ſalicella. 62.
ſarticella. 75.
Schaefferella. 155.
Schieffermüllerella. 150.
Schreberella. 168.
Schulzella. 152.
Scopolella. 156.
Seppella. 144.
ſepulchrella. 131.
ſequella. 15.
6 punctella. 115.
ſinuella. 94.
ſociella. 6.
Sparmannella. 160.
ſpiſſicella. 9.
ſtigmatella. 76.
ſtriatella. 102.
ſtrigella. 44.
ſtrigella. (monachella.) 93
ſtrobilella. 101.
Stroemella. 157.
ſulphurella. 128.
ſyringella. 177.
tapezella. 70.
teſſella. 84.
teſſerella. 48.
tetricella. 69.
trigonella. 121.
tripunctella. 114.
triſtella. 40.
Thunbergella. 170.
undella. 96.
uſtalella. 88.
variella. 55.
veſtionella. 74.
viduella. 53.
vinetella. 29.
viridella. 109.
vittella. 27.
Wilkella. 149.

145. TIPHIA. Tom. II. pag. 223—228.

annulata. 7.
collaris. 16.
dorſata. 12.
Ephippium. 10.
femorata. 1.
flavipes. 3.
haemorrhoidalis. 8.
hiſtrionica. 2.
maculata. 4.
Morio. 17.
nigra. 9.
pedeſtris. 19.

5-cincta. 6.
radula. 11.
ruficornis. 13.
tricincta. 15.
trifaſciata. 14.
variegata. 6.
villoſa. 18.

---

224. TIPULA. Tom. IV. pag. 233 — 252.

Fam. 1. Alis patentibus. 1 — 42.
Fam. 2. Alis incumbentibus. 43 — 93.

albimana. 24.
albipennis. 82.
annulata. 29.
Arundineti. 61.
atrata. 22.
barbicornis. 57.
bimaculata. 28.
brevicornis. 71.
brunnipes. 80.
cantans. 67.
Chryſanthemi. 77.
cincta. 60.
cinerea. 31.
clavipes. 25.
contaminata. 12.
cornicina. 21.
crocata. 5.
culiciformis. 87.
dorſalis. 16.
faſciata. 32.
faſciculata. 46.
febrilis. 79.
flabellicornis. 59.
flaveolata. 6.
flaveſcens. 37.
flavipes. 35.
flexilis. 49.
forcipata. 81.
geniculata. 68.
gibba. 54.
hirta. 84.
Hiſtrio. 17. (51).
Hortorum. 7.
hortulana. 72.
Johannis. 73.
juniperina. 83.
laeta. 27.
littoralis. 62.
longicornis. 90.
lunata. 13.
macrocephala. 65.
melanocephala. 33.
monilis. 63.
monoptera. 42.
Morio. 40.
motitatrix. 44.
nigra. 23.
ocellaris. 30.
oleracea. 8.
pallida. 56.
pallipes. 69.
paludoſa. 26.
paluſtris. 88.
pectinicornis. 1.

pennicornis. 93.
Perſicariae. 86.
phalaenoides. 85.
pilicornis. 45.
pilipes. 39.
plumbea. 19.
plumicornis. 58.
plumoſa. 43.
Pomonae. 74.
pratenſis. 15.
pulicaris. 92.
puſilla. 70.
Pyri. 75.
4-maculata. 4.
Regelationis. 38.
replicata. 41.
rivoſa. 2.
ruficollis. 76.
rufipes. 53.
ſericea. 91.
6-punctata. 34.
ſinuata. 3.
ſtriata. 20.
ſtricta. 57.
ſylveſtris. 89.
tendens. 47.
Thomae. 78.
tremula. 48.
triangularis. 10.
tricolor. 9.
tripunctata. 36.
Turcica. 14.
varia. 52.
variegata. 11.
verticillata. 18.
vibratoria. 50.
viridula. 66.
zonata. 64.

75. TRICHIUS. Tom. I. b. pag. 118 — 123.

bidens. 8.
biguttatus. A. 449.
bipunctatus. 7.
canaliculatus. 10.
Delta. 14.
Eremita. 1.
faſciatus. 4.
hemipterus. 9.
Indus. 6.
lineatus. 15.
lunulatus. 11.
maculatus. 17.
nigripes. 16.
nobilis. 2.
8-punctatus. 3.
piger. 13.
ſuccinctus. 5.
viridulus. 12.

108. TRITOMA. Tom. I. b. pag. 505 — 507.

bipuſtulata. 1.
dubia. 5.
glabra. 2.
marginata. 3.

minuta.

minuta. 9.
Morio. 7.
rufipes. 4.
ſericea. 8.
vittata. 6.

16. TROGOSITA. Tom. I. a. pag. 114—116.

bicolor. 8.
bidens. 4.
caraboides. 2.
coerulea. 1.
ferruginea. 7.
ſulcata. 6.
thoracica. 5.
vireſcens. 3.

7. TROX. Tom. I. a. pag. 86—88.

arenarius. 3.
cornutus. 7.
gemmatus. 1.
horridus. 5.
luridus. 6.
ſabuloſus. 2.
ſpinicornis. 8.
ſuberoſus. 4.

170. TROMBIDIUM. Tom. II. pag. 398—406.

abſtergens. 33.
Albator. 20.
aquaticum. 3.
calcareum. 36.
caudatum. 4.
complanatum. 8.
craſſipes. 5.
ellipticum. 29.
extendens. 34.
geographicum. 32.
Globator. 23.
holoſericeum. 2.
impreſſum. 35.
Integrator. 17.
liliaceum. 10.
lugubre. 31.
maculatum. 7.
Muſculus. 16.
nodatum. 12.
orbiculatum. 30.
ovale. 13.
Papillator. 24.
Puſtulator. 21.
Sinuator. 18.
ſpinipes. 25.
ſtellare. 28.
ſtrigatum. 15.
tinctorium. 1.
Torris. 11.
Tricuſpidator. 19.
trifurcale. 27.
truncatum. 14.

unda-

undulatum. 6.
Variator. 22.
vernale. 26.
verſicolor. 9.

122. TRUXALIS. Tom. II. pag. 26—28.

brevicornis. 5.
conicus. 2.
crenulatus. 6.
Hungaricus. 4.
naſutus. 1.
vittatus. 3.

151. VESPA. Tom. II. pag. 253—283.

aeſtuans. 32.
affinis. 2.
albifrons. 37.
Americana. 81.
analis. 6.
annularis. 26.
arcuata. 83.
arenaria. 19.
Ariſtis. 101.
attenuata. 98.
aucta. 69.
aurata. 35.
bicincta. 63.
bifaſciata. 60.
biguttata. 68.
bipunctata. 70.
bicolor. 17.
bidens. 57.
biglumis. 64.
brunnea. 41.
calida. 33.
campaniformis. 84.
Carnatica. 5.
Carnifex. 23.
Carolina. 7.
Chinenſis. 29.
cincta. 1.
cineraſcens. 75.
cinerea. 92.
coarctata. 82.
concinna. 38.
conica. 88.
cornuta. 8.
Crabro. 9.
cyanea. 99.
cyanipennis. 86.
dorſalis. 44.
emarginata. 51.
Ephippium. 3.
eſuriens. 94.
ferruginea. 95.
flaveſcens. 79.
flavipes. 72.
fuſcata. 27.
Gallica. 13.
Germanica. 11.
gibboſa. 80.
griſea. 91.
Guineenſis. 85.
haemorrhoidalis. 36.
hebraea.

hebraea. 74.
Holſatica. 14.
humilis. 28.
Lanio. 24.
lateralis. 77.
lineata. 20.
Macaenſis. 22.
macilenta. 93.
maculata. 18.
marginalis. 42.
marginella. 34.
muraria. 50.
nidulans. 66.
Neſtor. S.
Norwegica. 16.
oculata. 43.
orientalis. 4.
parietina. 53.
Parietum. 45.
petiolata. 87.
phthiſica. 97.
pomiformis. 90.
pyriformis. 89.
4-cincta. 47.
4-faſciata. 48.
4-punctata. 71.
5-cincta. 30.
5-faſciata. 49.
radula. 58.
rufa. 15.
rufipes. 40.
Saxonica. 12.
Schach. 25.
ſerripes. 46.
6-faſciata. 56.
ſimplex. 52.
ſinuata. 62.
ſpinipes. 55.
Stigma. 78.
ſtriata. 21.
tabida. 96.
Tamula. S.
tecta. 76.
tepida. 31.
tricincta. 5.
trifaſciata. 61.
tripunctata. 63.
tricolor. 67.
triloba. 54.
triſtriata. A. 447.
uncinata. 39.
varia. 100.
variabilis. 73.
variegata. 59.
vulgaris. 10.

243. VOLUCCELLA. Tom. IV. pag. 412—413.

aurata. 2.
florea. 1.
verſicolor. 3.

112. UPIS. Tom. I. b. pag. 515.

ceramboides. 1.

52. ZONITIS. Tom. I. b. pag. 48—50.

angulata. 2.
chryſomelina. 5.
flava. 6.
fulvipennis. 4.
mutica. 3.
pallida. A. 447.
praeuſta. 1.
roſtrata. 7.

190. ZYGAENA. Tom. III. a. pag. 386—407.

Acharon. 70.
Achemon. 31.
Aeacus. 9.
Agrius. 10.
Andromacha. 26.
annulata. 11.
Argynnis. 24.
Auge. 53.
Bromus. 28.
Butus. 41.
Caffra. 13.
capiſtrata. 55.
Capys. 66.
Caſſandra. 22.
caudata. 56.
Cerbera. 16.
collaris. 7.
Colombina. 57.
Coronillae. 8.
diptera. 59.
Egeon. 30.
Ergotis. 46.
Eriphia. 39.
Erynnis. 48.
Eryx. 29.
Eunolphus. 64.
Eurocilia. 43.
fauſta. 37.
feneſtrata. 21.
Filipendulae. 1.
flabellicornis. 40.
flavicornis. 27.
Glaucopis. 47.
Guineenſis. 14.
Gyon. 45.
halterata. 60.
Hyparchus. 23.
infauſta. 38.
Ladis. 63.
Lavandulae. 4.
Lethe. 35.
Lichas. 36.
Loti. 3.
Maja. 61.
Megaera. 51.
Meliſſa. 33.
Myrtea. 25.
nigricornis. 32.

8-maculata. 54.
Onobrychis. 12.
Panthalon. 65.
Parthenii. 56.
Paſſalis. 15.
pectinicornis. 44.
Phlegmon. 18.
Pholus. 67.
Polymena. 34.
Pruni. 69.
Pugione. 42.
Pylotis. 49.
Quercus. 6.
Scabioſae. 2.
Scyton. 52.
Sedi. 5.
Sperbius. 20.
Statices. 68.
Styx. 71.
Sypilus. 50.
Thetis. 17.
Thelebus. 19.
Thoas. 72.
tibialis. 62.

51. ZYGIA. Tom. I. b. pag. 48.

oblonga. 1.